

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| ○ Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

## Déclaration de Maladie

N° W21-659572

116762



<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : <b>06950</b>	Société :		
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : <b>IMEHLI - Mohammed</b>			
Date de naissance : <b>08-08-1961</b>			
Adresse : <b>Hay Lakrimate - Rue 29 N° 16</b>			
Tél. : <b>0666247075</b>	Total des frais engagés : <b>507DH</b> Dhs		


Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
<b>Dr. Lotfi Mohamed Urgentiste INPE : 091202390 Tél : 06 61 45 30 30</b>			
Date de consultation : <b>03/07/22</b>			
Nom et prénom du malade : <b>Lotfi Mohamed</b> Age:			
Lien de parenté :	<input checked="" type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie : <b>Diabète + goutte</b>			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **Casablanca** Le : **/ /**

Signature de l'adhérent(e) :



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/05/2020	1		150,-	INP : [REDACTED]  Dr. Lotfi Mohamed Urgentiste INPE 2094202390 Tél : 06 61 46 30 30

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AL MAMM MICK	31/05/2020	367,-

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	J V	


### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	COEFFICIENT DES TRAVAUX [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	MONTANTS DES SOINS [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	DEBUT D'EXECUTION [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	FIN D'EXECUTION [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	COEFFICIENT DES TRAVAUX [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	MONTANTS DES SOINS [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	DATE DU DEVIS [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	DATE DE L'EXECUTION [REDACTED]




O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
G	00000000	00000000
B	35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur LOTFI Mohamed

Médecine générale

Médecine des urgences

Maitrise de douleur

Hospitalisation à domicile

Dr. Lotfi Mohamed  
Urgentiste  
INPE: 091202390  
Tél: 06 61 46 30 37

Casablanca Le .....

03/05/22

Lotfi  
Mohamed

✓ 46/05/22

✓ 03/05/22

Zylophie 100 ml  
1cpl

Profenol 100 ml n°3

200 ml x 3 = 600 ml

✓ 25/05/22

Lepti

Profenol

600 ml n°3

Cité Ouled Ziane Im « O » Casablanca

00212 06.61.45.30.30

[Mohammed.lotfi8@gmail.com](mailto:Mohammed.lotfi8@gmail.com)

Taxe Professionnelle N°19523/2014

Identifiant Fiscal : 151199309

Dr. Lotfi Mohamed  
Urgentiste  
INPE: 091202390  
Tél: 06 61 46 30 37

- Si vous consommez beaucoup de précautions »;
- Si vous avez moins de 18 mois et que vous avez des difficultés pour faire accepter lait et fruits à votre enfant.

IPRADIA LP est utilisée conjointement avec un régime sliméntaire et de l'exercice pour réduire le risque de diabète de type 2 chez les adultes en surpoids. Iorsque le régime alimentaire et l'exercice physique pendant 3 à 6 mois n'ont pas suffi à contrôler la glycémie (sucré). Vous courrez un risque élevé de développer le diabète de type 2 si vous avez plus de 40 ans, une quantité importante de graisse dans le sang ou des antécédents de diabète pendant la grossesse.

Le médicament est particulièrement efficace si vous avez moins de 45 ans, si vous avez un excès de poids, si votre glycémie est élevée après un repas ou si vous développez un diabète pendant la grossesse.

IPRADIA LP est utilisée pour le traitement du diabète de type 2 lorsque le régime et l'exercice ne suffisent pas à contrôler la glycémie (sucré). L'insuline est une hormone qui permet aux tissus corporels de prendre le glucose du sang et de l'utiliser pour l'énergie ou pour le stockage pour une utilisation future.

1. QU'EST-CE QUE PRADA LA COMPTE A UNDEBOUT prolongée ET DANS QUELS CAS EST-ELLE UTILISÉ ?

1. Que contient cette notice ?
  2. Quelles sont les informations à connaitre avant de prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  3. Comment prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  4. Quels sont les effets indésirables événuels ?
  5. Comment conserver IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Vous trouverez dans ce volume plusieurs articles, écrits à l'occasion d'un colloque sur les méthodes de travail et de recherche en sciences humaines, qui ont été présentés au congrès annuel de l'Association canadienne des sciences humaines, à Montréal, en mai 1972.

Les personnes atteintes d'insuline suffisamment à l'insuline pas correctement utilisée accumulent de glucose dans le sang et peuvent être atteintes de diabète. Les personnes atteintes d'insuline suffisamment à l'insuline pas correctement utilisée accumulent de glucose dans le sang et peuvent être atteintes de diabète.

Compresse à libération prolongée. Boîte de 30.



1. Quel est-ce que l'PRADAIA LP, comprimé à libération prolongée ?	Le PRADAIA LP est un comprimé à libération prolongée contenant de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète de type II (non insulino-dépendant). Il appartient à la classe des médicaments appelés les biguanides.
2. Quelles sont les effets indésirables événuels ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
3. Comment prendre l'PRADAIA LP, comprimé à libération prolongée ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
4. Quels sont les effets indésirables événuels ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
5. Comment conserver l'PRADAIA LP, comprimé à libération prolongée ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
6. Contenu de l'emballage et autres informations.	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
1. QUELLE EST-CE QUE L'PRADAIA LP, comprimé à libération prolongée ET DANS QUELLES CAS EST-IL UTILISÉ ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'PRADAIA LP, comprimé à libération prolongée ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
3. Comment prendre l'PRADAIA LP, comprimé à libération prolongée ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
4. Quels sont les effets indésirables événuels ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
5. Comment conserver l'PRADAIA LP, comprimé à libération prolongée ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
6. Contenu de l'emballage et autres informations.	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Voir rubrique effets indésirables.

des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique. Ces personnes ont une accumulation de glucose dans les tissus et une résistance à l'insuline. Les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique sont donc plus sensibles à l'insuline et ont besoin de moins d'insuline pour corriger leur diabète. Cependant, il est important de noter que l'insuline peut également entraîner des effets secondaires tels que l'hypoglycémie et l'hyperglycémie.

**IPIRADIA LP 500 mg,**  
**IPIRADIA LP 1000 mg,**



1. Quel est-ce que l'PRADAIA LP, comprimé à libération prolongée ?	Le PRADAIA LP est un comprimé à libération prolongée contenant de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète de type II (non insulino-dépendant). Il appartient à la classe des médicaments appelés les biguanides.
2. Quelles sont les effets indésirables événuels ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
3. Comment prendre l'PRADAIA LP, comprimé à libération prolongée ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
4. Quels sont les effets indésirables événuels ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
5. Comment conserver l'PRADAIA LP, comprimé à libération prolongée ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
6. Contenu de l'emballage et autres informations.	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
1. QUELLE EST-CE QUE L'PRADAIA LP, comprimé à libération prolongée ET DANS QUELLES CAS EST-IL UTILISÉ ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'PRADAIA LP, comprimé à libération prolongée ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
3. Comment prendre l'PRADAIA LP, comprimé à libération prolongée ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
4. Quels sont les effets indésirables événuels ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
5. Comment conserver l'PRADAIA LP, comprimé à libération prolongée ?	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.
6. Contenu de l'emballage et autres informations.	• Si vous avez un diabète hypoglycémie sévère (tardive), des vomissements, des nausées, des palpitations rapides, une acidose lactique (acidosé), ou une acidose (acidose) due à une diarrhée persistante trop importante. Ces symptômes peuvent être très graves et nécessitent rapidement une aide médicale.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Voir rubrique effets indésirables.

des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique devraient être privés de suif et de lait de brebis. Les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique devraient également éviter les aliments riches en phosphore, tels que les noix, les avocats, les pommes de terre et les légumes secs.

**IPIRADIA LP 500 mg,**  
**IPIRADIA LP 1000 mg,**



# Profenid® 100 mg

Kétoprofène

Compr. 100 mg  
ANTI-INFL.  
(M : Musc.)  
Ce médic.  
kétoprofène  
- en traite

PROFENID 100 MG

30 CP PEL

P.P.V : 70DH90



à 1180001060802

- certains rhumatismes inflammatoires chroniques,
- certaines arthroses sévères;
- en traitement de courte durée de :
- certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë),
- certaines inflammations des articulations par dépôt de cristaux, telles que la goutte,
- douleurs aiguës d'arthrose,
- douleurs lombaires aiguës,
- douleurs aiguës liées à l'irritation d'un nerf, telles que les sciatiques,
- douleurs et œdèmes liés à un traumatisme.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## Ne prenez jamais PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
- antécédent d'allergie au kétoprofène ou à l'un des constituants du produit,
- antécédent d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine, • antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS, • ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en évolution ou récidivant, • hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours, • maladie grave du foie, • maladie grave du rein, • maladie grave du cœur.

## Faites attention avec PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé :

### Mises en garde

CE MÉDICAMENT NE DOIT ÊTRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE.

Les médicaments tels que PROFENID pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses prescrites ni la durée de traitement. Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Précautions d'emploi

Comme il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement, il est important d'informer votre médecin avant de prendre PROFENID dans les cas suivants :

- antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de ce médicament peut entraîner une gêne respiratoire ou une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïden (cf. « Ne prenez jamais PROFENID

### lé ET DANS

DIENS.

l'ordien : le

SANOFI

100 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants.); • maladie du cœur (hypertension et/ou insuffisance cardiaque), du foie ou du rein, ainsi qu'en cas de rétention d'eau; • troubles de la coagulation, prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves ;

• maladie inflammatoire chronique de l'intestin (telle que maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique); • antécédents digestifs (ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien); • traitement concomitant avec d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère gastroduodénal ou hémorragie, par exemple des glucocorticoïdes, des antidiépresseurs (ceux de type ISRS, c'est-à-dire Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine), des médicaments prévenant la formation de caillots sanguins tels que l'aspirine ou les anticoagulants tels que la warfarine. Si vous êtes dans un de ces cas, consultez votre médecin avant de prendre PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé (cf. « Prise ou utilisation d'autres médicaments »); • antécédents de réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV (cabine de bronzage). L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

AU COURS DU TRAITEMENT, en cas :

- de signes d'infection ou d'aggravation des symptômes, PREVENIR VOTRE MEDECIN. Comme tout anti-inflammatoire non stéroïdien, le kétoprofène peut masquer les symptômes d'une infection sous-jacente (comme la fièvre); • de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE; • d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Si vous êtes une femme, PROFENID peut altérer votre fertilité. Vous ne devez donc pas prendre ce médicament si vous souhaitez concevoir un enfant, si vous présentez des difficultés pour procréer ou si des examens sur votre fonction de reproduction sont en cours. Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'élevés indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être réduite.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le **kétoprofène**. Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'aspirine.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris des médicaments obtenus sans ordonnance, car il y a certains médicaments qui ne doivent pas être pris ensemble et d'autres qui peuvent nécessiter une modification de la dose lorsqu'ils sont pris ensemble.

Vous devez toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou recevez l'un des médicaments suivants avant de

# Profenid® 100 mg

Kétoprofène

Compr. 100 mg  
ANTI-INFL.  
(M : Musc.)  
Ce médic.  
kétoprofène  
- en traite

PROFENID 100 MG

30 CP PEL

P.P.V : 70DH90



à 1180001060802

- certains rhumatismes inflammatoires chroniques,
- certaines arthroses sévères;
- en traitement de courte durée de :
- certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë),
- certaines inflammations des articulations par dépôt de cristaux, telles que la goutte,
- douleurs aiguës d'arthrose,
- douleurs lombaires aiguës,
- douleurs aiguës liées à l'irritation d'un nerf, telles que les sciatiques,
- douleurs et œdèmes liés à un traumatisme.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## Ne prenez jamais PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
- antécédent d'allergie au kétoprofène ou à l'un des constituants du produit,
- antécédent d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine, • antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS, • ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en évolution ou récidivant, • hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours, • maladie grave du foie, • maladie grave du rein, • maladie grave du cœur.

## Faites attention avec PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé :

### Mises en garde

CE MÉDICAMENT NE DOIT ÊTRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE.

Les médicaments tels que PROFENID pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses prescrites ni la durée de traitement. Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Précautions d'emploi

Comme il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement, il est important d'informer votre médecin avant de prendre PROFENID dans les cas suivants :

- antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de ce médicament peut entraîner une gêne respiratoire ou une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïden (cf. « Ne prenez jamais PROFENID

### lé ET DANS

DIENS.

l'ordien : le

SANOFI

100 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants.); • maladie du cœur (hypertension et/ou insuffisance cardiaque), du foie ou du rein, ainsi qu'en cas de rétention d'eau; • troubles de la coagulation, prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves :

- maladie inflammatoire chronique de l'intestin (telle que maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique); • antécédents digestifs (ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien); • traitement concomitant avec d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère gastroduodénal ou hémorragie, par exemple des glucocorticoïdes, des antidiépresseurs (ceux de type ISRS, c'est-à-dire Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine), des médicaments prévenant la formation de caillots sanguins tels que l'aspirine ou les anticoagulants tels que la warfarine. Si vous êtes dans un de ces cas, consultez votre médecin avant de prendre PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé (cf. « Prise ou utilisation d'autres médicaments »); • antécédents de réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV (cabine de bronzage). L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

### AU COURS DU TRAITEMENT, en cas :

- de signes d'infection ou d'aggravation des symptômes, PREVENIR VOTRE MEDECIN. Comme tout anti-inflammatoire non stéroïdien, le kétoprofène peut masquer les symptômes d'une infection sous-jacente (comme la fièvre); • de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE; • d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Si vous êtes une femme, PROFENID peut altérer votre fertilité. Vous ne devez donc pas prendre ce médicament si vous souhaitez concevoir un enfant, si vous présentez des difficultés pour procréer ou si des examens sur votre fonction de reproduction sont en cours. Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'élevés indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être réduite.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le **kétoprofène**. Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'aspirine.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris des médicaments obtenus sans ordonnance, car il y a certains médicaments qui ne doivent pas être pris ensemble et d'autres qui peuvent nécessiter une modification de la dose lorsqu'ils sont pris ensemble.

Vous devez toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou recevez l'un des médicaments suivants avant de

# Profenid® 100 mg

Kétoprofène

Compr. 100 mg  
ANTI-INFL.  
(M : Musc.)  
Ce médic.  
kétoprofène  
- en traite

- certains rhumatismes inflammatoires chroniques,
- certaines arthroses sévères;
- en traitement de courte durée de :
- certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë),
- certaines inflammations des articulations par dépôt de cristaux, telles que la goutte,
- douleurs aiguës d'arthrose,
- douleurs lombaires aiguës,
- douleurs aiguës liées à l'irritation d'un nerf, telles que les sciatiques,
- douleurs et œdèmes liés à un traumatisme.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## Ne prenez jamais PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
- antécédent d'allergie au kétoprofène ou à l'un des constituants du produit,
- antécédent d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine, • antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS, • ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en évolution ou récidivant, • hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours, • maladie grave du foie, • maladie grave du rein, • maladie grave du cœur.

## Faites attention avec PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé :

### Mises en garde

CE MÉDICAMENT NE DOIT ÊTRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE.

Les médicaments tels que PROFENID pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses prescrites ni la durée de traitement. Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Précautions d'emploi

Comme il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement, il est important d'informer votre médecin avant de prendre PROFENID dans les cas suivants :

- antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de ce médicament peut entraîner une gêne respiratoire ou une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïden (cf. « Ne prenez jamais PROFENID

PROFENID 100 MG

30 CP PEL

P.P.V : 70DH90



1180001060802

lé ET DANS

DIENS.

oïdien : le

SANOFI

100 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants.); • maladie du cœur (hypertension et/ou insuffisance cardiaque), du foie ou du rein, ainsi qu'en cas de rétention d'eau; • troubles de la coagulation, prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves :

- maladie inflammatoire chronique de l'intestin (telle que maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique); • antécédents digestifs (ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien); • traitement concomitant avec d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère gastroduodénal ou hémorragie, par exemple des glucocorticoïdes, des antidiépresseurs (ceux de type ISRS, c'est-à-dire Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine), des médicaments prévenant la formation de caillots sanguins tels que l'aspirine ou les anticoagulants tels que la warfarine. Si vous êtes dans un de ces cas, consultez votre médecin avant de prendre PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé (cf. « Prise ou utilisation d'autres médicaments »); • antécédents de réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV (cabine de bronzage). L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

AU COURS DU TRAITEMENT, en cas :

- de signes d'infection ou d'aggravation des symptômes, PREVENIR VOTRE MEDECIN. Comme tout anti-inflammatoire non stéroïdien, le kétoprofène peut masquer les symptômes d'une infection sous-jacente (comme la fièvre); • de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE; • d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Si vous êtes une femme, PROFENID peut altérer votre fertilité. Vous ne devez donc pas prendre ce médicament si vous souhaitez concevoir un enfant, si vous présentez des difficultés pour procréer ou si des examens sur votre fonction de reproduction sont en cours. Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'élevés indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être réduite.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le **kétoprofène**. Vous ne devez pas prendre en même temps ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'aspirine.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris des médicaments obtenus sans ordonnance, car il y a certains médicaments qui ne doivent pas être pris ensemble et d'autres qui peuvent nécessiter une modification de la dose lorsqu'ils sont pris ensemble.

Vous devez toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou recevez l'un des médicaments suivants avant de

LOT 212955

EXP 11 2025

PPV 46.70 DH

ZYLORIC® 100

300 mg, comprimés

OL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :**

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**Avertissements et précautions :**

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Etes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

l'allopurinol et contactez votre médecin.

• Si vous souffrez, passez dans les voies urinaires.

**Autres médicaments**  
Informez votre médecin si vous prenez ou pourriez prendre l'un des médicaments suivants :

- Aspirine
- Théophylline, utilisée pour traiter l'asthme.
- Médicaments utilisés pour traiter l'hypertension.
- Vadarabine (anti-virus).
- Didanosine, utilisée pour traiter l'HIV.
- Antibiotiques (ampicilline).
- Médicaments utilisés pour traiter les infections urinaires.
- Médicaments utilisés pour traiter les infections pulmonaires.
- Médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes.
- Médicaments utilisés pour traiter les infections virales.
- Médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques.
- Médicaments utilisés pour traiter les infections parasitaires.
- Médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes.
- Médicaments utilisés pour traiter les infections virales.
- Médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques.
- Médicaments utilisés pour traiter les infections parasitaires.

• Tout autre médicament.

Veuillez avertir votre médecin si vous avez récemment pris tout autre médicament sans ordonnance, y compris les plantes.

**Grossesse et allaitement**  
Si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement n'a pas été étudiée.

Si vous êtes enceinte, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, il est recommandé de ne pas le prendre pendant l'allaitement.

**Conduite de véhicules**  
Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, ou des nausées. Ne conduisez pas ou n'utilisez pas d'engins motorisés.

### Liste des excipients à éviter

Si votre médecin vous prescrit ce médicament, contactez votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament peut entraîner une intolérance au galactose, une malabsorption du glucose et du fructose.

### 3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC

Veuillez à toujours prendre ce médicament comme prescrit par votre médecin ou pharmacien.

Les comprimés doivent être pris avec de l'eau.

### Posologie

La posologie recommandée est de 300 mg par jour.

Les posologies recommandées sont les suivantes :

• Pour les adultes : 300 mg par jour.

• Pour les enfants : 15 mg/kg par jour.

• Pour les personnes âgées : 150 mg par jour.

• Pour les personnes avec insuffisance rénale : 150 mg par jour.

• Pour les personnes avec insuffisance hépatique : 150 mg par jour.

• Pour les personnes avec insuffisance cardiaque : 150 mg par jour.

LOT 212955

EXP 11 2025

PPV 46.70 DH

ZYLORIC® 100

300 mg, comprimés

OL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :**

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**Avertissements et précautions :**

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Etes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

l'allopurinol et conta-

• Si vous souffrez, passer dans les voie-

Autres médicame-

Informez votre méde-

pourriez prendre l'u-

• Aspirine

• Théophylline, utilise

• Médicaments utilisés

• Vidarabine (anti-vira

• Didanosine, utilisée

• Antibiotiques (ampic

• Médicaments utilisés

• Médicaments utilisés

• Médicaments pour

comme des IEC (inhib

diurétiques (pour élim

• Médicaments utilisés

warfarine

• Tout autre médicame

Veuillez avertir votre

récemment pris tout a

sans ordonnance, y co

Grossesse et allaien

Si vous êtes enceinte,

planifiez une grossesse

avant de prendre ce m

L'utilisation de ce mé

médecin, pendant la gr

En raison du passage

conseillé de ne pas pre

Conduite de véhicules

Dans de rares cas, la

ments, des vertiges, o

conduisez pas ou n'utili

### Liste des excipients à

Si votre médecin vous

contactez votre médecin

L'utilisation de ce médi

intolérance au galacto

malabsorption du glucos

3. COMMENT PRENDRE

Veuillez à toujours prendr

de votre médecin ou ph

doute.

Les comprimés doivent

repas.

**Posologie**

La posologie recommand

ure.

Les posologies recomma

Vous commencerez géné

cas échéant.

Si vous êtes âgé(e) ou s

médecin pourra vous pre

les prises du médicamen

semaine, votre médecin

devra être prise immédia

Utilisation chez les enf

Les posologies habituelle

**Mode et voie d'adminis**

Voie orale.

Les comprimés sont à a

repas.