

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-502090

116 881

Maladie       Dentaire       Optique       Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 862 Société :

Actif       Pensionné(e)       Autre

Nom & Prénom : SALIM ASMAHAN

Date de naissance :

Adresse :

Tél. 06 66 99 88 86 Total des frais engagés 1 Dhs

Cadre réservé au Médecin



Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : SALIM ASMAHAN Age:

Lien de parenté :  Lui-même       Conjoint       Enfant

Nature de la maladie : Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15.04.22	C	2	Docteur BENARDAS Enregistré le 18/04/22 Angélique Bénardas Num. Communiqué N°10, 1er étage N°117	INP : INP : 091019786
18.04.22	C 2	2	Docteur BENARDAS Enregistré le 18/04/22 Angélique Bénardas Num. Communiqué N°10, 1er étage N°117	INP : INP : 091019786

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Signature</i>	18/04/22	2330,20
<i>Signature</i>		
<i>Signature</i>		
<i>Signature</i>		

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>Signature</i>	15/04/22	B390F	390,20
<i>Signature</i>			
<i>Signature</i>			
<i>Signature</i>			

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

	COEFFICIENT DES TRAVAUX															
	MONTANTS DES SOINS															
	DEBUT D'EXECUTION															
	FIN D'EXECUTION															
	COEFFICIENT DES TRAVAUX															
	MONTANTS DES SOINS															
	DATE DU DEVIS															
	DATE DE L'EXECUTION															
DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																
<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		H	25533412	21433552	D	00000000	00000000		00000000	00000000	B	35533411	11433553	G		
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
	00000000	00000000														
B	35533411	11433553														
G																
<p>(Création, remont, adjonction) Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>																
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS																
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION																

Docteur. BENABBES TAARJI F.Z

## Endocrinologue - Diabétologue

Spécialiste en Diabétologie - Cholestérol

Traitement de l'Obésité - Maigreur

#### Glande Thyroïde - Surrénales - Seins - Stérilité

Diplômée de l'Université René Descartes Paris V

## Sur Rendez-Vous



الدكتورة ف. زين العباس (المعارجي)

إختصاصية في أمراض الغدد - السكري

## السمنة و الهرمونات

خريجة كلية الطب رونى ديكارت بباريس

الموعد

## ORDONNANCE

SALIM ASWAJEE

744.00

## Casablanca, le :

8.04.22

Lauter

68.80%

20 ut 62 en sc

3 miles

Amalya we

437,000  $\times 3$

Janet So/Levo

Mr. ———

MP 82

39

233°, 20  
PHAI

22  
PHARMACIE HAY EL HANA  
M. NIKI SOUTHI  
El Hay El Hana  
22 Sept 81

Docteur BENABRES TAARJI F.Z  
Endocrinologue - Diabète - Métabolisme  
10, rue de Rosny - 92110, 1er étage

teur BEN  
Endocrinologue  
Angle Riche 10  
Sidi Ali  
Imm Communal N°10, 1er Egypt 6

Angle Route d'Azemmour & Bd. Sidi Abderrahmane, Immeuble Communal 1<sup>er</sup> Etage (à gauche)  
Hay Hassani - Casablanca

Tél.: 0522 93 31 49 - GSM (Urgence) : 0522 90 07 85 / 0661 08 15 48 - E-mail : drbenabbes@hotmail.fr

Distribué par MSD MAROC.  
AMM N° : 268/19/DMP/21/NF  
P.P.V: 437,00 DH.



Distribué par MSD MAROC.  
AMM N° : 268/19/DMP/21/NRQ.  
P.P.V: 437,00 DH.



Distribué par MSD MAROC.  
AMM N° : 268/19/DMP/21/NRQ  
P.P.V: 437,00 DH.



**NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR****Amarel® 1 mg, comprimé****Amarel® 2 mg, comprimé****Amarel® 3 mg, comprimé****Amarel® 4 mg, comprimé****glimépiride****Sanofi-aventis Maroc****Route de Rabat -R.P.1,****Ain sebaâ Casablanca****Amarel 4 mg cp b 30****P.P.V : 68,80 DH****6 118001 081325**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'AMAREL et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMAREL
3. Comment prendre AMAREL
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver AMAREL
6. Informations supplémentaires.

## **1. QU'EST -CE QU'Amarel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ**

### **Classe pharmacothérapeutique**

AMAREL est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

### **Indications thérapeutiques**

AMAREL agit en augmentant la quantité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

### **Dans quel cas AMAREL est-il utilisé :**

AMAREL est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Amarel**

### **Contre-indications**

**Ne prenez jamais AMAREL et informez votre médecin :**

- Si vous êtes allergique : à glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicaments pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez un diabète insulinodépendant (diabète de type 1).
- En cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire).
- En cas de coma diabétique.
- Si vous avez une maladie grave de rein.
- Si vous avez une maladie de cœur, une maladie de la vue, une maladie de la peau.

cose-6-phosphate déshydrogénase (G6P) informations disponibles sur l'utilisation 18 ans sont limitées. Par conséquent, commandée.

**Informations importantes sur l'hypoglycémie** lorsque vous prenez AMAREL, une hypoglycémie (lorsque le taux de sucre dans le sang) peut survenir. Veuillez lire les informations sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser l'hypoglycémie :

- Malnutrition, horaires de repas irréguliers, manque de repas, période de jeûne.
- Modification du régime alimentaire.
- Prise de plus d'AMAREL que ce dont vous avez besoin.
- Fonction rénale diminuée.
- Maladie grave du foie.
- Si vous souffrez de troubles hormonaux de la glande thyroïde ou des glandes surrenales.
- Consommation d'alcool (en particulier avec certains médicaments).
- Prise de certains autres médicaments (notamment certains médicaments pour le diabète).
- Si votre activité physique est augmentée ou si vous mangez des aliments contenant de la sucre.

### **Les signes de l'hypoglycémie incluent :**

- Faim intense, maux de tête, nausées, vomissements, sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, difficultés à articuler, tremblements, paralysie, sensation de faiblesse.
- Les signes suivants peuvent également se produire : anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, douleur intense et soudaine dans la poitrine pouvant ressembler à une crise cardiaque (angine de poitrine) et troubles du rythme cardiaque, une perte de connaissance. Si votre taux de sucre dans le sang continue à diminuer, il peut entraîner un état confusionnel important (délire), des hallucinations, une perte de conscience, une perte de connaissance. Ces symptômes peuvent ressembler à une attaque cérébrale.

### **Traitements de l'hypoglycémie**

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent après l'ingestion de sucre : par exemple un verre de jus de fruit ou de jus de pomme sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces. Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital ou en cas de réapparition des symptômes.

### **Tests de laboratoire**

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines peut être mesuré. Votre médecin peut vous demander de faire des tests de laboratoire pour déterminer le nombre de cellules sanguines ainsi que votre taux de sucre dans le sang.

### **Enfants et adolescents**

L'utilisation d'AMAREL n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 18 ans.



**NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR****Amarel® 1 mg, comprimé****Amarel® 2 mg, comprimé****Amarel® 3 mg, comprimé****Amarel® 4 mg, comprimé****glimépiride****Sanofi-aventis Maroc****Route de Rabat -R.P.1,****Ain sebaâ Casablanca****Amarel 4 mg cp b 30****P.P.V : 68,80 DH****6 118001 081325**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'AMAREL et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMAREL
3. Comment prendre AMAREL
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver AMAREL
6. Informations supplémentaires.

## **1. QU'EST -CE QU'Amarel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ**

### **Classe pharmacothérapeutique**

AMAREL est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

### **Indications thérapeutiques**

AMAREL agit en augmentant la quantité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

### **Dans quel cas AMAREL est-il utilisé :**

AMAREL est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Amarel**

### **Contre-indications**

**Ne prenez jamais AMAREL et informez votre médecin :**

- Si vous êtes allergique : à glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicaments pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez un diabète insulinodépendant (diabète de type 1).
- En cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire).
- En cas de coma diabétique.
- Si vous avez une maladie grave de rein.
- Si vous avez une maladie de cœur, une maladie de la vue, une maladie de la peau.

cose-6-phosphate déshydrogénase (G6P) informations disponibles sur l'utilisation 18 ans sont limitées. Par conséquent, commandée.

**Informations importantes sur l'hypoglycémie** lorsque vous prenez AMAREL, une hypoglycémie (lorsque le taux de sucre dans le sang) Veuillez lire les informations sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser l'hypoglycémie :

- Malnutrition, horaires de repas irréguliers, manque de repas, période de jeûne.
- Modification du régime alimentaire.
- Prise de plus d'AMAREL que ce dont vous avez besoin.
- Fonction rénale diminuée.
- Maladie grave du foie.
- Si vous souffrez de troubles hormonaux de la glande thyroïde ou des glandes surrenales.
- Consommation d'alcool (en particulier avec des repas).
- Prise de certains autres médicaments (notamment certains diurétiques et certains médicaments contre l'hypertension).
- Si votre activité physique est augmentée et que vous mangez des aliments contenant de la sucre.

### **Les signes de l'hypoglycémie incluent :**

- Faim intense, maux de tête, nausées, vomissements, sommeil, agitation, agressivité, difficultés à parler, difficultés à articuler, tremblements, paralysie, sensation de faiblesse.
- Les signes suivants peuvent également se produire : anxiété, accélération du pouls, hypertension, douleur et soudaine dans la poitrine pouvant se propager à l'épaule, (angine de poitrine et troubles du rythme cardiaque). Si votre taux de sucre dans le sang continue à diminuer, il peut entraîner un état confusionnel important (délire), défaillance de la conscience, une respiration courte et rapide, une faiblesse cardiaque, une perte de connaissance. Ces symptômes peuvent ressembler à une attaque cérébrale.

### **Traitements de l'hypoglycémie**

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent après l'ingestion de sucre : par exemple un verre de jus de fruit ou de jus de pomme sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces. Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital ou en cas de réapparition des symptômes.

### **Tests de laboratoire**

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines peut être mesuré. Votre médecin peut vous demander de faire des tests de laboratoire pour déterminer le nombre de cellules sanguines ainsi que votre taux de sucre dans le sang.

### **Enfants et adolescents**

L'utilisation d'AMAREL n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 18 ans.

**NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR****Amarel® 1 mg, comprimé****Amarel® 2 mg, comprimé****Amarel® 3 mg, comprimé****Amarel® 4 mg, comprimé****glimépiride****Sanofi-aventis Maroc****Route de Rabat -R.P.1,****Ain sebaâ Casablanca****Amarel 4 mg cp b 30****P.P.V : 68,80 DH****6 118001 081325**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'AMAREL et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMAREL
3. Comment prendre AMAREL
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver AMAREL
6. Informations supplémentaires.

## **1. QU'EST -CE QU'Amarel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ**

### **Classe pharmacothérapeutique**

AMAREL est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

### **Indications thérapeutiques**

AMAREL agit en augmentant la quantité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

### **Dans quel cas AMAREL est-il utilisé :**

AMAREL est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Amarel**

### **Contre-indications**

**Ne prenez jamais AMAREL et informez votre médecin :**

- Si vous êtes allergique : à glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicaments pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez un diabète insulinodépendant (diabète de type 1).
- En cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire).
- En cas de coma diabétique.
- Si vous avez une maladie grave de rein.
- Si vous avez une maladie de cœur, une maladie de la vue, une maladie de la peau.

cose-6-phosphate déshydrogénase (G6P) informations disponibles sur l'utilisation 18 ans sont limitées. Par conséquent, commandée.

**Informations importantes sur l'hypoglycémie** lorsque vous prenez AMAREL, une hypoglycémie (lorsque le taux de sucre dans le sang) peut survenir. Veuillez lire les informations sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser l'hypoglycémie :

- Malnutrition, horaires de repas irréguliers, manque de repas, période de jeûne.
- Modification du régime alimentaire.
- Prise de plus d'AMAREL que ce dont vous avez besoin.
- Fonction rénale diminuée.
- Maladie grave du foie.
- Si vous souffrez de troubles hormonaux de la glande thyroïde ou des glandes surrenales.
- Consommation d'alcool (en particulier avec certains aliments).
- Prise de certains autres médicaments (notamment certains diurétiques et certains médicaments contre l'hypertension).
- Si votre activité physique est augmentée ou si vous mangez des aliments contenant de la sucre.

### **Les signes de l'hypoglycémie incluent :**

- Faim intense, maux de tête, nausées, vomissements, sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, difficultés à articuler, tremblements, paralysie, sensation de faiblesse.
- Les signes suivants peuvent également se produire : anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, douleur intense et soudaine dans la poitrine pouvant évoquer une crise cardiaque (angine de poitrine) et troubles du rythme cardiaque, une perte de connaissance. Ces symptômes peuvent ressembler à une attaque cérébrale.

### **Traitements de l'hypoglycémie**

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent après l'ingestion de sucre : par exemple un verre de jus de fruit sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces. Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital ou en cas de réapparition des symptômes.

### **Tests de laboratoire**

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines peut être mesuré. Votre médecin peut vous demander de faire des tests de laboratoire pour déterminer le nombre de cellules sanguines ainsi que votre taux de sucre dans le sang.

### **Enfants et adolescents**

L'utilisation d'AMAREL n'est pas recommandée chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

**Notice :**  
**Information pour l'utilisateur**



**100 unités/ml**  
**solution injectable en stylo**  
insuline glargin

**sanofi-aventis Maroc**

Route de Rabat - R.P.1-

Ain Sebaa 20250 - Casablanca

LANTUS SOLOSTAR 100U/ML SOL INJ BS

P.P.V. : 744DH00



6 118 001 081615

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Veuillez également lire le mode d'emploi de Lantus SoloStar, stylo prérempli, avant d'utiliser ce médicament.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Adressez-vous à votre ou à votre infirmier/ Respectez attentivement le médecin concernant les analyses de sang et l'activité physique. La technique d'injection de votre glycémie est suivie les conseils en l'encadré à la fin de ce

**Voyages**

Avant de partir en voyage, pour vous informer sur :

- disponibilité de votre médicament dans le pays où vous allez,
- fourniture d'insuline dans ce pays,
- conservation adéquate de l'insuline pendant le voyage,
- horaire des repas et de l'insuline pendant le voyage,
- effets possibles du changement d'horaire,
- nouveaux risques d'hypoglycémie dans les pays visités,
- ce que vous devez faire en cas d'urgence lorsque vous êtes malade.

**Maladies et blessures**

Dans les situations suivantes, la gestion de votre diabète peut nécessiter des précautions (par exemple, l'ajustement de l'insuline, les analyses de sang, etc.).

- Si vous êtes malade, la glycémie peut être importante, votre glycémie peut être élevée (hyperglycémie).
- Si vous ne vous sentez pas bien, la glycémie peut être élevée (hyperglycémie).





## ORDONNANCE

Nom : Salim Asmathane Casablanca, le : 15.04.20

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> NFS                         | <input type="checkbox"/> Prot.C.R                   |
| <input type="checkbox"/> Fer sérique                 | <input type="checkbox"/> Cholestérol Total          |
| <input type="checkbox"/> Ferritine                   | <input type="checkbox"/> Triglycérides              |
| <input type="checkbox"/> Groupage + rhésus           | <input type="checkbox"/> HDL-Cholestérol            |
| <input type="checkbox"/> VS                          | <input type="checkbox"/> LDL-Cholestérol            |
| <input type="checkbox"/> Tonogramme sanguin          | <input type="checkbox"/> Acide urique sanguin       |
| <input checked="" type="checkbox"/> GOT/GPT/GT       | <input type="checkbox"/> T3                         |
| <input type="checkbox"/> Urée sanguine               | <input type="checkbox"/> T4 LABORATOIRE<br>REGRAGUI |
| <input checked="" type="checkbox"/> Créatinémie      | <input type="checkbox"/> TSH                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Glycémie à jeûn  | <input type="checkbox"/> ECBU                       |
| <input type="checkbox"/> Glycémie post prandiale     | <input type="checkbox"/> Autres: _____              |
| <input checked="" type="checkbox"/> HbA1c            |   |
| <input type="checkbox"/> Albuminurie                 |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Microalbuminurie |   |



Dr. BENABBES TAARJI F.Z  
L'Amal - 10ème étage - 1000 Casablanca  
Av. Hassan II - 2000 Casablanca  
Bd. Sidi Abderrahmane  
Bureau Communal N° 20, 2er Etg Appt 62

Dr. BENABBES TAARJI F.Z  
Endocrinologue - Diabétologue  
Angle Route d'Azemmour  
Immeuble Communal 1<sup>er</sup> Etage  
Casablanca - Tél : 0522 93 31 49



مختبر التحاليل الطبية الرگراگي  
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES REGRAGUI

S. MESTASSI  
Biologiste Diplomé de la faculté  
De Médecine et de Pharmacie  
de Clermont Ferrand

**FACTURE N° :** 2204152013

Casablanca le 15-04-2022

**Mme Asmahane SALIM**

Date de l'examen : 15-04-2022

INPE :

Caisse : **MUPRAS**



Analyses :

Récapitulatif des analyses				
CN	Analyse	Clé	Clé	Total
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	E11.5	E	11.50 MAD
0111	Créatinine	B30	B	26.70 MAD
0141	Gamma glutamyl transférase ( GGT)	B50	B	44.50 MAD
0118	Glycémie	B30	B	26.70 MAD
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B	89.00 MAD
0484	Microalbumine de 24H par immunonephélemétrie	B120	B	106.80 MAD
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B	44.50 MAD
0147	Transaminases P (TGP)	B50	B	44.50 MAD
<b>Total</b>				<b>394.20 MAD</b>

**TOTAL DOSSIER : 390DH**

Arrêtée la présente facture à la somme de : trois cent quatre-vingt-dix dirhams



رقم الملف: 2204152013  
جامعة تونس - كلية طب و الصيدلة  
كلية الصيدلة - رئاسة الصيدلة  
رقم الملف: 2204152013



Né (e) le: 01-01-1954, âgé (e) de : 68 ans  
Enregistré le: 15-04-2022 à 11:33  
Edité le: 16-04-2022 à 13:19  
Prélèvement : au labo  
Le : 15-04-2022 à 10:45

Mme Asmahane SALIM

Référence : 2204152013


Prescrit par : Dr Benabbes Taarji F. Z.

**BIOCHIMIE SANGUINE** (Cobas c311/Roche)

05-01-2022


Glycémie à jeûn 1.34 g/l (0.70-1.10)  
7.4 mmol/l (3.9-6.1)

1.09  
6.0



Hémoglobine glycosylée (HPLC /D10.Biora) 8.30 % (3.50-6.25)

7.50




Interprétation:  
Glycémie proche de la normale : 6.7  
Bon contrôle : 7-8  
Métabolisme mal équilibré : >8



Créatinin sanguine (Enzymatique / Cobas c311) 5.4 mg/l (5.0-11.0)  
48 µmol/l (44-98)

4.9  
44



↑ Sip →

Compte rendu imprimé en **recto verso** ; prière de tourner la page si nécessaire

Page 1 sur 2