

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

117847
Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 737

Société : Royal air Maroc

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HASSANE

Mohamed

Date de naissance : 01-01-1947

Adresse : Bloc 1 Rue 14 N° 19 Mg Rachid 1

Boumazel

Casablanca

Tél. : 06 40 35 29 55

Total des frais engagés : 5686,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

DOCTEUR HARI MOHAMED
CHIRURGIEN
24, Rue Alloussi - Bourgogne
(Face Clinique BADR) - Casablanca
Tél.: 05 22 27 07 79 / 05 22 22 32 83
INP : 91073940

Cachet du médecin :

Date de consultation : 23 AVR 2022

Nom et prénom du malade : Moussem Mohamed Age: 1947

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Célectomie gauche

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23/05/2022 Dr HABIBI SS - Casablanca ADDO - Casablanca 19/05/2022 07394 07394	Cr	1	200	<p><u>DR HABIBI</u></p> <p><u>Mohamed HARIT</u></p> <p><u>CHIRURGIEN</u></p> <p><u>24, Rue Moussia BADR - Casablanca</u></p> <p><u>(Face Clinique BADR)</u></p> <p><u>Tél. : 05 22 21 07 79 / 05 22 21 07 79</u></p> <p><u>INP : 91073222</u></p>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
D Télé 02 (Février 2022)	23/4/22	836,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D ————— G 00000000 00000000 35533411 11433553 B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION			

22,00 y cedol CP
142x15



2) AD Ditive CP

79,00 142 le matin



Docteur HARIET Mohamed
CHIRURGEN
24, Rue Aïlouss - Casablanca
(Face Clinique Bellvit) - Casablanca
Tél.: 05 22 27 07 70 / 05 22 22 32 83
INP : 91073940

836,40

MARCHEVIE EL TUCOUR SIDI KENZA
32, Bd LA GIBONDE - CASABLANCA
Tél. : 05 22 44 06 40

Docteur HARIT Mohamed

- Ancien Interne des Hôpitaux
- Ancien Chirurgien à l'Hôpital Averroès
- Ancien Chef de Service de Chirurgie à l'Hôpital Sidi Soufi

- Chirurgie Biliaire et Digestive
- Chirurgie Gynécologique et Proctologique
- Chirurgie du Sein et de la Thyroïde
- Coelio Chirurgie - Chirurgie de l'Obésité
- Chirurgie des Varices
- Chirurgie Cancérologique
- Chirurgie Colo-Rectale

Tél.: 05 22 27 07 79 / 05 22 22 32 83

05 22 26 91 51
CASABLANCA

Consultation de 15h à 19h

Casablanca le : 23/04/2022 الدار البيضاء في

MRI Maessam Mohamed

Practiseur de la Cestane N°80



Cabinet : 24, Rue Al Alloussi - (face clinique 'BADR')

في حالة الاستعجال الاتصال بمصحة بدرا :

CLINIQUE BADR : 35, Rue Al Alloussi - (face mosquée BADR) - Tél.: 05 22 49 28 00

الدكتور حارث محمد

- داخلي سابق بمستشفيات المغرب
- جراح سابق بمستشفى ابن رشد
- رئيس سابق بقسم الجراحة
- بمستشفى سيدى الصوفى

- الجراحة بالمنظار
- جراحة السمنة
- جراحة القنوات المرارية
- جراحة الجهاز الهضمي والبواسير
- جراحة الثدي والغدة الدرقية

الهاتف : 05 22 27 07 79 / 05 22 22 32 83

05 22 26 91 51

الدار البيضاء



Najad Import

Importation , Distribution Et Vente De Matériel
Et Fourniture Médical Et Paramédical

FACTURE

0303-006-022

Code Client	DATE	Règlement	BL N°
	-02/06/2022		

MOUSSAM MOHAMED

Référence	Description	Qté	Prix Unitaire TTC	Total
	POCHÈ COLOSTOMIE AVEC SUPPORT	65	70,00	4 550,00
LES ARTICLES VENDUS NE PEUVENT ETRE RETOURNÉS				
	TOTAL TTC MAD			4 550,00
	DONT TVA 20%			758,33
<p><u>Arrêtée la présente Facture à la somme TTC de:</u> QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE DIRHAMS</p>				

NAJAD IMPORTATION
VENTE MATERIEL MEDICAL
Projet Hassan II Imm. B2 Mag 5
Zone I, Hcp Mohamed Vidi - Casablanca
Tel: 05 22 60 20 16 - 05 22 60 20 19

Capital : 300.000,00 Dh



05 22 60 20 16



najad.import1@gmail.com

05 22 60 20 15

ICE:000010480000086

IF: 14496107

CNSS: 9981665

PATENTE: 31990660

RC: 300439

Projet Hassan II Imm B2 Mag 5 Zone I HM Casablanca



Multivitamines

+Minéraux
+Oligo-Éléments

Comprimés effervescents

Complément alimentaire,
n'est pas un médicament,
avec des édulcorants.

**Sans
Sucré**

Vitamine C	Participe à la constitution des os, du cartilage, du tissu conjonctif et des dents, augmente la résorption du fer.
Vitamine E	Participe à la constitution des membranes cellulaires.
Minéraux et oligo-éléments:	
Calcium	Élément important pour la formation de la structure osseuse et pour la fonction musculaire.
Magnésium	Participe à la constitution de la substance osseuse et des tendons. Élément entrant dans la composition de nombreuses enzymes qui interviennent dans le métabolisme des protéines, des lipides et des glucides.
Fer	Participe au transport de l'oxygène dans le sang et dans les muscles ainsi qu'au métabolisme énergétique.
Zinc	Élément entrant dans la composition de nombreuses enzymes.
Cuivre	Élément entrant dans la composition de nombreuses enzymes, soutient la croissance.
Sélénium	Favorise le métabolisme cellulaire.

Composition des vitamines, minéraux et oligo-éléments selon l'exemple Additiva
Comprimés effervescents Multivitamines + Minéraux + Oligo-éléments, goût orange,
mangue, pêche et mandarine.

	pour 100 g	par comprimé dissous (4,3 g)	% AJR* par comprimé
Vitamine A	18605 µg RE	800 µg RE	100
Vitamine B1	32,6 mg	1,4 mg	100
Vitamine B2	37,2 mg	1,6 mg	100
Vitamine B6	46,5 mg	2,0 mg	100
Vitamine B12	23,3 µg	1,0 µg	100
Nicotinamide	419 mg NE	18,0 mg NE	100
Acide pantothénique	140 mg	6,0 mg	100
Acide folique	4651 µg	200 µg	100
Biotine	3488 µg	150 µg	100
Vitamine C	1395 mg	60,0 mg	100
Vitamine E	69,8 mg α-TE	3,0 mg α-TE	30
Calcium	2791 mg	120 mg	15
Magnésium	1047 mg	45,0 mg	15
Fer	48,8 mg	2,1 mg	15
Zinc	105 mg	4,5 mg	30
Cuivre	11628 µg	500 µg	—
Sélénium	1163 µg	50,0 µg	—

*AJR = l'apport journalier recommandé

Fabriqué par:

Dr. B. Schöffler Nachf.
GmbH & Co. KG
51469 Bergisch Gladbach
Made in Germany

Importé par:

Les Laboratoires
AFRIC-PHAR
Siège social: 134, Allée des
Mimosas, Aïn Sebaâ 20590
Casablanca - Maroc

Conseil d'utilisation:

Prendre un comprimé par jour dans un verre d'eau, donne une boisson savoureuse et rafraîchissante.

Additiva Comprimés effervescents Multivitamines + Minéraux + Oligo-éléments existe en plusieurs goûts: orange, mandarine, pêche et mangue.

L'AJR indiqué ne devrait pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié. Stocker hors de portée des enfants.

Dr. Scheffler®

FLOXAM®

(FLUCLOXACILLINE)

Penicilline insensible à la penicilline

FLOXAM®

24 gélules 500 mg



6 118000 031420

PRESENTATIONS :

- Boîte de 16 gélules à 500 mg
- Boîte de 24 gélules à 500 mg
- Flacon de 12 doses de poudre pour 60 ml de suspension
- Flacon de 20 doses de poudre pour 100 ml de suspension
- Boîte de 1 flacon de poudre à 500 mg + 1 ampoule de benzylrique à 3 %
- Boîte de 1 flacon de poudre à 1 g + 1 ampoule de solvant à 3 %
- Boîte de 1 flacon de poudre à 250 mg + 1 ampoule de solvant à 3 %
- Boîte de 6 flacons de poudre à 1 g + 6 ampoules de solvant à 3 %

COMPOSITION :

- Gélules à 500 mg :

Flucloxacilline (DCI) 500 mg (sous forme de sel sodique)
Excipient qs 1 gélule.

- Poudre pour suspension buvable à 250 mg / 5 ml sans sucre :

Flucloxacilline (DCI) 250 mg (sous forme de sel sodique)
Excipient qsp 6,5 g de poudre par flacon de 12 doses et 1 ampoule de 3 ml de solvant eau.

- Injectables à 250 mg :

Flacon de poudre contenant 250 mg de Flucloxacilline (DCI) (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 3 ml de solvant eau pour préparations injectables.

- Injectables à 500 mg :

Flacon de poudre contenant 500 mg de Flucloxacilline (DCI) (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 5 ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzylique à 3 %

- Injectables à 1 g :

Flacon de poudre contenant 1 g de Flucloxacilline (DCI) (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 5 ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzylique à 3 %

PROPRIETES :

Antibiotique de la famille des bêta-lactamines du groupe des pénicillines isoxazoles semi-synthétiques, résistant à la pénicillinase staphylococcique ainsi qu'à l'acidité gastrique.

La Flucloxacilline est bactéricide. Elle agit au niveau de la synthèse de la paroi bactérienne.

Spectre d'activité : c'est avant tout un anti-staphylococcique, actif sur : *staphylococcus aureus*, *staphylococcus epidermidis*, *streptococcus pyogenes*, *streptococcus pneumoniae*, *s. viridans*, *clostridium spp*, *bacillus anthracis*, *neisseria spp*

La Flucloxacilline diffuse largement dans les tissus. Elle est retrouvée dans le muscle, les poumons, les liquides d'épanchement péricardique, pleural, synovial, la lymphe, l'abcès non caséux, le tissu sous-cutané, les amygdales, l'os et l'oreille moyenne.

INDICATIONS :

Découlent de son activité bactéricide anti-staphylococcique.

Son intérêt réside dans les staphylococcies cutanées, muqueuses, et les localisations de la sphère ORL.

Prophylaxie des infections post-opératoires (chirurgie cardio-thoracique et orthopédique).

Dans les infections pleuro-pulmonaires, ostéoarticulaires, les septicémies, les endocardites, le choc septique et les infections méningées, une association est habituellement conseillée.

Ce médicament ne contenant pas de sucre, il peut être administré au diabétique et en cas de mauvais état dentaire ou de régime hypocalorique.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Voie orale : (1/2 heure avant les repas)

Adultes : 500 mg 3 à 4 fois / 24 heures

Enfants et Nourrissons : 25 à 50 mg/kg/jour en 2 à 3 prises, soit une cuillerée-mesure dosée à 250 mg / 5 ml 2 à 3 fois par jour

Nouveaux-nés : 25 à 50 mg/kg/jour en 2 à 3 prises : soit une demie-cuillerée-mesure dosée à 250 mg/5 ml 2 à 3 fois par jour.

Réparation de la suspension :

Agiter le flacon de poudre avant d'ajouter de l'eau minérale non gazeuse ou de l'eau bouillie refroidie jusqu'au trait de jauge.

Agiter, compléter avec de l'eau jusqu'au trait, puis agiter de nouveau

La suspension reconstituée doit être conservée au réfrigérateur (entre +2°C et + 8° C), et utilisée :

- dans les 8 jours pour le flacon de 60 ml
- dans les 14 jours pour le flacon de 100 ml.

Voie injectable :

Adultes : 1 g 2 fois / 24 heures

Enfants et Nourrissons : 25 à 50 mg kg/24 heures en 2 prises.

Dans les infections sévères, ces posologies peuvent être augmentées : (voies I.M et I.V)

- Adultes : 100 mg/kg/jour jusqu'à 8 g /jour en 4 à 6 prises
- Enfants et nourrissons : 50 à 100 mg /kg /jour en 4 à 6 prises
- Nouveaux-nés : 50 mg /kg /jour en 4 à 6 prises.

Le sujet âgé : Aucun ajustement de la posologie n'est nécessaire à moins d'une insuffisance rénale connue. FLOXAM® injectable peut être utilisé par voie I.V (directe lente ou en perfusion) en diluant dans l'eau pour préparation injectable, (1 g dans 20 ml), la poudre de FLOXAM® contenue dans le flacon.

Ne pas utiliser par voie intraveineuse le solvant intramusculaire.

CONTRE-INDICATIONS :

La Flucloxacilline est contre indiquée chez les malades présentant une hypersensibilité aux pénicillines et aux céphalosporines. Son administration nécessite un interrogatoire préalable confirmant l'absence de réactions antérieures à un traitement par les pénicillines.

La Flucloxacilline ne doit pas être administrée en injection sous conjonctivale.

EFFETS INDESIRABLES :

- Manifestations allergiques : érythème, urticaire, rhinite, éruption cutanée morbilliforme, rarement choc anaphylactique.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, rarement colite pseudo-membraneuse.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE :

Poudre pour suspension buvable : Aspartam.

Sodium total : environ 22 mg de sodium par dose de 5 ml.

Poudre injectable à 250 mg : environ 12,94 mg de sodium par flacon.

Poudre injectable à 500 mg : environ 25,87 mg de sodium par flacon.

Poudre injectable à 1 g : environ 51,75 mg de sodium par flacon.

A CONSERVER A L'ABRI DE LA CHALEUR ET DE L'HUMIDITE

Ceci est un médicament.

Un médicament n'est pas un produit comme les autres.

Il vous concerne, vous et votre santé.

Le médicament est un produit actif.

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger.

Il ne faut jamais abuser des médicaments.

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient.

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin.

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin.

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative.

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils.

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante.

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin.

NE LAISSEZ PAS LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

LABORATOIRES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES D'AFRIQUE DU NORD

LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca.

201102F56293P020604

22,00

Cédol®

PARACÉTAMOL + CODEINE

Cédol®

20 Comprimés



6 118000 180913

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Paracétamol	400,00 mg
Phosphate de codéine hémihydratée	20,00 mg
(Quantité correspondante en codéine base)	14,8 mg
Excipients q.s.p.	un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 20.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N. Système nerveux central)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée à intense, qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants:

- allergie connue au paracétamol ou à la codéine,
- maladie grave du foie,
- chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire,
- Allaitement

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable.
Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine ou la pentazocine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine. D'autres médicaments en contiennent.
Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).

GROSSESSE - ALLAITEMENT

GROSSESSE

L'utilisation ponctuelle et aux doses recommandées de ce médicament peut être envisagée au cours de la grossesse si besoin. Cependant, en fin de grossesse, la prise abusive de codéine peut entraîner un effet néfaste chez le nouveau-né. Par conséquent, il convient de toujours demander l'avis de votre médecin avant de prendre ce médicament et de ne jamais dépasser la dose recommandée.

ALLAITEMENT

Ce médicament passe dans le lait maternel. De fortes doses de codéine administrées chez les femmes qui allaitent peuvent entraîner des pauses respiratoires ou des baisses de tonus du nourrisson. En conséquence, la prise de ce médicament est contre-indiquée pendant l'allaitement.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

L'attention est attirée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur la possibilité de somnolence attachée à l'usage de ce médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE

CÉDOL EST RESERVE A L'ADULTE

1 comprimé à renouveler en cas de besoin au bout de 4 à 6 heures, éventuellement 2 comprimés en cas de douleur sévère, sans dépasser 6 comprimés par jour.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE. IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS. NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale. Les comprimés sont à avaler avec un verre d'eau.

FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

Les prises doivent être espacées de 6 heures, et 4 heures au minimum. En cas de douleur persistante, les prises systématiques permettent d'éviter les pics de douleur. En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures au minimum.

DUREE DU TRAITEMENT

Si la douleur persiste plus de 4 à 5 jours, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Prévenir un médecin rapidement.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS

- Liés à la présence de codéine : constipation, nausées, vomissements, somnolence, vertiges, gêne respiratoire, réactions cutanées.

- Liés à la présence de paracétamol: dans certains cas rares, il est possible que survienne une réaction allergique avec une éruption sur la peau : il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

- Exceptionnellement taux anormalement bas de certains éléments du sang (plaquettes), pouvant se manifester par des saignements du nez ou des gencives.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.



Laboratoires **SYNTHEMEDIC**
20-22, Rue Zoubeir bnou El Aouam
Roches Noires Casablanca