

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- N° 004821

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 889 Société : Reraite

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : Jarbouy Omar

Date de naissance : 23 07 47

Adresse : Haye Mourad Bloc 9 IMM 1

Bd EL Fouarate Haye Mohammadi edsa

Tél. : 0657930385 Total des frais engagés : 918,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin Dr. OUAJDI Soukaina

Cachet du médecin :

Medicine Générale
Hay Adil Rue 9 N°120, H.M.
Casablanca
Tél: 05 22 61 61 30

Date de consultation : 06/04/2022

Nom et prénom du malade : HADOUR FATMA

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Signature de l'adhérent(e) : Le : 15/04/2022

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Docteur Soukaina OUAJDI

Médecine générale

Diplômé de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie de Casablanca

Echographie

Suivi de grossesse

Hypertension artérielle

Diabète

Echographie de la thyroïde



05 22 61 61 30

الدكتورة سكيانة واجدي

الطب العام

خريجة كلية الطب والصيدلة
بالدار البيضاء

الفحص بالصدى

تتبع الحمل

الضغط الدموي

داء السكري

فحص الغدة الدرقية

Le : 15/04/2022

Mme HADOUT FATIMA

① D₃ Bort 20000 N°3

20/90/130 1mg 15/04
15/05
99,00 15/07

S.V)

PHARMACIE JANQUERE
Houadja Soukaina
Docteur en Pharmacie
39, Rue du Général La Villette
H.M. Casablanca Tél. 05 22 61 69 50

② Xénorene 2 22/7 tt de 1 mois
399,00

③ Galvus Met 50/1000

126,30 1 - 0 - 1 tt de 3 mois

④ Argentin 1g
15 x 2/7

Dr. OUAJDI Soukaina
Médecine Générale
Hay Adil Rue 9 N°120, H.M.
05 22 61 61 30

⑤ Oedex Long 100, 56
140, 00

140, 00
PHARMACIE JANQUIERE
Halima Moustakim
Docteur en Pharmacie
39, Rue Ben Ammi, La Villette
H.M. Casablanca Tél. 05 22 61 69 56

⑥ Brexin 2
100, 00 140, 00
18, 00

Dr. OUAJDI Soukaina
Médecine Générale
Hay Adil Rue 9 N°120, H.M.
Casablanca
Tél: 05 22 61 61 61



AUGMENTIN

1 g/125 mg, AUGUTES, poudre pour suspension

AUGMENTIN

500 mg/52.5 mg AUGUTES, comprimé pellicule

Amoxicilline/acide clavulanique

Vous lirez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information au médecin ou au pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit (ou a été prescrit à votre enfant). Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en au médecin ou au pharmacien.

10.2023
KEH50
11.2021



ZENITH Pharma
AMM N° 171/16 DMP/21/NNPR

PPV: 20,90 DH



Galvus Met 50 mg/1000 mg

Boîte de 60 comprimés pelliculés

PPV : 390,00 DH

ZENITH Pharma
AMM N° 171/16 DMP/21/NNPR

PPV : 20,90 DH



ZENITH Pharma
AMM N° 171/16 DMP/21/NNPR

PPV : 20,90 DH



LOT 21009
PER 06/24
PPV 100DH40



FAB:
EXP:
N° de lot:

002021
002024



8 594064 070267

UT.AV. :

LOT N° :

LOT: 211147
PER: 04-2024
PPV: 140,00DH

Si vous prenez de l'alopurinol (en traitement de la goutte) avec AUGMENTIN, le risque de réaction cutanée est accru.

contient de l'aspartame (pour les personnes souffrant d'hypoglycémie)
AUGMENTIN
Ne conduire.
AUGMENTIN
Conduite
AUGMENTIN
médicament
une grosse
Si vous êtes
Si vous êtes
Grossesse
rejet de grossesse
AUGMENTIN
cancer ou
AUGMENTIN
pris avec AUGMENTIN
Si des médicaments
Si des médicaments
Si des médicaments



Créatinine sérique
Spectrophotométrie (Architect ci4100)7,23 mg/L
63,90 µmol/L6 à 11
50.4 à 98.10

22/07/19

5,57

49,21

22/07/19

10,20

Hémoglobine A1C

12,30 %

Méthodologie certifiée et standardisée NGPS/DCCT
Critères d'interprétation des résultats:

4 - 6	Intervalle non diabétique
6,5	Excellent équilibre glycémique (Type2)
7	Excellent équilibre glycémique (Type1)
8 - 9	Assez bon équilibre glycémique
9 - 10	Equilibre glycémique médiocre: Action corrective suggérée
> 10	Mauvais équilibre glycémique

Cholestérol
Spectrophotométrie (Architect ci4100)

2,88 g/L

inf. à 2,00

22/07/19

3,10

Triglycérides
Spectrophotométrie (Architect ci4100)

1,86 g/L

0,35 à 1,59

22/07/19

2,91

Epreuves

✓ Clairance de la Créatinine

Volume des urines de 24 h

1 500 mL

Débit urinaire

1,04 mL/mn

22/07/19

Créatinine sérique

63,90 µmol/L

50.4 à 98.10

49,21

Créatinine urinaire

5,68 mmol/L

5.6 à 15.13

22/07/19

8,30

Clairance

93 mL/mn

100 à 140

Vitamines

Valeurs de référence

Antécédents

Vitamine D2/D3

13,0 ng/mL

22/07/19

9

Déficit : < 20 ng/ml
 Carence : 20 - 29 ng/ml
 Normale : 30 - 100 ng/ml
 Toxicité : > 100 ng/ml

Validé le 14/04/22

Dr. Abdelhakim HADOU
 19/04/2022 14:00
 71 192





Institut Pasteur
du Maroc

Directeur

Pr A. MAAROUFI

Biologie

Dr A. Bellik

Dr S. Kacimi

Dr J. Nouril

Dr D. Messaoudi

Dr N. Dersi

Dr A. Bennani

Dr S. Bennani

Dr A. Anah

Dr H. Mohammadi

Dr S. EZZIKOURI

TANGER

Dr W. Oudina

Dr O. Mourtada

Anatomie-cytopathologie

Dr A. Oukadi

Dr K. Mounma

Cytogénétique

Dr S. Nasserddine

dr ouajdi soukaina

Madame HADOU FATIMA
Demande n° 12/04/22-1-0052

20000 CASABLANCA

Date et heure d'enregistrement : 12/04/22 13H38

Date et heure de prélèvement : 12/04/22 13H45

Date de naissance : 02/02/1956

Hors tiers payant -

Demande n° 12/04/22-1-0052 -RAM-
Edité le : vendredi 15 avril 2022
N° CIN/Passeport B424428

Hématologie

✓ Hémogramme

MINDRAY BC-6800

		Valeurs de référence	Antériorités
Hématies	4 800 000 /mm3	3 800 000 à 5 800 000	22/07/19 4 760 000
Hémoglobine	14,2 g/100mL	11,5 à 16,0	13,7
Hématocrite	41,9 %	37,0 à 47,0	42,0
V.G.M.	87 µ3	80 à 95	88
T.C.M.H.	29,6 picog	27,0 à 33,0	28,8
C.C.M.H.	34 %	32,0 à 36,0	33
Leucocytes	8 250 /mm3	4 000 à 10 000	7 010
Polynucléaires neutrophiles	3 960 /mm3	2000 à 7500	2 776
Polynucléaires éosinophiles	83 /mm3	40 à 800	105
Polynucléaires basophiles	41 /mm3	Inf. à 100	28
Lymphocytes	3 754 /mm3	1000 à 4000	3 708
Monocytes	413 /mm3	20 à 1000	393
Plaquettes	367 000 /mm3	150 000 à 450 000	22/07/19 368 000
V.P.M.	8,8 µ3	Inf. à 10,0	8,6

Biochimie

Glycémie à jeun
Spectrophotométrie (Architect ci4100)

2,44 g/L

Valeurs de référence

0,70 à 1,15

Antériorités

22/07/19

1,90

Urée
Spectrophotométrie (Architect ci4100)

0,59 g/L

9,81 mmol/L

0,32 à 0,92

5,35 à 15,29

22/07/19

0,74

12,40

Validé le 14/04/22

Dr. Abdelhakim B. LAM
Institut Pasteur du Maroc
Tél: 0527 4600 71172

Institut Pasteur du Maroc Centre de Biologie Médicale e-mail: cbm.info@pasteur.ma

1 Place Louis Pasteur 20360 Casablanca ☎+212 522 434 471/72 ☎+212 522 434 477/+212 522 260 957

1 Rue Qortobi - Place Marchan CP 90000 Tanger ☎+212 539 931 111 ☎+212 539 932 299

web: www.pasteur.ma relation clientèle: client@pasteur.ma INPE : 090005786



استشر الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستخدمة فقد تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6. **معلومات إضافية:**
ما الذي يحتوي عليه أوغستنان 125/5 ميلغرام للتكبير، مسحوق لمعلق قابل للشرب في كيس من جرعة واحدة؟

المواد النشطة هي:

- أموكسيسيلين 1000,00 ميلغرام
 - على شكل أموكسيسيلين ثلاثي الهيدروكلوريد
 - حمض كلافولانيك 125 ميلغرام
 - على شكل كلافولانات ثلاثي الهيدروكلوريد
- لكل كيس من جرعة واحدة

المكونات الأخرى هي:

كروسيوفاين ، هلام السيليكا ، رائحة الفراولة والليمون والفورج (يحتوي على مثاليينيكترين بشكل خاص)، الأسبارتان

ما الذي يحتوي عليه أوغستنان 500 ميلغرام/ 62,5 ميلغرام للتكبير قرص نصف؟

المواد النشطة هي:

- أموكسيسيلين 500,00 ميلغرام
- على شكل أموكسيسيلين ثلاثي الهيدروكلوريد
- حمض كلافولانيك 62,50 ميلغرام
- على شكل كلافولانات ثلاثي الهيدروكلوريد

المكونات الأخرى هي:

الوان: كروسيوفاين ، سيليكا غروية رطبة ، سيليكا غروية لا مائية ، سترات المغنيسيوم ، هيدروكسي بروبيل مازولر صعب الامتصاص ، الكافيت (أزرق) 7300 ، سيستيل 805 ليس (هيدرو ميلوز ، مازولر غول 400 ، مازولر غول 6000 ثنائي الكسيد التيتانيوم)

الشكل الصيدلاني والمحتوى:

ما هو أوغستنان 1/ 125 ميلغرام للتكبير، مسحوق لمعلق قابل للشرب في كيس من جرعة واحدة وما هو محتويات التغليف الخارجي؟

يؤخر هذا الدواء على شكل مسحوق لمعلق قابل للشرب في الكيس من جرعة واحدة.
عبء التغليف على 12، 16، 24 وكيسا

ما هو أوغستنان 500 ميلغرام/ 62,5 ميلغرام للتكبير، قرص نصف وما هو محتويات التغليف الخارجي؟

يؤخر هذا الدواء على شكل قرص نصف، عليه تحتوي على 32 قرصا

تصنيف / نوع صيغة:

تتميز المضادات الحيوية بفعاليتها في محاربة العدلات الناتجة عن الجراثيم إنها غير مدمرة ضد العدلات الناتجة عن الفيروسات.

وأحيانا، لا تشخيص العدلات الناتجة عن الجراثيم للعلاج بمضادات الحيوية، ويمكن السبب الأكثر شيوعا في أن الجرثومة التي تسببت في العدوى أصبحت مقاومة للمضاد الحيوي الذي يتم تناوله، مما يعني أن الجرثومة يمكن أن تنقل على قيد الحياة وتتكاثر رغم مفعول المضاد الحيوي.

تتمتع الجرثومة مقاومة للمضاد الحيوية لعدة أسباب، وقد يساعد استخدام المضاد الحيوية بحدوث على تقليص خطر نمو مقاومة الجراثيم للمضاد الحيوية.

وعندما يصيب الطبيب علاجاً بمضاد الحيوية، فإنها الوحيدة من هذه الوصفة هو علاج مرضك الحالي.

فالانتباه للتصحيح التالية سيساعد على تفادي ظهور جرثومة مقاومة يمكنها أن توقف فعالية المضاد الحيوي.

1. لا بد أن تأخذ جرعة من المضاد الحيوي، ووقت تناوله ومدة العلاج. اقرأ التعليمات على العلبة وإذا تضرر القود، طلب من طبيبك أو من الصيدلي أن يشرح لك.

2. لا تستعمل أي مضاد حيوي إلا إذا وصفه لك الطبيب خصيصا لمرضك وبطريق أن تشخصه حصريا لعلاج العدلات التي لم وصفها لها.

3. لا تستعمل أي المضاد الحيوية التي تم وصفها للأشخاص الآخرين ولو كانوا يعانون من العدلات تبدو مشابهة لتلك التي تعاني منها.

4. لا تعاط المضاد الحيوية التي لم وصفها لك لأي شخص آخر.

5. إذا بقيت لك جرعة من مضاد الحيوية عندما تنتهي من علاجك، لا تصبها بها، الطبيب، ينبغي أن تتخلص من الصيدلي التي يتخلص منها بشكل مناسب.

شروط التغليف: القدمة (الزرنيخ)، برصعة طيب ظفر

GlaxoSmithKline Maroc

عن العدة، جهة الرباط

توزيع الدار البيضاء: شنتر 2020

الآثار الجانبية الشائعة جدا:

- يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 10:
- الإسهال (عند الكبار).

الآثار الجانبية الشائعة:

- يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 10:
- السعال (عند نالحة عن الطيريات التي تسمى المبيضات، وتظهر على مستوى المبلل والتم والتبثبث (الجانبية)، العين، لاسيما عند تناول جرعات مرتفعة.
- إذا ظهرت عليك أو على طفلك هذه الآثار الجانبية، فواصل على أخذ أوغستنان قبل الوجبة.

الآثار الجانبية قليلة الشدة:

- يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 100:
- طفح جلدي، حكة،
- طفح جلدي بزرع مع حكة (شرى).
- صر الهضما
- دوار
- صاعا الرأس.

الآثار الجانبية قليلة الشدة التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحليل الدم:

- ارتفاع معدل بعض المواد (الأنزيمات) التي يتبعها الكبد.

الآثار الجانبية الشديدة:

- يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 1000:
- طفح جلدي، يمكن أن تتكون منه تجمعات تشبه بقعا صغيرة (طفح سواد)، مركزية تحيط بها منطقة أكثر شحوبا، وحولها حلقة داكنة، حماسي عديدة الأشكال).
- إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فاصل طبيبك على وجه الاستعجال.

الآثار الجانبية الشديدة التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحليل الدم:

- انخفاض عدد الخلايا التي تساهم في تعزيز الدم (الصفيحات)،
- انخفاض عدد الكريات البيضاء.

آثار جانبية أخرى:

- يمكن أن تظهر آثار جانبية أخرى لدى عدد ضئيل من الأشخاص (لا أن ندرها غرامير معروف):
- ردود فعل تحسسية (طفح أعلا)،
- التهاب الأمعاء (تقرحات في الأمعاء)،
- التهاب الششاء العصبي الذي يحيط بالمشاع (التهاب المشع العصبي)،
- ردود الفعل الجلدية الحادة.

طفح منتشر يصاحبه تجمعات وتورف الجلد، لاسيما حول الفم والأف والعيون، وفي المناطق التماسية (تتأثر سفن جوسون)، وشكل من الطفح أكثر حدة يتسبب في انفصال جلدي حاد (أكثر من 30 بالمائة من المسطح الجلدي متأثرة على الأقل).

- طفح جلدي أحمر منتشر يصاحبه تجمعات صغيرة تحتوي على قروح (الحب الحاد الغامقي أو القفاري)

- طفح حشاشي أحمر يصاحبه كثر تحت الجلد وتجمعات (بثور عميقة)

- متلازمة الأعراس الشبيهة بالانفلونزا مع طفح جلدي وعمى وتضخم في الغدة الليمفاوية واختلالات دة غير طبيعية (بما في ذلك زيادة خلايا الدم البيضاء (فرط العدلات) وإزيمات الكبد). فرط التحسس من الأدوية.

إذا ظهرت عليك أحد هذه الأعراض، فاصل طبيبك على الفور.

الفرط الحاد، الذي ينتج عن ارتفاع معدل البيليروبين في الدم (في مادة يتجمعها الكبد)، وتؤدي إلى تلوّن أصفر للبشرة وفي المنطقة البيضاء من العين.

• التهاب الكلى،

• اضطلة مدة تخثر الدم،

• فرط الشحار،

• تشنجات (تقلص العضلات) التي يتأثر بها جرات مرتفعة من أوغستنان أو يعانون من مشكل في الكلى؛

• السعال الأسود (الشعور بالسعال)

• تلوّن الأسنان (ردي الأطفال)، ويختفي عموما عند فرش الأسنان.

الآثار الجانبية التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحليل الدم أو البول:

- انخفاض مهم في عدد الكريات البيضاء؛
- انخفاض عدد الكريات الحمراء (فقر الدم الانحلالي)؛
- بروتات في البول.

التحذيرات والآثار الجانبية:

إن شحرت باي أثر غير متنبه، المرجو إخبار الطبيب أو الصيدلي، ينطبق ذلك على أي أثر غير متنبه لم يرد نكرو بهذه النشرة. يمكنك أيضا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عبر نظام الإبلاغ الوطني أو على العنوان:

GlaxoSmithKline Maroc 42-44 تقاطع بوليفارد الرشيد وشارع أبو حامد

الغزالي، 20000 الدار البيضاء

5. كيف يمكن حفظ أوغستنان؟

يحفظ بعيدا عن مراء ومثاقول الأطفال.

تاريخ انتهاء الصلاحية:

لا ينبغي استخدام أوغستنان بعد تاريخ الصلاحية المذكور على العلبة.

شروط الحفظ:

بالتخزين عن الرطوبة في حرارة لا تتجاوز 25

درجة مئوية

تحذيرات خاصة:

لا ينبغي رمي الأدوية في شبكة المجاري أو مع النفايات المنزلية.