

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

N° M21- 0060672

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9266 Société : R.A.M.

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : EL MARIATI ou D. R. S.

Date de naissance : 01.01.53

Adresse : R.N.A. 201 DAR WA

Tél : 06 82 264 73 Total des frais engagés : 162,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 07/05/2022

Nom et prénom du malade : MERZOUKE (Chaddouji) Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Lombalgie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le 07/05/2022

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17/10/22			280	Dr. BEN ELHAFI

Dr. BEN ELHAFI
Chirurgien
Traumatologue - Orthopédiste
Tél. Urgence : 06 66 19 20 04

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture

17/10/22 312,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue Date Désignation des Coefficients Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien Date des Soins Nombre Montant détaillé des Honoraires

AM PC IM IV

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'OD.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 G 00000000
35533411 11433553
B


[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. BEN ELHAFI HASSAN

Médecin Spécialiste

En Chirurgie Orthopédique et Traumatologique

- ✓ Chirurgie et Maladie Des Os et Articulations
- ✓ Chirurgie Prothétique et Des Rhumatismes
- ✓ Mal de Dos et Maladies de la Colonne Vertébrale
- ✓ Chirurgie de la Main, Coude, Epaule ,
- Hanche, Genou, Cheville et Pied

الدكتور ابن الحافي حسن

طبيب إختصاصي في جراحة العظام و المفاصل

- ✓ أمراض و جراحة العظام و المفاصل و الكسور
- ✓ جراحة تقويم العظام و تعويض المفاصل
- ✓ جراحة اليد، الكتف، الورك، الركبة و القدم
- ✓ جراحة الروماتيزم
- ✓ الأم و أمراض العمود الفقري

Mohammedia le :

11/05/2022

MERBAK. Khaddry's

50,60

✓ Kine. 18 up

✓ Xy

34,10

✓ mydoflex. 18 up

✓ Xy

87,80

✓ Dexam. 18 up

F8,80

✓ Almyatiz. 62

F312,20

DR. BEN ELHAFI HASSAN
Chirurgien
Traumatologue - Orthopédiste
Tél. Urgence : 06 66 19 20 04

Lotissement El Massira. Bd Riad (Mohamed 6) N° 8, 1 étage, Apt N° 1. (a côté d'école RODIN ET Banque Populaire). Alia-Mohammedia

تجزئة المسيرة. شارع الرياض (محمد السادس) رقم 8. الطابق الأول (بجانب مدرسة رودان و البنك الشعبي) العالية - المحمدية

CABINET 0523.31.41.54 العيادة

URGENGE 0666.19.20.04 المستعجلات

PRINCI-B FORT®

Vit B1, Vit B6, Vit B12
Boîte de 30 comprimés enrobés

...nent car elle contient des informations importantes pour vous.
...ment les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

n.
...ecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
...ine amélioration ou si vous vous sentez moins bien après.

...I FORT, comprimé enrobé ?

Pe
Veu
Vou
- G
- A
- S
- V

PPV

LOT

PER

50.60 DH
F313
03/25

1. Qu
2. Qu
3. Qu
4. Co
5. Qu
6. Co
7. Info

1. Qu'e

Classe p.

Vitamines

Code ATC : (N

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est indiqué en cas de :

- Prophylaxie et traitement des états de carence nutritionnelle en vitamines du groupe B en association avec d'autres vitamines de ce groupe, notamment des carences induites par l'alcoolisme chronique
- Traitement des algies à composante neurologique et neuromusculaire.
- Asthénie

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PRINCI-B FORT ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre-indications :

Ne prenez jamais PRINCI-B FORT, comprimé enrobé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du comprimé.
- En association avec la Lévodopa.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Faites attentions avec PRINCI-B FORT, comprimé enrobé :

Ce médicament ne doit pas être utilisé de façon prolongée.

Ne pas associer la pyridoxine (Vitamine B6) à la lévodopa sauf si celle-ci est associée à un inhibiteur de la dopa décarboxylase.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments :

Prise ou l'utilisation d'autres médicaments :

Ce médicament est contre-indiqué en association avec la lévodopa.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.



MYDOFLEX 150 mg

Comprimés pelliculés

GTIN: 06118001260850
 LOT: 3935
 MFG: 01 2022
 EXP.: 01 2025
 PPV: 94dhs00



V
n
G
la
S
un
méd
Ce m
prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
 Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

MYDOFLEX 150mg, boîte de 30 comprimés pelliculés

2. Composition du médicament :

Composition :

mg). Dans certains cas le médecin peut prescrire une dose plus importante (quatre fois un comprimé pelliculé à 150 mg par jour). Chez les personnes âgées, ou en cas de certaines maladies associées (insuffisance hépatique ou rénale), la dose prescrite est souvent plus faible. La dose journalière est maintenue jusqu'à l'obtention du résultat thérapeutique. La prescription médicale peut prévoir pour la suite un intervalle plus long entre les prises. En cas de simple retard d'une prise prenez la dose prévue. En cas d'oubli complet d'une prise ne pas doubler la dose suivante.

6. Contre-indications

N'utilisez jamais MYDOFLEX 150 mg comprimés pelliculés dans les cas suivants :

Myasthénie grave (maladie rare entraînant une faiblesse musculaire).

Allergie antérieure au MYDOFLEX

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. Effets indésirables

Les récentes études cliniques ont montré que moins de 5% des patients traités avaient annoncé des effets indésirables. Les effets indésirables rapportés sont les suivants:

Système nerveux central:

Occasionnel: vertige, tremblement, paraesthesia
 Peu fréquent: mal de tête

Système cardiovasculaire:

Occasionnel: palpitations, hypotension

Étendue gastro-intestinale:

Occasionnel: bouche sèche

ARHUMATIZ GEL®



PPC : 79,80 DHS

PER : 11/2024

LOT : BKY70

...a Montana, Camphre, Menthol et Romarin

...articulaire & Confort Musculaire

...gel de massage qui détend et soulage les

- Formulé à base d'huiles essentielles, il permet un massage adéquat pour un maximum de confort articulaire.
- ARHUMATIZ gel soulage immédiatement en réduisant les tensions articulaires.
- ARHUMATIZ gel est utilisé en cas de stress musculaire, rééducation et massage chez le sportif.

MODE D'UTILISATION :

- Appliquer le gel ARHUMATIZ sur la zone concernée deux fois par jour. Masser soigneusement.

IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg comprimés Méloxicam

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

IBERMOX® 15 mg
Méloxicam
20 Comprimés



Conservez votre médicament dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité, à température ambiante (15-25°C).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg comprimés et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg comprimés ?
3. Comment prendre IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST CE QUE IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacologique :

Anti-inflammatoire non stéroïdiens (AINS), Code ATC : M01AC06

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anti-inflammatoire non stéroïdien, indiqué chez l'adulte (plus de 15 ans) dans :

- Le traitement symptomatique au long cours de la polyarthrite rhumatoïde.
- Le traitement symptomatique au long cours de la spondylarthrite ankylosante.
- Le traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës d'arthrose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg comprimés ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet.

Contre-indications :

Ne prenez jamais IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg comprimés dans les cas suivants :

- Allergie (hypersensibilité) au méloxicam ou à l'un de ses composants.

l'intestin) ou d'hémorragie vasculaire cérébrale (saignement au niveau du cerveau) ou atteinte d'un trouble hémorragique.

- Maladie grave du cœur,
- Âgé de moins de 15 ans.

Précautions d'emploi et mises en garde spéciales :

Faite attention avec IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg comprimés.

TRAITEMENT PREVENIR VOTRE

LOT : 17320005
PER : 08/2023
PPV : 87,80 DH

gastro-intestinales
n de l'estomac
in de l'oesophage
une rectocolite
hron,
e maladie du cœur,

peuvent être un gonflement des jambes ou des chevilles.

- D'augmentation du taux de potassium dans le sang (hyperkaliémie),
- D'asthme « bronchique ». Les signes peuvent être une respiration sifflante, un essoufflement, une oppression respiratoire et une toux,
- D'intervention chirurgicale récente,
- D'utilisation d'un contraceptif intra utérin (stérilet). L'administration de IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg pourrait diminuer l'efficacité du stérilet.

De deuxième trimestre de grossesse. IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg ne doit pas être utilisé pendant cette période sauf cas d'absolute nécessité. Si nécessaire, le traitement utilisé doit l'être sur la durée la plus courte possible et avec la dose la plus faible possible. Les médicaments tels que IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament contient un sucre appelé lactose. Si votre médecin vous a diagnostiqué une intolérance à certains sucres, consultez-le avant de prendre ce médicament.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg. Ce médicament contient...

ou les compléments alimentaires).

IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg peut en effet affecter la façon dont un médicament agit, d'où même que certains médicaments peuvent affecter l'action de IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg. En particulier, signalez à votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un de ces médicaments suivants :

- D'autres médicaments contre la douleur (antalgiques), en particulier d'autres AINS comme l'ibuprofène ou l'aspirine. Une administration simultanée de ces médicaments peut augmenter le risque d'ulcère ou de saignement de l'estomac.
- Des médicaments utilisés pour fluidifier le sang ou dissoudre les caillots sanguins tels que la warfarine ou l'altéplase. Une administration simultanée de ces médicaments peut augmenter le risque de saignement de l'estomac. Si l'utilisation de ces médicaments est nécessaire, votre médecin peut être amené à contrôler votre coagulation sanguine par des tests biologiques.

- Du lithium, utilisé dans le traitement des troubles de l'humeur,
- Des diurétiques ou d'autres médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque. Ces médicaments comprennent les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) tel que le captopril et les bêta-bloquants tel que l'aténolol.
- De la ciclosporine, utilisée contre le rejet de greffe. Une administration simultanée peut augmenter le risque d'effets indésirables rénaux.

De méthotrexate, utilisé dans le traitement de certains cancers et d'autres pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde.

De la cholestyramine, utilisée pour diminuer le taux de cholestérol dans le sang.

Des corticoïdes utilisés dans le traitement de certaines allergies et pathologies inflammatoires.

En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg.

Examens biologiques

Dans le cas d'une prise simultanée de IBERMOX® 7,5 mg et 15 mg et de l'un des produits mentionnés ci-dessus, votre médecin peut être amené à faire pratiquer des examens complémentaires, comprenant des examens sanguins et urinaux. En particulier, votre médecin peut vouloir réaliser ces examens si vous êtes âgé ou si vous avez des troubles rénaux.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives