

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



148296

Déclaration de Maladie : N° P19-0009269

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : ASSOUIMLY HASNA Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 06-61-15-42-61 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :/...../.....

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :/...../.....

Signature de l'adhérent(e) :

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
24/05/2022	C		100	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

24/05/22

Montant de la Facture

409,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

24/05/22

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

1260,20

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées

Nature des Soins

Coefficient



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION


O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H	
25533412	21433552	
00000000	00000000	
D		G
00000000	00000000	
35533411	11433553	
	B	

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISÉ ET ATTESTÉ PAR LE PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISÉ ET ATTESTÉ PAR LE PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur BENNADDI Hassan

Diplome de la faculté de médecine de Lille

MEDECINE GENERALE

Diplome d'Echographie de la Faculté
de Médecine de Paris

Agrée pour la Visite Médicale
de Permis de Conduire
Suivi de Diabète

الدكتور بنعدي حسن

خريج كلية الطب بليل

الطب العام

حائز على دبلوم الفحص بالصدى

كلية الطب بباريس

مرخص للفحص الطبي لأجل

رخصة السياقة

مراقبة مرض السكري

Casablanca Le : 24. 5. 2022 : الدار البيضاء في

ASSOCIATY

PHARMACIE KHALEF AZZEDINE

13, Rue Sijilmasa Belvédère
Casablanca - Tel 0522 24 26 43

6x60,00 = 360,00

1) Terplex

496,00 x 2ms

2) Ducre Font

1 amp / 15 j

x 1ms

Dr. BENADDI HASSAN
AGREÉ POUR PERMIS DE CONDUIRE
3 Bloc Farid 101 Bd Abbas El Ghaddaoui
Sidi Bernoussi Casablanca
Tél: 05 22 73 27 09

Bloc Farid 101 , Avenue Abbas Ghaddaoui N° 3 Sidi Bernoussi - Casablanca

بلوك فريد ، 101 شارع عباس الغداوي رقم 3 سيدي البرنوصي - الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 73 27 09 - 06 15 27 53 50

FERPLEX 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

إذا كنت

الحصول عليها

• مضادات حيوية

• إذا كنت تأخذ

• البيفوسفونات

• الينيسيلام

• الفامبسيل

• (النشاط).

• لفيدويو و كاردويديو يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الاعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ

• محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

• بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

• ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

• حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

• الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

• لنزويبرازول وياتوبيرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

• في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

• بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص

• الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

• عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

• الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

• زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

• (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

• إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

• يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

• هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

• لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

• هذا الدواء يحتوي على سربول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات

• من طبيبك أو الصيدلاني.

• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

• في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

• مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

• المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

• فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

• الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

• هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40

ملغ محلول لشرب :

• لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات

• الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

• هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

• الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في

• أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

التي تم
معلم
(مل)
قبة قليلة

إذا كنت
الحصول عليها
• مضادات حيوية
• إذا كنت تأخذ
• البيوفوسفونات
• الستيرويدات
• الفامبسيل
• (النشاط).

- لفيدويو و كاردوديويو يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.
- انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي)
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزء المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبازول وياتوبازول.
- مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.
زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سربتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

- الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.
- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

التي تم
نظم
مل
قبة قليلة

إذا كنت
الحصول عليها
• مضادات حيوية
• إذا كنت تأخذ
• البيوفوسفونات
• البيينيسلام
• الفامبيتيل
• (النشاط).

- لفردويا و كاردوديوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الاعضاء أو الأنسجة.
- انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي)
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول و لنزوبازول و يانتيوبازول.
- مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :
بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفض امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.
زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سربيتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

- الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.
- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

التي تم
معلم
(مل)
قبة قليلة

إذا كنت
الحصول عليها
• مضادات حيوية
• إذا كنت تأخذ
• البيوفوسفونات
• الستيرويدات
• الفامبسيل
• (النشاط).

- لفيدويو و كاردوديويو يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.
- انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي)
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزء المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبازول وبيانتوزول.
- مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.
زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سربنول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

فيرليكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

- الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.
- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.
فيرليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.
- التحذيرات الخاصة لفيرليكس 40 ملغ :
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

التي تم
معلم
(مل)
قبة قليلة

إذا كنت
الحصول عليها
• مضادات حيوية
• إذا كنت تأخذ
• البيوفوسفونات
• الستيرويدات
• الفامبسيل
• (النشاط).

- لفيدويو و كاردوديويو يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.
- ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.
- انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :
- مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي)
- الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.
- أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول، لنزوبازول وياتوبازول.
- مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :
- هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سربتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

- الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.
- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.
- التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

إذا كنت

الحصول عليها

• مضادات حيوية

• إذا كنت تأخذ

• البيفوسفونات

• الينيسيلام

• الفامبسيل

• (النشاط).

• لفيدويو و كاردويدويو يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ

• محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

• بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

• ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

• حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

• الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

• لنزويبرازول وياتوبيرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

• في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

• بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفض امتصاص

• الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

• عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

• الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

• زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

• (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

• إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

• يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

• هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

• لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

• هذا الدواء يحتوي على سربول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات

• من طبيبك أو الصيدلاني.

• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

• في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

• مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

• المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

• فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

• الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

• هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40

ملغ محلول لشرب :

• لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينسيلات

• الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

• هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

• الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في

• أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

PPV: 49,60 DH
LOT: 21K03B
EXP: 11/2024

3 ampoules buvables

D-CURE® FORTE

Cholécalciférol 100 000 UI
Vitamine D3

MCP220MA003118
09/08/2018

1
2
:
:
/
/
:
:



Docteur BENNADDI Hassan

Diplome de la faculté de médecine de Lille

MEDECINE GENERALE

Diplome d'Echographie de la Faculté
de Médecine de Paris

Agrée pour la Visite Médicale
de Permis de Conduire
Suivi de Diabète

Casablanca Le :

الدكتور بنعدي حسن

خريج كلية الطب بليل

الطب العام

حائز على دبلوم الفحص بالصدى

كلية الطب بباريس

مرخص للفحص الطبي لأجل

رخصة السياقة

مراقبة مرض السكري

الدار البيضاء في :

20/15/2022

ABBOUITHY HASSAN

NFS

Ferritine

Vita-Mine D

Dr. BENADDI HASSAN
AGREE POUR PERMIS DE CONDUIRE
3 Bloc Farid 101 Rd Abbas El Ghaddaoui
Sidi Bernoussi Casablanca
Tél : 05 22 73 27 09

LABORATOIRE BELVEDERE
Dr. EL FILALI Ahmed
Pharmacien Biologiste
Rés. Zine El Mahaba
En Face de La Gare Casa Voyageurs
Tél: 0522 242 855/0522 407 363 - Fax: 0522 240 641

Bloc Farid 101 , Avenue Abbas Ghaddaoui N° 3 Sidi Bernoussi - Casablanca

بلوك فريد ، 101 شارع عباس الغداوي رقم 3 سيدي البرنوصي - الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 73 27 09 - 06 15 27 53 50



مختبر بلقيدير للتحاليل الطبية والتناسلية

Laboratoire Belvédère d'Analyses Médicales et de Biologie de la Reproduction
Biochimie - Hématologie - Microbiologie - Immunologie - Hormonologie - Toxicologie -
Biologie de la Reproduction



Dr. EL FILALI Ahmed

الدكتور الفيلالي أحمد

Pharmacien Biologiste

Diplômé de l'UCL à Bruxelles

Ancien interne de l'hôpital Saint Luc à Bruxelles

Ancien fondateur et directeur du LABORATOIRE

DE L'EUROPE à Brest (France)

DU Médecine et Biologie De la Reproduction Paris Descartes

DU Assurance qualité en biologie médicale

ICE: 00157364000048

IF: 18744778

TP: 32502798

CNSS: 2593574

INP: 093002764

FACTURE N° : 220500461

CASABLANCA le 24-05-2022

Mme ASSOUIHLY Hasna

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prlt sanguin	E15	E
0154	Ferritine	B250	B
0216	Numération formule	B80	B
0439	Vitamine D	B450	B

Total des B : 780

TOTAL DOSSIER : 1060.20DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : mille soixante dirham vingt centimes.

LABORATOIRE BELVEDERE
Dr. EL FILALI Ahmed
Pharmacien Biologiste
Rés. Zine El Mahaba
En Face de La Gare Casa Voyageurs
Tél. 0522 242 855/0522 407 363 - Fax: 0522 240 641

Prélèvements à domicile sur rendez-vous : 06 61 80 29 44

Résidence Zine Al Mahaba "Angle Bd Mohammed V Place Sidi Mohamed" Belvédère - Casablanca

Tél. : 05 22 24 28 55 / 05 22 40 73 63 - Fax : 05 22 24 06 41 E-mail : labobelvedere@gmail.com

site web : www.labobelvedere.com



مختبر بلقيدير للتحليلات الطبية والتناسلية

Laboratoire Belvédère d'Analyses Médicales et de Biologie de la Reproduction
Biochimie - Hématologie - Microbiologie - Immunologie - Hormonologie - Toxicologie -
Biologie de la Reproduction



Dr. EL FILALI Ahmed

الدكتور الفيلالي أحمد

Pharmacien Biologiste

Diplômé de l'UCL à Bruxelles

Ancien interne de l'hôpital Saint Luc à Bruxelles

Ancien fondateur et directeur du LABORATOIRE

DE L'EUROPE à Brest (France)

DU Médecine et Biologie De la Reproduction Paris Descartes

DU Assurance qualité en biologie médicale

Dossier N° : **22051117**

Enregistré le: 24-05-2022 à 13:34

Prélevé le : 24-05-2022 à 13:32

Mme ASSOUIHLY Hasna

Né(e) le : 28-02-1976 (46 ans)

Dossier N° : **22051117**

Prescripteur : Dr HASSAN BENADDI

Compte-rendu complet Edité le : 24-05-2022 à 16:05

HEMATOCYTOLOGIE

SYSMEX XS-1000I

HEMOGRAMME

Focalisation hydrodynamique-cytométrie de flux fluorescente-Impédancemétrie.

HEMATIES:	4.98	10 ⁶ /mL	(4.00-5.00)
Hémoglobine:	10.6	g/dL	(12.0-16.0)
Hématocrite:	32.8	μ ³	(37.0-46.0)
VGM:	65.9	%	(80.0-95.0)
TCMH:	21.3	pg	(27.0-32.0)
CCMH:	32.3	%	(31.0-36.0)
LEUCOCYTES:	6 200	/mm ³	(4 000-10 000)


FORMULE LEUCOCYTAIRE:

Neutrophiles	61.2 %	soit	3 794 /mm ³	(2 000-7 500)
Eosinophiles	1.1 %	soit	68 /mm ³	(<400)
Basophiles	1.1 %	soit	68 /mm ³	(<200)
Lymphocytes	30.5 %	soit	1 891 /mm ³	(1 500-4 500)
Monocytes	6.1 %	soit	378 /mm ³	(<1 000)

PLAQUETTES: 295 10³/mm³ (150-400)

Validé par : Dr. ZEMRANI Yassin

LABORATOIRE BELVEDERE
Dr. EL FILALI Ahmed
Pharmacien Biologiste
Rés. Zine El Mahaba
En Face de La Gare Casa Voyageurs
Tel: 05 22 242 855 / 05 22 242 363 - Fax: 05 22 240 641



مختبر بلقيدير للتحليلات الطبية والتناسلية

Laboratoire Belvédère d'Analyses Médicales et de Biologie de la Reproduction
Biochimie - Hématologie - Microbiologie - Immunologie - Hormonologie - Toxicologie -
Biologie de la Reproduction



Dr. EL FILALI Ahmed

الدكتور الفيلالي أحمد

Pharmacien Biologiste

Diplômé de l'UCL à Bruxelles

Ancien interne de l'hôpital Saint Luc à Bruxelles

Ancien fondateur et directeur du LABORATOIRE

DE L'EUROPE à Brest (France)

DU Médecine et Biologie De la Reproduction Paris Descartes

DU Assurance qualité en biologie médicale

Examen de : **Mme Hasna ASSOUIHLY** Né(e) le : 28-02-1976

Dossier N° : 22051117 du 24-05-2022

Compte-rendu complet

VITAMINOLOGIE

25-(OH)-vitamine D (D2+D3)
(ECLIA / Cobas e411)

18.63 ng/mL

Interprétation :

Déficience	:	< 20	ng/mL
Insuffisance	:	20-29	ng/mL
Taux recommandé	:	30-100	ng/mL
Toxicité	:	> 100	ng/mL

HORMONOLOGIE

Roche COBAS E411-Biomérieux VIDAS

Ferritine (RC)
(Electrochimiluminescence)

5.73 ng/ml

(15.00-150.00)

(RC) : Résultat contrôlé

Validé par : **Dr. ZEMRANI Yassin**

LABORATOIRE BELVEDERE
Dr. EL FILALI Ahmed
Pharmacien Biologiste
Rue Zine El Mahaba
En Face de La Gare Casa Voyageurs
Tél: 0522 242 855/0522 407 363 - Fax: 0522 240 641