

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° M21- 066631

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 736 Société : Royal Air Maroc

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : ROUSSET Mohamed

Date de naissance : 01-01-1944

Adresse : Hay MLY Rachid 1 Bloc 1 Rue 1h

N° 99 Benhazal Casablanca

Tél. : 0640359555 Total des frais engagés : 1943,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 20/04/2019

Nom et prénom du malade : ROUSSET Mohamed Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Unk

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019



# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 29/04/22        |                   |                       |                                 |                                                                |

# EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur                                                                                                       | Date    | Montant de la Facture |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| PHARMACIE ES SAAD<br>CASABLANCA SARLAD<br>MOUMIN Mohammed<br>2, Av. Al Youssef Hay Mohammadi<br>Casablanca<br>Tél: 05 22 62 03 53 / 62 54 13 | 23/4/22 | 1943,40               |

# ANALYSES - RADIOGRAPHIES

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|-----------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------|
|                                                     |      |                              |                        |

# AUXILIAIRES MEDICAUX

| Cachet et signature<br>du Praticien | Date des<br>Soins | Nombre |     |     |     | Montant détaillé<br>des Honoraires |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------------------|
|                                     |                   | A M    | P C | I M | I V |                                    |
|                                     |                   |        |     |     |     |                                    |
|                                     |                   |        |     |     |     |                                    |
|                                     |                   |        |     |     |     |                                    |
|                                     |                   |        |     |     |     |                                    |
|                                     |                   |        |     |     |     |                                    |

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES |  | Dents<br>Traitées | Nature des<br>Soins | Coefficient |                            |                       |                      |
|-----------------|--|-------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |  |                   |                     |             | COEFFICIENT<br>DES TRAVAUX | <input type="text"/>  |                      |
|                 |  |                   |                     |             |                            | MONTANTS<br>DES SOINS | <input type="text"/> |
|                 |  |                   |                     |             |                            | DEBUT<br>D'EXECUTION  | <input type="text"/> |
|                 |  |                   |                     |             |                            | FIN<br>D'EXECUTION    | <input type="text"/> |
|                 |  |                   |                     |             |                            |                       |                      |
|                 |  |                   |                     |             |                            |                       |                      |
|                 |  |                   |                     |             |                            |                       |                      |
|                 |  |                   |                     |             |                            |                       |                      |


# O.D.F PROTHESES DENTAIRES

# DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

|          |          |   |
|----------|----------|---|
|          | H        |   |
| 25533412 | 21433552 |   |
| 00000000 | 00000000 |   |
| D        |          | G |
| 00000000 | 00000000 |   |
| 35533411 | 11433553 |   |
|          | B        |   |

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur M'hamed LEMSEFFER

CHIRURGIEN UROLOGUE

Endoscopie et Chirurgie des Reins  
et des Voies Urinaires

Greffes Rénales

Lithotripsie Extra Corporelle

Stérilité Masculine


Ancien Interne des Hôpitaux de Montpellier

Ancien Assistant des Hôpitaux de Montpellier

Ancien Chef de Clinique Urologique

à la Faculté de Médecine de Montpellier

Membre de l'Association Française d'Urologie



PHARMACIE EL SAADI  
CASABLANCA  
MOUNIB MOHAMMAD  
2, Av. Al Yafa Hay Mohammad  
Casablanca  
Tél: 05 22 62 03 53 / 62 54 13

الدكتور محمد المسفر

جراحة الكلية والمسالك البولية

زرع الكلية

تفتيت الحصى بالأشعة

الأمراض التناسلية و العقم

خريج كلية الطب بمونبولي

رئيس سابقا لمصلحة جراحة الكلية

والمسالك البولية بالمستشفى الجامعي بمونبولي

عضو الجامعة الفرنسية لجراحة المسالك البولية

Casablanca, le 29 Avril 2022 : الدار البيضاء في

129,00 x 3  
S.V.  
Craie de : 1 effluence (3-7)  
600 x 17  
S.V.  
flex : 1  
116,40  
S.V.  
F to a 24 : 18 x 3  
(3 mois)  
URGO subc : 1 ;  
S.V.  
1400 x 3  
S.V.  
Nebo : 1  
S.V.  
194340  
S.V.  
1 - 2 ; (3-7)

Dr. M'hamed LEMSEFFER  
Chirurgien Urologue  
24 Rue El Alloussi - Bourgogne - CASA  
Tél: 05 22 27 41 17 / 05 22 20 64 83

Dr. M'hamed LEMSEFFER  
Chirurgien Urologue  
24 Rue El Alloussi - Bourgogne - CA  
Tél: 05 22 27 41 17 / 05 22 20 64 83

En cas d'urgence, s'adresser à la Clinique BADR : 05 22 49 28 00 / 05 22 49 23 80 / 81

24. زنقة العلوسي - بورغون (أمام مصحة بدر) - الدار البيضاء - الهاتف: 05 22 27 41 17 / 05 22 20 64 83 - الفاكس: 05 22 20 96 63

24. Rue El Alloussi - Bourgogne (en face Clinique BADR) - CASABLANCA - Tél.: 05 22 27 41 17 / 05 22 20 64 83

Fax : 05 22 20 96 63 - E-mail : drlemseffer-uro@hotmail.com





حاصل علي براءة الاختراع الدولية ومعتمد  
طبييا (وفقا لشهادة EN ISO 14155).  
تركيب الضمادات المشربة من جانيكدرما®  
سم x 10 سم:

• دعامة ماصة.

• غشاء واقى.

• يحتوي المرهم على: شمع، زيت زيتون،  
زيت الدوار، زيت الريسين المهرج،  
غالات البزموت، صمغ الروسين، كافور،  
اللبان المقدس بكورية .،

تركيب مطباق المرهم، وأنبوب المرهم، وحماية  
المرهم من جانيكدرما® :

يحتوي المرهم على: شمع، زيت زيتون، زيت  
الدوار، زيت الريسين المهرج، غالات البزموت،  
صمغ الروسين، كافور، اللبان المقدس بكورية .،

## لا تحتوى منتجات جانيكدرما على كورتيزون أو هرمون النمو!

### الخواص

يحفز هذا المنتج على تطوير النسيج الحبيبي، حيث  
يتم العلاج من خلال:

- ضمان البيئة الملائمة للعلاج من خلال  
تحفيز الخلايا الظهارية، والخلايا  
الكيراتينية والخلايا البطانية من خلال  
استعادة دهون حاجز الجلد، وإنتاج  
الكولاجين والإيلاستين.
- زيادة الاندمال بتشكيل النسيج الظهاري  
حتى في حالة الجروح العميقة من خلال  
تحفيز احتياطات من الخلايا الظهارية  
المتبقية.
- تسريع عملية تجديد الأوعية الدموية في  
طبقة الجرح

إن تأثير امتصاص الافرازات الزائدة لهذا المنتج  
تسمح بالتنضير (ازالة الأنسجة الميتة) الأمثل.  
يوفر هذا المنتج راحة خاصة للمريض للحد من  
الألم. ويوفر تنمية ذات نوعية

### دواعي الاستعمال

حيث أن للمستحضر تقبلا جيدا للجلد، فهو يستعمل  
في:

- العلاج الموضعي للجروح الحادة: الدرجة  
الأولى والثانية (أ) و(ب) والثالثة من  
الحروق، والسحجات، والتقرحات  
والجروح الرضحية الأخرى، والإصابات  
الجلدية الأخرى؛
- العلاج الموضعي للندبات المرضية  
(ندوب الضخامي أو الجذرة)؛
- العلاج الموضعي للتقرحات السريرية  
والقرحة المزمنة للأوعية الدموية وقرحة  
القدم في مرضى السكري؛
- العلاج الموضعي للأكزيما الرطبة  
والتهاب الجلد التماسي، والصدفية، التهاب  
الجلد الإشعاعي؛

INTERFOX

PPC: 129,00



حاصل علي براءة الاختراع الدولية ومعتمد  
طبييا (وفقا لشهادة EN ISO 14155).  
تركيب الضمادات المشربة من جانيكدرما®  
سم x 10 سم:

• دعامة ماصة.

• غشاء واقى.

• يحتوي المرهم على: شمع، زيت زيتون،  
زيت الدوار، زيت الريسين المهرج،  
غالات البزموت، صمغ الروسين، كافور،  
اللبان المقدس بكورية ..

تركيب مطباق المرهم، وأنبوب المرهم، وحماية  
المرهم من جانيكدرما® :

يحتوي المرهم على: شمع، زيت زيتون، زيت  
الدوار، زيت الريسين المهرج، غالات البزموت،  
صمغ الروسين، كافور، اللبان المقدس بكورية ..

## لا تحتوى منتجات جانيكدرما على كورتيزون أو هرمون النمو!

### الخواص

يحفز هذا المنتج على تطوير النسيج الحبيبي، حيث  
يتم العلاج من خلال:

- ضمان البيئة الملائمة للعلاج من خلال  
تحفيز الخلايا الظهارية، والخلايا  
الكيراتينية والخلايا البطانية من خلال  
استعادة دهون حاجز الجلد، وإنتاج  
الكولاجين والإيلاستين.
- زيادة الاندمال بتشكيل النسيج الظهاري  
حتى في حالة الجروح العميقة من خلال  
تحفيز احتياطات من الخلايا الظهارية  
المتبقية.
- تسريع عملية تجديد الأوعية الدموية في  
طبقة الجرح

إن تأثير امتصاص الافرازات الزائدة لهذا المنتج  
تسمح بالتنضير (ازالة الأنسجة الميتة) الأمثل.  
يوفر هذا المنتج راحة خاصة للمريض للحد من  
الألم. ويوفر تنمية ذات نوعية

### دواعي الاستعمال

حيث أن للمستحضر تقبلا جيدا للجلد، فهو يستعمل  
في:

- العلاج الموضعي للجروح الحادة: الدرجة  
الأولى والثانية (أ) و(ب) والثالثة من  
الحروق، والسحجات، والتقرحات  
والجروح الرضحية الأخرى، والإصابات  
الجلدية الأخرى؛
- العلاج الموضعي للندبات المرضية  
(ندوب الضخامي أو الجذرة)؛
- العلاج الموضعي للتقرحات السريرية  
والقرحة المزمنة للأوعية الدموية وقرحة  
القدم في مرضى السكري؛
- العلاج الموضعي للأكزيما الرطبة  
والتهاب الجلد التماسي، والصدفية، التهاب  
الجلد الإشعاعي؛

INTERFOX

PPC: 129,00





حاصل علي براءة الاختراع الدولية ومعتمد  
طبييا (وفقا لشهادة EN ISO 14155).  
تركيب الضمادات المشربة من جانيكدرما®  
سم x 10 سم:

• دعامة ماصة.

• غشاء واقى.

• يحتوي المرهم على: شمع، زيت زيتون،  
زيت الدوار، زيت الريسين المهرج،  
غالات البزموت، صمغ الروسين، كافور،  
اللبان المقدس بكورية .،

تركيب مطباق المرهم، وأنبوب المرهم، وحماية  
المرهم من جانيكدرما® :

يحتوي المرهم على: شمع، زيت زيتون، زيت  
الدوار، زيت الريسين المهرج، غالات البزموت،  
صمغ الروسين، كافور، اللبان المقدس بكورية .،

## لا تحتوى منتجات جانيكدرما على كورتيزون أو هرمون النمو!

### الخواص

يحفز هذا المنتج على تطوير النسيج الحبيبي، حيث  
يتم العلاج من خلال:

- ضمان البيئة الملائمة للعلاج من خلال  
تحفيز الخلايا الظهارية، والخلايا  
الكيراتينية والخلايا البطانية من خلال  
استعادة دهون حاجز الجلد، وإنتاج  
الكولاجين والإيلاستين.
- زيادة الاندمال بتشكيل النسيج الظهاري  
حتى في حالة الجروح العميقة من خلال  
تحفيز احتياطات من الخلايا الظهارية  
المتبقية.
- تسريع عملية تجديد الأوعية الدموية في  
طبقة الجرح

إن تأثير امتصاص الافرازات الزائدة لهذا المنتج  
تسمح بالتنضير (ازالة الأنسجة الميتة) الأمثل.  
يوفر هذا المنتج راحة خاصة للمريض للحد من  
الألم. ويوفر تنمية ذات نوعية

### دواعي الاستعمال

حيث أن للمستحضر تقبلا جيدا للجلد، فهو يستعمل  
في:

- العلاج الموضعي للجروح الحادة: الدرجة  
الأولى والثانية (أ) و(ب) والثالثة من  
الحروق، والسحجات، والتقرحات  
والجروح الرضحية الأخرى، والإصابات  
الجلدية الأخرى؛
- العلاج الموضعي للندبات المرضية  
(ندوب الضخامي أو الجذرة)؛
- العلاج الموضعي للتقرحات السريرية  
والقرحة المزمنة للأوعية الدموية وقرحة  
القدم في مرضى السكري؛
- العلاج الموضعي للأكزيما الرطبة  
والتهاب الجلد التماسي، والصدفية، التهاب  
الجلد الإشعاعي؛

INTERFOX

PPC: 129,00

# FLOXAM®

(FLUCLOXACILLINE)

Penicilline insensible à la pénicillinase

PPV 116DH40

LOT 08022 4

EXP 10/2022

# FLOXAM®

Flucloxacilline

**500 mg 24 gélules**

- Poudre pour suspension intraveineuse 500 mg / 5 ml sans sucre :

Flucloxacilline (DCI) 250 mg (sous forme de sel sodique monohydraté) par cuillère mesure de 5 ml.  
Excipient qsp 6,5 g de poudre par flacon de 12 doses et 10,25 g de poudre par flacon de 20 doses.

- Injectable à 250 mg :

Flacon de poudre contenant 250 mg de Flucloxacilline (DCI) (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 3 ml de solvant eau pour préparations injectables.

- Injectable à 500 mg :

Flacon de poudre contenant 500 mg de Flucloxacilline (DCI) (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 5 ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzylique à 3 %

- Injectable à 1 g :

Flacon de poudre contenant 1 g de Flucloxacilline (DCI) (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 5 ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzylique à 3 %

## PROPRIETES :

Antibiotique de la famille des bêta-lactamines du groupe des pénicillines isoxazoles semi-synthétiques, résistant à la pénicillinase staphylococcique ainsi qu'à l'acidité gastrique.

La Flucloxacilline est bactéricide. Elle agit au niveau de la synthèse de la paroi bactérienne.

Spectre d'activité : c'est avant tout un anti-staphylococcique, actif sur : staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, streptococcus pyogenes, streptococcus pneumoniae, s. viridans, clostridium spp, bacillus anthracis, neisseria spp

La Flucloxacilline diffuse largement dans les tissus. Elle est retrouvée dans le muscle, les poumons, les liquides d'épanchement péricardique, pleural, synovial, la lymphe, l'abcès non caséux, le tissu sous-cutané, les amygdales, l'os et l'oreille moyenne.

## INDICATIONS :

Découlent de son activité bactéricide anti-staphylococcique.

Son intérêt réside dans les staphylococcus cutanées, muqueuses, et les localisations de la sphère ORL.

Prophylaxie des infections post-opératoires (chirurgie cardio-thoracique et orthopédique).

Dans les infections pleuro-pulmonaires, ostéoarticulaires, les septicémies, les endocardites, le choc septique et les infections méningées, une association est habituellement conseillée.

**Ce médicament ne contenant pas de sucre, il peut être administré au diabétique et en cas de mauvais état dentaire ou de régime hypocalorique.**

## POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Voie orale : (1/2 heure avant les repas)

Adultes : 500 mg 3 à 4 fois / 24 heures

Enfants et Nourissons : 25 à 50 mg/kg/jour en 2 à 3 prises, soit une cuillerée-mesure dosée à 250 mg / 5 ml 2 à 3 fois par jour

# FLOXAM®

24 gélules 500 mg



ension orale dosée  
ension orale dosée  
ule de solvant po  
vant pour injection

de solvant eau ppr.  
solvant pour injection intra-musculaire (Alcool benzylique

que monohydraté)

**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

البد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سيسييلات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيبك أو الصيدلاني.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سيسييلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصعية الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس(التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد(مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب"في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفولات موفيتول يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكلسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة العديدة أو الجذر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوبازول.

مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول،إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات



**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

البد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سينيولات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيبك أو الصيدلاني.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفرطة ) لبروتين سينيولات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصعية الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكولسترانيم يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة العديدة أو الجذر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوبازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

البد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سيسييلات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. **ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :**

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.  
فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. **ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب :**

**لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :**

- إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سيسييلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصعية الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس(التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد(مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب"في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.
- التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :
- في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم  
لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.  
• ميكوفولات موفيتول يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.  
• انخفاض الإلتصاف المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من حموضة المعدة.  
• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكولسترانيم يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة للعديد أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازولم لتزويرازول و بانتوزول.

مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي في البراز.

**تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :**  
بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات (البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.  
يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات



**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

البد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سينيولات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيبك أو الصيدلاني.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينيولات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصباغ الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكلسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة العديدة أو الجذر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوزول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

البد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سينيولات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيبك أو الصيدلاني.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينيولات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصعية الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس(التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد(مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب"في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكلسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة للعديد أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوزول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول،إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات



**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

اليد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سينيولات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيبك أو الصيدلاني.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سينيولات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصباغ الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس(التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد(مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب"في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكلسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة للعديد أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوبازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول،إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

البد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سيسييلات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيبك أو الصيدلاني.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سيسييلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصعية الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكلسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة العديدة أو الجذر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوبازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات



**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

اليد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سيسييلات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيبك أو الصيدلاني.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سيسييلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصعية الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة، تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكولسترانيم يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة العديدة أو الجذر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوزول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

اليد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سينيولات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيبك أو الصيدلاني.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفرطة ) لبروتين سينيولات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديروني وداء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكلسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة العديدة أو الجذر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوزول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات



**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

البد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سينيولات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثاراً جانبياً غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيب أو الصيدلي عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينيولات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريتي وداء ترسب الأصباغ الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيب قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكولسترانيم يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة العديدة أو الجذر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوزول.

مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف إمتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة إمتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

البد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سينيولات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثاراً جانبياً غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيب أو الصيدلي عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينيولات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديروني وداء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيب قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكولسترانيم يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة العديدة أو الجذر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوبازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة القيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات



**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

البد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سيسييلات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيبك أو الصيدلاني.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سيسييلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصعية الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس(التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد(مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب"في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفولات موفيتول يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكلسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة العديدة أو الجذر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوزول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول،إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

البد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سيسييلات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيبك أو الصيدلاني.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سيسييلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصعية الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس(التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد(مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب"في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفولات موفيتول يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكلسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة العديدة أو الجذر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوزول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول،إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

البد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سيسييلات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيبك أو الصيدلاني.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سيسييلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصعية الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس(التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد(مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب"في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفولات موفيتول يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكلسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة للعديد أو الجذر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوزول.

مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول،إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات



**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

البد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سيسييلات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيبك أو الصيدلاني.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سيسييلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصعية الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس(التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد(مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب"في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكلسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة للعديد أو الجذر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوبازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول،إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

البد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سيسييلات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيبك أو الصيدلاني.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سيسييلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصعية الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس(التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد(مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب"في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكلسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة العديدة أو الجذر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزويبرازول وبانتوبازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول،إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

**FERPLEX® 40 mg**

**Fer protein succinylate**

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول

إذا كنت

الحص

مض

إذا

البد

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نشرة :

**فيربليكس 40 ملغ**

**بروتين سيسييلات الحديد**

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات.

من طبيبك أو الصيدلاني.

هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبيا غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

**فهرس النشرة :**

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيربليكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية ( حساسية مفردة ) لبروتين سيسييلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصباغ الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "نوب" في

أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيربليكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

لك تلك التي تم

لتي :

لخل العظم مثل

المفاصل).

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• ليفودوبا و كاردوبوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل العراشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيربليكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل

بين فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكلسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج الفرجة العديدة أو الجذر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنيزوبرازول وبانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيربليكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيربليكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

**الحمل والرضاعة :**

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيربليكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

**القيادة واستعمال الآلات :**

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

**معلومة هامة حول فيربليكس 40 ملغ محلول لشرب :**

هذا الدواء يحتوي على سريول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات



PV: 140,00 Dhs

# MEBO Pommade

Traitement des plaies infectées et des brûlures

## Introduction

Le traitement des brûlures dans la pratique médicale depuis de cette thérapie était d'augmenter le processus de la migration des kératocytes avec les facteurs de croissance. **MEBO** (Moist Exposed)

traitement des brûlures exposées à l'humidité) est donc la pommade spécialement développée pour répondre à ces critères.

## Composition

**MEBO** est originaire de plantes naturelles comestibles. Elle est composée de 0.25% de  $\beta$ -Sitostérol comme étant le principe actif majeur. La base de la pommade est constituée d'huile de Sésame et de la Cire d'abeille.

## Mode d'action

**MEBO** agit en:

- Fournissant un optimum d'humidité physiologique nécessaire à la régénération et à la réparation.
- Provoquant un effet anti-inflammatoire et réduisant cependant l'œdème et l'érythème.
- Créant une atmosphère défavorable à la colonisation bactérienne et fongique.
- Isolant et protégeant les extrémités nerveuses exposées et lésées produisant cependant un effet analgésique.
- Fournissant une nutrition locale pour les cellules de fond lésées.
- Liquéfiant les tissus nécrotiques.
- Isolant et protégeant les plaies du milieu ambiant mais en même temps en conservant un drainage ainsi qu'un échange gazeux efficace.
- Réduisant la perte de fluide de la peau endommagée (brûlures).
- Absorbant la chaleur résiduelle dans les brûlures aiguës.
- Activant l'épithélialisation dans un ordre exceptionnellement acceptable.

## Indications

**MEBO**

0,25% 

Pommade dermique

Tube de 30 g



6 118001 010110

PV: 140,00 Dhs

# MEBO Pommade

Traitement des plaies infectées et des brûlures

## Introduction

Le traitement des brûlures dans la pratique médicale depuis de cette thérapie était d'essayer le but d'augmenter le processus de la migration des kératocytes avec les facteurs de croissance.

**MEBO** (Moist Exposed) traitement des brûlures exposées à l'humidité) est donc la pommade spécialement développée pour répondre à ces critères.

## Composition

**MEBO** est originaire de plantes naturelles comestibles. Elle est composée de 0.25% de  $\beta$ -Sitostérol comme étant le principe actif majeur. La base de la pommade est constituée d'huile de Sésame et de la Cire d'abeille.

## Mode d'action

**MEBO** agit en:

- Fournissant un optimum d'humidité physiologique nécessaire à la régénération et à la réparation.
- Provoquant un effet anti-inflammatoire et réduisant cependant l'œdème et l'érythème.
- Créant une atmosphère défavorable à la colonisation bactérienne et fongique.
- Isolant et protégeant les extrémités nerveuses exposées et lésées produisant cependant un effet analgésique.
- Fournissant une nutrition locale pour les cellules de fond lésées.
- Liquéfiant les tissus nécrotiques.
- Isolant et protégeant les plaies du milieu ambiant mais en même temps en conservant un drainage ainsi qu'un échange gazeux efficace.
- Réduisant la perte de fluide de la peau endommagée (brûlures).
- Absorbant la chaleur résiduelle dans les brûlures aiguës.
- Activant l'épithélialisation dans un ordre exceptionnellement acceptable.

## Indications

**MEBO**

0,25% 

Pommade dermique

Tube de 30 g



6 118001 010110

PV: 140,00 Dhs

# MEBO Pommade

Traitement des plaies infectées et des brûlures

## Introduction

Le traitement des brûlures dans la pratique médicale depuis de cette thérapie était d'essayer le but d'augmenter le processus de la migration des kératocytes avec les facteurs de croissance.

**MEBO** (Moist Exposed) traitement des brûlures exposées à l'humidité) est donc la pommade spécialement développée pour répondre à ces critères.

## Composition

**MEBO** est originaire de plantes naturelles comestibles. Elle est composée de 0.25% de  $\beta$ -Sitostérol comme étant le principe actif majeur. La base de la pommade est constituée d'huile de Sésame et de la Cire d'abeille.

## Mode d'action

**MEBO** agit en:

- Fournissant un optimum d'humidité physiologique nécessaire à la régénération et à la réparation.
- Provoquant un effet anti-inflammatoire et réduisant cependant l'œdème et l'érythème.
- Créant une atmosphère défavorable à la colonisation bactérienne et fongique.
- Isolant et protégeant les extrémités nerveuses exposées et lésées produisant cependant un effet analgésique.
- Fournissant une nutrition locale pour les cellules de fond lésées.
- Liquéfiant les tissus nécrotiques.
- Isolant et protégeant les plaies du milieu ambiant mais en même temps en conservant un drainage ainsi qu'un échange gazeux efficace.
- Réduisant la perte de fluide de la peau endommagée (brûlures).
- Absorbant la chaleur résiduelle dans les brûlures aiguës.
- Activant l'épithélialisation dans un ordre exceptionnellement acceptable.

## Indications

**MEBO**

0,25% 

Pommade dermique

Tube de 30 g



6 118001 010110