

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/06/2022	C		150 JH	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 M'hamed KERMANE Pharmacie IBNOU KATIR Docteur en Pharmacie	14/06/22	1140,60

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement cancéreux.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	C
00000000	00000000
35533411	11433553

The diagram illustrates a dental arch with numbered teeth (1 through 8) in each quadrant. The quadrants are labeled: D (left), G (right), H (top), and B (bottom). The teeth are arranged in a standard dental sequence: upper arch (H) has teeth 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; lower arch (B) has teeth 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The diagram also shows the midline and the position of the tongue.

(Création, remont, adjonction)

ctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. ALLALI BENLHABIB Aïcha

Médecine Générale

Experte près les Tribunaux

CES de Microbiologie et Virologie
de la Faculté de Médecine de Nancy
Diplômée d'Université de Diabétologie
D.U. de Nutrition et Diététique Médicale

D.U. d'Ethographie Générale
de la Faculté de Médecine de Montpellier



الدكتورة علالى ابن الحبيب عائشة

الطب العام

- خبيرة لدى المحاكم

اختصاصية في علم المicrobiات و الفيروسات

من كلية الطب بنانسي

دبلوم داء السكري

دبلوم التغذية و علاج السمنة

دبلوم الشخص بالصدى

من كلية الطب بمونبولي

*M'hamed QERMANE
Docteur en Pharmacie
Casablanca, le 14.06.2022*

$$24.40 \times 4 = 97.60$$

ESSAÏD

RACHIDA



Levothyrox 100 n°(4)

$$13.40 \times 4 = 53.60$$

Levothyrox 50 n°(4) mahn



$$120.00 \times 6 = 720.00$$

IRVEL 150 mg:

N°(4)
1C à la mal-

120,00



66,00

Azimy 500 mg



1017

120,00

05 22 37 04 08

106، شارع الجولان سيدى عثمان - الدار البيضاء
106, Av. El Joulane Sidi Othmane - Casablanca

موريه ابن كثير
pharmacie IBNOU KATIR
M'hamed QERMANE
Docteur en Pharmacie
ib * TIR

F.TRENKA

Lot: 3916A
EXP: 10.2025
PPV: 91,00
91,00 DHS

مختبر بن كثير
pharmacie BEN KATIR
M'hamed GERMANE
Dacteur en Pharmacie
TIR

27.10 Muxol

100g 3x17

✓ S.V.

91,00 Eucarbon:

N°(2)

100g 3x17

a distance d'au.

✓ S.V.

22.70 Baycultur

100ml

100ml

✓ S.V.

22.20

Codoliprav

100g 3x17

40.40

Methosparmyl

100ml 3x17
au 1m.

✓ S.V.

Dr. BEN HABIB Aicha
OMNIPATHOGENNE
106 AV. EL JEDIDA - FIDI OTHMANE
Télé: 0522 37 04 08

1140.60

UTILISATEUR

comprimé sécable

orale



erck

lité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations

voir besoin de la relire.

errogez votre médecin ou votre pharmacien.

lement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes
vôtres.

et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet

UTILISATEUR

comprimé sécable

orale



erck

lité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations

voir besoin de la relire.

errogez votre médecin ou votre pharmacien.

lement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes
vôtres.

et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet

UTILISATEUR

comprimé sécable

orale



erck

lité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations

voir besoin de la relire.

errogez votre médecin ou votre pharmacien.

lement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes
vôtres.

et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet

UTILISATEUR

comprimé sécable

orale



erck

lité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations

voir besoin de la relire.

errogez votre médecin ou votre pharmacien.

lement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes
vôtres.

et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet

TEUR

orimé sécable



te notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations

de la relire.

re médecin ou votre pharmacien.

scrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes

able, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet
ette notice. Voir rubrique 4.

TEUR

orimé sécable



te notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations

de la relire.

re médecin ou votre pharmacien.

scrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes

able, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet
ette notice. Voir rubrique 4.

TEUR

orimé sécable



te notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations

de la relire.

re médecin ou votre pharmacien.

scrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes

able, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet
ette notice. Voir rubrique 4.

TEUR

orimé sécable



te notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations

de la relire.

re médecin ou votre pharmacien.

scrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes

able, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet
ette notice. Voir rubrique 4.

MUXOL® 0.3%

Solution buvable en flacons de 125 ml et 250 ml
(Chlorhydrate d'Ambroxol)

PPV (DH) :

LOT N° :

27,10

UT. AV. :

موكسول

أمبروكسول

بدون سكر

ce médicament.

s d'information à votre médecin ou à votre pharmacien,
ais à quelqu'un d'autre même en cas de symptômes

et indésirable non mentionné dans cette notice,

0.300 g

hydroxybenzoate de propyle, Arôme banane (Acétate de
l-butényle, acétoine, butyrate d'amyle,
nilline, propyléneglycol), Acide citrique monohydrate,

..... qsp 100 ml
et de propyle.

1.
P
C
Q
E
f
d
E
2.
M
(F)

3- INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Traitement des troubles de la sécrétion bronchique de l'adulte et de l'enfant, notamment au cours des affections bronchiques aigües et des épisodes aigus des bronchopneumopathies chroniques.

Ce médicament est expectorant. Il facilite l'évacuation par la toux des sécrétions bronchiques.

4- POSOLOGIE

• Chez l'adulte :

Posologie usuelle : 1 cuillère à soupe matin et soir.

• Chez l'enfant :

Plus de 5 ans : 1 cuillère à café trois fois par jour ;

2 à 5 ans : ½ cuillère à café trois fois par jour.

Mode d'administration

Voie orale

Fréquence d'administration

Les prises seront espacées à intervalle régulier.

Durée de traitement

La durée du traitement ne dépassera pas 8 à 10 jours sans avis médical.

5- CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais MUXOL, solution buvable :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament ;
- Ne donnez pas MUXOL à votre enfant de moins de 2 ans.

6- EFFETS INDÉSIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Rare : pouvant survenir au maximum chez 1 personne sur 1 000 :

Réaction d'hypersensibilité ;

Eruption cutanée, urticaire.

Fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données actuelles.

Azimycine® 500 mg Promopharm

Azithromycine

Boîte de comprimés enrobés sécables

■ attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

■ cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

■ avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

■ également vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être néf, même si les signes de leur maladie sont identiques.

■ des effets indésirables devant grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

notice :

■ qu'Azimycine 500 mg Promopharm et dans quels cas est-il utilisé ?

■ joint les informations à connaître avant de prendre Azimycine 500 mg Promopharm ?

■ il prendre Azimycine 500 mg Promopharm ?

■ nt les effets indésirables éventuels ?

■ il conserver Azimycine 500mg Promopharm ?

■ ions supplémentaires.

■ o qu'Azimycine 500 mg Promopharm et dans quel cas est-il utilisé ?

■ HARMO THÉRAPEUTIQUE

■ à usage systémique - code ATC : J01FA10

INDICATIONS

■ nent est un antibiotique antibactérien de la famille des macrolides.

INDICATIONS

■ jut dans le traitement de certaines infections bactériennes à germes sensibles.

■ sont les informations à connaître avant la prise du médicament.

■ Informations nécessaires avant la prise du médicament

■ Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

CONTRE-INDICATIONS

■ Ne prenez jamais Azimycine 500 mg Promopharm

■ Si vous êtes allergique à l'azithromycine, à l'érythromycine, à tout autre antibiotique macrolide, au kétolide ou à tout expliquant mentionné dans la rubrique 5,

■ En cas d'association avec la dihydroergotamine et l'ergotamine (médicaments antimigraineux).

■ En cas d'association avec le Cisapride (médicament anti-reflux),

■ En cas d'insuffisance hépatique sévère.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : MISES EN GARDE SPÉCIALES :

■ Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre ce médicament.

Prendre des précautions particulières avec Azimycine 500 mg Promopharm :

■ Si vous présentez un gonflement du visage ou du cou (œdème) ou une éruption cutanée accompagnée de cloques sur la peau, de plaies dans la bouche, ou d'une inflammation des

■ VOS DEVEZ ARRÊTER LE TRAITEMENT ET CONTACTER VOTRE MÉDECIN IMMÉDIATEMENT car ces effets peuvent mettre votre vie en danger ou entraîner le décès.

■ Si vous remarquez sur votre peau un symptôme correspondant à une éruption cutanée méntrante, autre effet associé, une coloration jaune de la peau, des urines foncées, une tendance aux saignements, une modification de votre état de conscience ou de votre comportement, survêtu de diarrhées sévères, de myopathie (maladie auto-immune musculaire qui se manifeste principalement par une faiblesse musculaire) ou encore des troubles cardiaques, prévenez votre médecin immédiatement, afin qu'il vous indique si vous devez arrêter votre traitement et le remplacer par un autre antibiotique.

■ L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance à la galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

■ Ce médicament contient du « Parahydroxybenzoate » et peut provoquer des réactions allergiques. Avant de prendre ce traitement, prévenez votre médecin si à l'occasion d'un traitement

■ antibiotique antérieur vous avez présenté une urticaire ou autres éruptions cutanées, démangeaison, œdème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique).

■ Avant de prendre ce traitement, prévenez votre médecin en cas de :

■ Maladie rénale,

■ Maladie du foie sévère,

Baycutène® N

Crème



crème pour application locale.

ion locale.

LOT : PER : PPV : contient 0,012 g de clotrimazole et 0,0443 g d'acétate de améthasone).

ol benzylique, Alcool cétostéarylque, triglycérides à Hostaphat KW et l'eau purifiée.

Indication thérapeutique

corticostéroïde et d'un antifongique imidazolé à large

crème est préconisé dans les infections fongiques osante anti-inflammatoire importante.

ns

Baycutène® N crème est contre-indiqué en cas de :

au clotrimazole,

sensibilité à l'alcool cétostéarylque ou à l'un des autres

anées spécifiques (syphilis, tuberculose),

anées d'origine virale (herpes, rosacée),

vaccination antivariolique,

ibuccale,

exclusif en cas d'eczéma atopique,

premier trimestre de la grossesse.

de la grossesse ainsi que chez les nourrissons,

ne doit pas être appliqué sur des surfaces cutanées

endant une longue durée. Il ne doit pas non plus être

en allaitant.