

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

119134

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 02538

Société :

Actif  Pensionné(e)

Autre : *Véhicule Loyer*

Nom & Prénom : CHAHID CHAMIA

Date de naissance : 13/06/1944

Adresse :

Tél. : 0667672569

Total des frais engagés : 1944,70 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 02/06/2012

Nom et prénom du malade : NEMO CHAHID CHAMIA Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint

Nature de la maladie : DT + HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : \_\_\_\_\_ Le : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Signature de l'adhérent(e) :

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/06/2012	g	1	30.000	Octeu Endocrinologue 101, Avenue Al Massoum app. N°2, Sadi Mardouf - Casablanca Tél : 052 97 57 37
04/06/2012	g	1	(1)	LE LIJAR

## EXECUTION DES ORDONNANCES

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
 <b>LABORATOIRE AL MOUTAHIB</b> <b>Dr LAHAR BAHJJA</b> <b> Médecin Biologiste</b> <b>Résidence Al Madina</b> <b>72073623</b>	3.6.22	580.B.	600,20

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

### **(Création, remont, adjonction)**

## Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

A diagram of a dental arch (maxilla) with numbered teeth. The teeth are labeled with numbers 1 through 8 on both the upper and lower arches. A coordinate system is overlaid on the arch, with the vertical axis pointing upwards and the horizontal axis pointing to the left. The origin is at the center of the arch. The teeth are arranged in a curve, with the upper arch curving upwards and the lower arch curving downwards. The teeth are labeled with numbers 1 through 8 on both the upper and lower arches. The vertical axis points upwards, and the horizontal axis points to the left. The origin is at the center of the arch.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Docteur Samia NEJJAR

Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca  
Médecine interne des Hôpitaux de Paris  
(Hôtel Dieu de Paris)

## Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie Maladies Métaboliques et Nutrition

- Diabète • Goitre • Obésité • Hypertension artérielle
- Cholestérol • Stérilité • Trouble de croissance et de puberté • Pathologie surrénalienne & hypophysaire
- Pose de Pompe à Insuline •

# الدكتورة سامية النجار

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء  
طبيبة داخلية سابقاً بمستشفيات باريس

اختصاصية في أمراض الغدد، السكري، السمنة

- الغدة الدرقية • داء السكري • السمنة • الكوليستيrol
- الضغط الدموي • أمراض التغذية والبلوغ • العقم
- أمراض الكظران و الغدة النخامية

تركيب مضخة الأنسولين

38,10  
x 3

Casablanca, le... 14/6/2022.....



7th CHAHID CHADA



1) GLYCAN 870 RETARD

78,70

2) DIAMICET N°60 0-11 au mli du gas

1000 1000 JUN

3m/s -

3) COVERAM 10/5 x 3

100

3m/s -

3m/s -

$T = 1044,70$

PHARMACE EL KARTI  
100, 1 Imm. A 239 GH 27 Mousakbal  
Sidi Maârouf - Casablanca  
Tél: 05 22 58 38 11  
Fax: 05 22 97 57 35

Docteur Samia NEJJAR  
Endocrinologue - Diabétologue  
Complexe Al Moustakbal, Imm. 107, GH04  
appt. N°2, Sidi Maârouf - Casablanca  
Tél / Fax : 022 97 57 35

إقامة المستقبل، عمارة 107، GH 04، شقة 2، سيدى معروف - الدار البيضاء  
Résidence Al Moustakbal, Imm. 107, GH 04, appt. 2 - Sidi Maârouf - Casablanca  
Tél.: 05 22 97 57 35 / 05 20 12 92 04 - الهاتف: Fax: 05 22 97 56 44 - الفاكس:



# DIAMICRON® 60 mg

Gliclazide

Comprimés sécables à Libération Modifiée

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'en prendre car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement et ne doit pas être donné à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, car les maladies sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet secondaire, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'agit d'un effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
3. Comment prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE DIAMICRON 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : sulfamide hypoglycémiant - dérivé de l'urée - code ATC : A10BB09

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est un médicament qui réduit le taux de sucre dans le sang (antidiabétique oral appartenant à la classe des sulfonylurées).

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est indiqué dans certaines formes de diabète (diabète de type 2 non insulino-dépendant) chez l'adulte, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids seuls ne sont pas suffisants pour obtenir une glycémie (taux de sucre dans le sang) normale.

- si votre foie ne fonctionne pas correctement.
- Si vous avez des maux de tête, agressivité, confusion, troubles de la vue et sensations de vertiges.

Les signes

SERVIER MAROC

DIAMICRON® 60 mg  
30 comprimés



6 118 001 130 160

30 Comprimés sécables à Libération Modifiée  
Gliclazide  
DIAMICRON® 60 mg

ivants :  
neil, agitation,  
s, dépression,  
riels, vertiges

peau moite,  
la pression  
des proches

offrir d'une  
froid, votre  
vous pouvez

rapidement  
orceaux de

, morceaux  
ez contacter  
fficace ou si

242600030-02

## Symptômes

Les symptômes d'une hypoglycémie peuvent être doux, ou moins évidents ou se développer très lentement ou vous pouvez ne pas vous rendre compte à temps que votre taux de sucre dans le sang a baissé. Ceci peut se produire chez les personnes âgées qui prennent certains médicaments (par exemple les médicaments agissant sur le système nerveux central et les bêta-bloquants).

Si vous êtes en situation de stress (par exemple accidents, opération chirurgicale, fièvre, ...), votre médecin peut temporairement faire un relais par un traitement par insuline.

Les symptômes d'une hyperglycémie (fort taux de sucre dans le sang) peuvent survenir lorsque le traitement par gliclazide n'a pas encore suffisamment réduit la glycémie, lorsque vous n'avez pas respecté le traitement prescrit par votre médecin si vous prenez des préparations à base de Millepertuis (Hypericum perforatum) (voir rubrique «Autres médicaments et DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée») ou dans des situations particulières de stress. Ces derniers peuvent inclure soif, envie fréquente d'uriner, bouche sèche, peau sèche qui démange, infections de la peau et performances réduites.

Si ces symptômes surviennent, vous devez contacter votre médecin ou votre pharmacien. Une perturbation de la glycémie (faible ou fort taux de sucre dans le sang) peut survenir lorsque le gliclazide est prescrit en même temps que des médicaments de la classe des antibiotiques appelés fluoroquinolones, en particulier chez les patients âgés. Dans ce cas, votre médecin vous rappellera l'importance de surveiller votre glycémie.

Si vous avez des antécédents familiaux ou si vous êtes atteint d'un déficit en

## COVERAM® 5 mg / 5 mg Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

## COVERAM® 10 mg / 5 mg Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

Veuillez Lire attentivement

- Gardez cette notice. Vous
- Si vous avez d'autres questions
- Ce médicament vous a été prescrit car vos symptômes sont identiques à ceux d'une maladie dont vous avez été atteint.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, ne serait pas mentionné

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que COVERAM, comprimé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COVERAM ?
3. Comment prendre COVERAM, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver COVERAM, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres.

### 1. QU'EST-CE QUE COVERAM, COMPRIMÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs calciques.

Code ATC : C09BB04

COVERAM, comprimé est indiqué dans le traitement de la maladie de l'artériosclérose et de l'infarctus du myocarde. Les patients qui prennent déjà des médicaments contenant de l'amiodipine peuvent à la place recevoir un comprimé de COVERAM, comprimé qui contient les deux principes actifs.

COVERAM, comprimé est une association de deux principes actifs, péridopril et amiodipine.

Le péridopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC). L'amiodipine est un antagoniste calcique (qui appartient à la classe des dihydropyridines). Ceux-ci agissent en dilatant et en décontractant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais COVERAM, comprimé :

- si vous êtes allergique au péridopril ou à tout autre inhibiteur de l'enzyme de conversion ou à l'amiodipine ou aux autres inhibiteurs calciques, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (Cf. « Contenu de l'emballage et autres »).

## COVERAM® 5 mg / 10 mg Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

## COVERAM® 10 mg / 10 mg Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

car elle contient des informations importantes pour vous.

ou votre infirmier/ère, autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur état sont peu marqués.

ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui pourraient survenir (effets secondaires éventuels ?)

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre COVERAM, comprimé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de COVERAM, comprimé. COVERAM, comprimé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

#### Allaitement

Il a été démontré que l'amiodipine est excrétée dans le lait maternel en petites quantités.

Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes sur le point de commencer à allaiter. COVERAM, comprimé est déconseillé aux femmes qui allaitent et votre médecin pourra choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou un prématuré.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

COVERAM, comprimé peut affecter votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Si avec le traitement, vous ne vous sentez pas bien, si vous avez la tête qui tourne, si vous vous sentez faible ou fatigué, ou si vous présentez des maux de tête, vous ne devez pas conduire de véhicules ni utiliser de machines et contactez votre médecin immédiatement.

#### COVERAM, comprimé contient du lactose monohydraté

Si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### 3. COMMENT PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Avalez votre comprimé avec un verre d'eau, de préférence au même moment de la journée, le matin, avant le repas. Votre médecin décidera de la posologie adaptée pour vous.

La dose habituelle est de 1 comprimé par jour.

269,00

## COVERAM® 10 mg/5 mg

Péridopril arginine / amlodipine

30 comprimés



6 118001 130092

## COVERAM® 5 mg / 5 mg Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

## COVERAM® 10 mg / 5 mg Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

Veuillez Lire attentivement

- Gardez cette notice. Vous
- Si vous avez d'autres questions
- Ce médicament vous a été prescrit car vos symptômes sont identiques à ceux d'une maladie dont vous avez été atteint.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, ne serait pas mentionné

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que COVERAM, comprimé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COVERAM ?
3. Comment prendre COVERAM, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver COVERAM, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres.

### 1. QU'EST-CE QUE COVERAM, COMPRIMÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs calciques.

Code ATC : C09BB04

COVERAM, comprimé est indiqué dans le traitement de la maladie de l'artériosclérose et de l'infarctus du myocarde. Les patients qui prennent déjà des médicaments contenant de l'amiodipine peuvent à la place recevoir un comprimé de COVERAM, comprimé qui contient les deux principes actifs.

COVERAM, comprimé est une association de deux principes actifs, péridopril et amiodipine.

Le péridopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC). L'amiodipine est un antagoniste calcique (qui appartient à la classe des dihydropyridines). Ceux-ci agissent en dilatant et en décontractant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais COVERAM, comprimé :

- si vous êtes allergique au péridopril ou à tout autre inhibiteur de l'enzyme de conversion ou à l'amiodipine ou aux autres inhibiteurs calciques, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (Cf. « Contenu de l'emballage et autres »).

## COVERAM® 5 mg / 10 mg Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

## COVERAM® 10 mg / 10 mg Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

car elle contient des informations importantes pour vous.

ou votre infirmier/ère, autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur état sont peu marqués.

ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui pourraient survenir (effets secondaires éventuels ?)

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre COVERAM, comprimé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de COVERAM, comprimé. COVERAM, comprimé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

#### Allaitement

Il a été démontré que l'amiodipine est excrétée dans le lait maternel en petites quantités.

Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes sur le point de commencer à allaiter. COVERAM, comprimé est déconseillé aux femmes qui allaitent et votre médecin pourra choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou un prématuré.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

COVERAM, comprimé peut affecter votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Si avec le traitement, vous ne vous sentez pas bien, si vous avez la tête qui tourne, si vous vous sentez faible ou fatigué, ou si vous présentez des maux de tête, vous ne devez pas conduire de véhicules ni utiliser de machines et contactez votre médecin immédiatement.

#### COVERAM, comprimé contient du lactose monohydraté

Si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### 3. COMMENT PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Avalez votre comprimé avec un verre d'eau, de préférence au même moment de la journée, le matin, avant le repas. Votre médecin décidera de la posologie adaptée pour vous. La dose habituelle est de 1 comprimé par jour.

269,00

## COVERAM® 10 mg/5 mg

Péridopril arginine / amlodipine

30 comprimés



6 118001 130092

## COVERAM® 5 mg / 5 mg Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

## COVERAM® 10 mg / 5 mg Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

Veuillez Lire attentivement

- Gardez cette notice. Vous
- Si vous avez d'autres questions
- Ce médicament vous a été prescrit car vos symptômes sont identiques à ceux d'une maladie dont vous avez été atteint.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, ne serait pas mentionné

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que COVERAM, comprimé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COVERAM ?
3. Comment prendre COVERAM, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver COVERAM, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres.

### 1. QU'EST-CE QUE COVERAM, COMPRIMÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs calciques.

Code ATC : C09BB04

COVERAM, comprimé est indiqué dans le traitement de la maladie de l'artériosclérose et de l'infarctus du myocarde. Les patients qui prennent déjà des médicaments contenant de l'amiodipine peuvent à la place recevoir un comprimé de COVERAM, comprimé qui contient les deux principes actifs.

COVERAM, comprimé est une association de deux principes actifs, péridopril et amiodipine.

Le péridopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC). L'amiodipine est un antagoniste calcique (qui appartient à la classe des dihydropyridines). Ceux-ci agissent en dilatant et en décontractant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais COVERAM, comprimé :

- si vous êtes allergique au péridopril ou à tout autre inhibiteur de l'enzyme de conversion ou à l'amiodipine ou aux autres inhibiteurs calciques, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (Cf. « Contenu de l'emballage et autres »).

## COVERAM® 5 mg / 10 mg Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

## COVERAM® 10 mg / 10 mg Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

car elle contient des informations importantes pour vous.

ou votre infirmier/ère, autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur état de santé sont peu marqués.

ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui pourraient survenir (effets secondaires éventuels ?)

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre COVERAM, comprimé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de COVERAM, comprimé. COVERAM, comprimé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

#### Allaitement

Il a été démontré que l'amiodipine est excrétée dans le lait maternel en petites quantités.

Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes sur le point de commencer à allaiter. COVERAM, comprimé est déconseillé aux femmes qui allaitent et votre médecin pourra choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou un prématuré.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

COVERAM, comprimé peut affecter votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Si avec le traitement, vous ne vous sentez pas bien, si vous avez la tête qui tourne, si vous vous sentez faible ou fatigué, ou si vous présentez des maux de tête, vous ne devez pas conduire de véhicules ni utiliser de machines et contactez votre médecin immédiatement.

#### COVERAM, comprimé contient du lactose monohydraté

Si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### 3. COMMENT PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Avalez votre comprimé avec un verre d'eau, de préférence au même moment de la journée, le matin, avant le repas. Votre médecin décidera de la posologie adaptée pour vous.

La dose habituelle est de 1 comprimé par jour.

269,00

## COVERAM® 10 mg/5 mg

Péridopril arginine / amlodipine

30 comprimés



6 118001 130092

# GLYCAN®

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### a) dénomination commerciale

1.GLYCAN-500, comprimé

2.GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

### b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl big)

2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl big)

### c) Formes pharmaceutiques et présentations

1.GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et boîte 1

2.GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé, bo

### d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabét

## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les cas de diabète de type 2, lorsque il y a surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit pas à contrôler le diabète non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline. Il peut aussi être associé à l'insuline dans certains cas.

## 3. ATTENTION!

### a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglucidique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.

38,10

PPV

LOT

PER

GLYCAN® Retard 850

60 comprimés enrobés



and il  
diabète  
ment de  
onylurés.

6 118000 180203

# GLYCAN®

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### a) dénomination commerciale

1.GLYCAN-500, comprimé

2.GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

### b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl big)

2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl big)

### c) Formes pharmaceutiques et présentations

1.GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et boîte 1

2.GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé, bo

### d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabét

## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les cas de diabète de type 2, lorsque le régime prescrit ne suffit pas à contrôler la glycémie, lorsque le diabète n'est pas traité par l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, lorsque l'insuline dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres traitements.

## 3. ATTENTION!

### a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglucidique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.

38,10

PPV

LOT

PER

GLYCAN® Retard 850

60 comprimés enrobés



and il  
diabète  
ment de  
onylurés.

# GLYCAN®

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### a) dénomination commerciale

1.GLYCAN-500, comprimé

2.GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

### b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl big)

2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl big)

### c) Formes pharmaceutiques et présentations

1.GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et boîte 1

2.GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé, bo

### d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabét

## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les cas de diabète de type 2, lorsque il y a surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit pas à contrôler le diabète non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline. Il peut aussi être associé à l'insuline dans certains cas.

## 3. ATTENTION!

### a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglucidique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.

38,10

PPV

LOT

PER

GLYCAN® Retard 850

60 comprimés enrobés



and il  
diabète  
ment de  
onylurés.

# Docteur Samia NEJJAR

Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca  
Ancienne interne des Hôpitaux de Paris  
(Hôtel Dieu de Paris)

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie  
Maladies Métaboliques et Nutrition

- Diabète • Goitre • Obésité • Hypertension artérielle
- Cholestérol • Stérilité • Trouble de croissance et de puberté • Pathologie surrénalienne & hypophysaire
- Pose de Pompe à Insuline •

Casablanca, le... 02/03/22

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء  
طبيبة داخلية سابقا بمستشفيات باريس

اختصاصية في أمراض الغدد، السكري، السمنة

- الغدة الدرقية • داء السكري • السمنة • الكوليستيول
- الضغط الدموي • أمراض النمو والبلوغ • العقم
- أمراض الكظران و الغدة النخامية

تركيب مضخة الأنسولين

ن = CHAHID CHATA

- Hb acé, uraf
- DfC1, nest
- CHT, TG, TSH us





# مختبر المستقبل للتحاليل الطبية

## LABORATOIRE AL MOUSTAKBAL D'ANALYSES MEDICALES

Docteur Bahija LAHRAR

Médecin Spécialiste en Analyses Médicales (Biologiste)  
Spécialiste en Diagnostic et Thérapeutique des couples infertiles  
(IA-FIV-ICSI) Paris - France  
Ex Enseignante à la faculté de médecine  
CHU Ibn Rochd Casablanca  
DU de management de la qualité université Bordeaux

Edité le : 03-juin-22



INPE 093060754

Facture N°: 2607/22

Référence:	
Date de prélèvement	vendredi 3 juin 2022
Nom Prénom	CHAHID CHAMA
Médecin:	SAMIA NEJJAR

6 030622 191422

Patente (TP) 36155845  
ICE 001635929000031

Analyses	Cotation B	Total
1E	20	26,80
Cholestérol total	30	40,20
Clairance créatininique	60	80,40
Créatininique	30	40,20
Glycémie à jeun	30	40,20
Hémoglobine glyquée A1c	100	134,00
Triglycerides	60	80,40
TSH ultrasensible	250	335,00
	580 B	777,20 dh
	Remise	177,00 dh
<b>Net à payer TTC</b>		<b>600,20 dh</b>

Arrête la présente facture à la somme de SIX CENTS DIRHAMS ET VINGT CENTIMES

Dr bahija LAHRAR

Médecin Biologiste

Dr LAHRAR BAHJA

Médecin Biologiste



# مختبر المستقبل للتحاليل الطبية

## LABORATOIRE AL MOUSTAKBAL D'ANALYSES MEDICALES

Docteur Bahija LAHRAR

Médecin Spécialiste en Analyses Médicales (Biologiste)  
Spécialiste en Diagnostic et Thérapeutique des couples infertiles  
(IA-FIV-ICSI) Paris - France  
Ex Enseignante à la faculté de médecine  
CHU Ibn Rochd Casablanca  
DU de management de la qualité université Bordeaux

Edited le : 03-juin-22

 CHAHID CHAMA

<u>Date de prélèvement :</u>	vendredi 3 juin 2022	19142
<u>Référence :</u>	 6 030622 191422	
<u>Nom Prénom :</u>	CHAHID CHAMA	
<u>Médecin :</u>	SAMIA NEJAR	

### COMPTE RENDU D'ANALYSES

Profil	Analyse	Résultat	VR: Valeurs de références
..Diabète	Glycémie à jeun .....	0,96	. 0,65 - 1,10 g/l
.....Clairances	Clairance créatinine(MDRD).....	78	. 80 - 120 ml/mn/1,
Diabète	Hémoglobine glyquée A1c .....	8,3	4,5 - 6,3 %
Ionogramme	Créatinine .....	9	7 - 12 mg/l
Lipides	Cholestérol total .....	1,63	1,50 - 2,00 g/l
	Triglycerides .....	1,29	0,50 - 1,30 g/l.
Thyroidien	TSH ultrasensible .....	2,1	0,25 - 5 µU/ml

#### Observations

Dr Bahija LAHRAR  
Médecin Biologiste

LABORATOIRE AL MOUSTAKBAL  
Dr LAHRAR BAHJA  
Médecin Biologiste  
29, Résidence Al Madina  
Sidi Maârouf Casablanca