

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° M21- 048421

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2352

Société : RAM

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : EL COUHEN - MASSANE

Date de naissance : 12/03/53

Adresse : Residence by M AL Houda n°02

Tél : 062 160929

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 09/06/2022

Nom et prénom du malade : EL COUHEN

Lien de parenté : ☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : Gène Respiratoire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A215 / 2019

Abdelaziz BAKHATAR
Médecin - Rhumatologue - Allergologue
S.P.J. Allal Ben Abdellah - 6ème Etage - Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge - Casablanca
Tél : 05 22 20 45 45

MUPRAS
20 JUN 2022
ACCUEIL

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09/06/22	Cs	①	C3 300,00	 Pr. Abdelaziz BAKHTIAR Pneumo-Phthisiologue Allergues Abdelmoumen Angle St. Anoua Capitale d'Angkor 1er Etage N° 1 Tél: (212) 522 99 66 24

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	09/06/22	

[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'OD

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'OD

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT
MASTICATOIRE

H			G	
25533412	00000000		21433552	00000000
D			B	
00000000	35533411		00000000	11433553

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS


DATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Professeur Abdelaziz BAKHATAR

Ancien Professeur de l'Enseignement Supérieur
à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de
Casablanca

Diplômé A.F.S.A. (Attestation de Formation
Spécialisée Approfondie, Hôpital Beaujon, Paris)
Pléthysmographie avec D.L.C.O. / Gaz du sang



الدكتور عبد العزيز باخطار
أستاذ التعليم العالي سابقا
بكلية الطب و الصيدلة بالدار البيضاء
شهادة A.F.S.A. (شهادة التدريب المتخصص
المعمق بمستشفى بوجون، باريس)
قياس الوظيفة التنفسية / قياس الأكسجين في الدم

Casablanca, le في الدار البيضاء،

09.06.2022

Mr. ELCOUHEN HASSAN

1 XANTHINUM 200 mg gel LP : B/30

Prendre 1 gel par jour, pendant 3 mois

2 ULTIBRO BREEZHALER 110UG/50UG

Faire 1 inhalation en inspiration bucc le matin, avant le repas, pendant 5 mois.

3 BRONCHODUAL 50 UG

Prendre 2 bouffées le matin et le soir, pendant 6 jours.



Pr. Abdelaziz BAKHATAR
Pneumo-Phisiologue Allergologue
16, Bd. Abdelmoumen Angle Bd Anoual
Casablanca - Tél: (212) 522 99 66 24



ULTIBRO®BREEZHALER®

110 µg/50 µg

Poudre pour inhalation
en gélule. Boîte de 30.

PPV : 843 DH



6 118001 031481

ULTIBRO®BREEZHALER®

110 µg/50 µg

Poudre pour inhalation
en gélule. Boîte de 30.

PPV : 843 DH



6 118001 031481

ULTIBRO®BREEZHALER®

110 µg/50 µg

Poudre pour inhalation
en gélule. Boîte de 30.

PPV : 843 DH



6 118001 031481

ULTIBRO®BREEZHALER®

110 µg/50 µg

Poudre pour inhalation
en gélule. Boîte de 30.

PPV : 843 DH



6 118001 031481

ULTIBRO®BREEZHALER®

110 µg/50 µg

Poudre pour inhalation
en gélule. Boîte de 30.

PPV : 843 DH



6 118001 031481



6 118001 041060

BRONCHODUAL 50 µg/20 µg/dose

(Bromhydrate de fénotérol/Bromure d'ipratropium anhydre)

Solution pour inhalation en flacon pressurisé

Flacon de 200 doses

BOTTU S.A.

PPV: 102 DH 90

312837-02

Si vous prenez un produit ou un médicament contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*), il est nécessaire d'interrompre sa prise AVANT de commencer un traitement par Xanthium LP.

Si vous êtes actuellement traité simultanément par un médicament ou un produit contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*) et Xanthium LP, il ne faut pas arrêter spontanément la prise du millepertuis sans avoir consulté un médecin car cette décision pourrait nécessiter une adaptation de la posologie de Xanthium LP.

Enfant et adolescents

Ne pas prendre Xanthium LP avant l'âge de 6 ans.

Autres médicaments et Xanthium LP
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

L'association avec les sympathomimétiques par inhalation permet de diminuer la posologie des deux substances et ainsi de diminuer le risque d'effets non désirés.

La théophylline peut augmenter les effets sur le cœur si elle est associée à des médicaments digitaux.

Certains médicaments peuvent diminuer la vitesse d'élimination de la théophylline.

Ces médicaments suivants nécessiteront une diminution des doses

de, tréandromycine, clarithromycine, lincomycine,

diméthidine, gels d'aluminium,

prénolol, alprénolol, labétalol,

azine, diltiazem, interféron alfa-2a, ticlopidine,

ne).

Prévenez l'élimination de la théophylline et nécessiteront des doses :

es (barbituriques, phénytoïne, carbamazépine ...).

Le médicament doit être signalé au médecin car il faudra

de du médicament : il sera également averti de la

les doses de théophylline devront alors être

(carbonate de lithium) verront leurs doses

théophylline.

line avec l'éphédrine et les freinateurs d'appétit

liée car les effets non désirés de ces substances

ptifs oraux, la tacrine, le vérapamil et le vaccin

ne augmentation du taux de théophylline.

une diminution du taux de théophylline.

entre le millepertuis (*Hypericum perforatum*) et

thium LP. Cette interaction est probablement due

ymes du foie. Il faut donc éviter de prendre un

ase de millepertuis (*Hypericum perforatum*) en

antagoniste de l'action pharmacologique des

Les risques de surdosage sont généralement plus fréquents chez les patients âgés, ainsi que chez les personnes atteintes de troubles hépatiques, d'une défaillance cardiaque ou de fièvre prolongée.

Le médecin sera averti en cas d'apparition de l'un de ces troubles. Une hospitalisation pourra être jugée nécessaire en présence de signes manifestes d'intoxication.

On traitera une intoxication à la théophylline par vidange gastrique ou par utilisation de charbon actif : des sédatifs (par exemple du diazépam à raison de 5-10 mg en i.v. (enfants 0,1 à 0,2 mg/kg en injection intraveineuse) seront administrés en cas de convulsions ; oxygénation, maintien de la pression artérielle, traitement de la déshydratation (maintien de l'équilibre hydro-électrolytique), hémoperfusion avec résines.

Une hémoperfusion doit être pratiquée si les taux de théophylline sont supérieurs à :

• 40 à 60 µg/ml chez un patient déjà traité,

• 80 µg/ml chez un patient non traité,

• 50 µg/ml chez un patient âgé de plus de 60 ans ou en cas d'insuffisance cardiaque ou hépatique.

Une hémodialyse est aussi efficace qu'une hémoperfusion.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Xanthium LP, prenez immédiatement contact avec votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre Xanthium LP
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Xanthium LP
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ces effets sont souvent dus à la prise de trop fortes doses et peuvent consister en :

• Affections du système immunitaire : réactions d'hypersensibilité : urticaire, prurit avec thrombocytopénie et diathèse hémorragique ;

• Plus rarement, dermatites de contact, érythrodermie exfoliative accompagnée de bronchospasme ;

• Affections endocriniennes : troubles du métabolisme et de la nutrition : hypokaliémie, hyperglycémie, hypophosphatémie, hypomagnésémie, sécrétion d'hormones antidiurétiques, anomalies lipidiques, poignée ;

• Affections du système nerveux : insomnie, nervosité, maux de tête, irritabilité, tremblements, convulsions ;

• Affections cardiovasculaires : troubles du rythme, hypotension ;

• Affections cardiaques : affections vasculaires ; accélération de la

• Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : accélération de la respiration, arrêt de la respiration, alcalose respiratoire ;

• Affections gastro-intestinales : nausées, douleurs d'estomac, vomissements, diarrées, manque d'appétit, vomissements sanglants, ulcère peptique et

• Affections oculaires : effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou

• Affections cutanées : effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou

• Affections musculaires : effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou

• Affections hépatiques : effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou

• Affections rénales : effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou

• Affections sanguines : effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou

• Affections autres : effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou

Xanthium LP 200 mg
30 gélules à libération prolongée
AMM N° 308/17 DMP/21/NRQ



6 118001 070954

LOT 20K02 1
EXP 11 2023
PPV 21.80 DH

Si vous prenez un produit ou un médicament contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*), il est nécessaire d'interrompre sa prise AVANT de commencer un traitement par Xanthium LP.

Si vous êtes actuellement traité simultanément par un médicament ou un produit contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*) et Xanthium LP, il ne faut pas arrêter spontanément la prise du millepertuis sans avoir consulté un médecin car cette décision pourrait nécessiter une adaptation de la posologie de Xanthium LP.

Enfant et adolescents

Ne pas prendre Xanthium LP avant l'âge de 6 ans.

Autres médicaments et Xanthium LP
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

L'association avec les sympathomimétiques par inhalation permet de diminuer la posologie des deux substances et ainsi de diminuer le risque d'effets non désirés.

La théophylline peut augmenter les effets sur le cœur si elle est associée à des médicaments digitaux.

Certains médicaments peuvent diminuer la vitesse d'élimination de la théophylline.

Ces médicaments suivants nécessiteront une diminution des doses

et, troléandromycine, clarithromycine, lincomycine,

diméthidine, gels d'aluminium),

prénolol, alprénolol, labétalol),

azine, diltiazem, interféron alfa-2a, ticlopidine,

ne).

rent l'élimination de la théophylline et nécessiteront la diminution des doses :

as (barbituriques, phénytoïne, carbamazépine ...).

ment doit être signalé au médecin car il faudra

de du médicament : il sera également averti de la

les doses de théophylline devront alors être

(carbonate de lithium) verront leurs doses

théophylline.

line avec l'éphédrine et les freinateurs d'appétit

liée car les effets non désirés de ces substances

ptifs oraux, la tacrine, le vérapamil et le vaccin

ne augmentation du taux de théophylline.

une diminution du taux de théophylline.

entre le millepertuis (*Hypericum perforatum*) et

thium LP. Cette interaction est probablement due

ymes du foie. Il faut donc éviter de prendre un

ase de millepertuis (*Hypericum perforatum*) en

Les risques de surdosage sont généralement plus fréquents chez les patients âgés, ainsi que chez les personnes atteintes de troubles hépatiques, d'une défaillance cardiaque ou de fièvre prolongée.

Le médecin sera averti en cas d'apparition de l'un de ces troubles. Une hospitalisation pourra être jugée nécessaire en présence de signes manifestes d'intoxication.

On traitera une intoxication à la théophylline par vidange gastrique ou par utilisation de charbon actif : des sédatifs (par exemple du diazépam à raison de 5-10 mg en i.v. (enfants 0,1 à 0,2 mg/kg en injection intraveineuse) seront administrés en cas de convulsions ; oxygénation, maintien de la pression artérielle, traitement de la déshydratation (maintien de l'équilibre hydro-électrolytique), hémoperfusion avec résines.

Une hémoperfusion doit être pratiquée si les taux de théophylline sont supérieurs à :
• 40 à 60 µg/ml chez un patient déjà traité,
• 80 µg/ml chez un patient non traité.

• 50 µg/ml chez un patient âgé de plus de 60 ans ou en cas d'insuffisance cardiaque ou hépatique.

Une hémodialyse est aussi efficace qu'une hémoperfusion.
Si vous avez utilisé ou pris trop de Xanthium LP, prenez immédiatement contact avec votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre Xanthium LP
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Xanthium LP
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Ces effets sont souvent dus à la prise de trop fortes doses et peuvent consister en :

• Affections du système immunitaire : réactions d'hypersensibilité : urticaire, prurit avec thrombocytopénie et diathèse hémorragique ; plus rarement, dermatites de contact, érythrodermie exfoliative accompagnée de bronchospasme.

• Affections endocriniennes : troubles du métabolisme et de la nutrition : hypokaliémie, hyperglycémie, hypophosphatémie, hypomagnésémie, sécrétion d'hormones antidiurétiques, anomalies lipidiques, poignée.

• Affections du système nerveux : insomnie, nervosité, maux de tête, irritabilité, tremblements, convulsions.

• Affections cardiovasculaires : troubles du rythme, hypotension, tremblements, palpitations, rougeurs.

• Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : accélération de la respiration, arrêt de la respiration, alcalose respiratoire, vomissements, nausées, douleurs gastro-intestinales ; nausées, vomissements, ulcère peptique et diarrées, manque d'appétit, vomissements sanglants.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5. COMMENT CONSERVER XANTHIUM LP ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

LOT 20K02 1
EXP 11 2023
PPV 21.80 DH

Xanthium LP 200 mg
30 gélules à libération prolongée
AMM N° 308/17 DMP/21/NRQ



6 118001 070954

Si vous prenez un produit ou un médicament contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*), il est nécessaire d'interrompre sa prise AVANT de commencer un traitement par Xanthium LP.

Si vous êtes actuellement traité simultanément par un médicament ou un produit contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*) et Xanthium LP, il ne faut pas arrêter spontanément la prise du millepertuis sans avoir consulté un médecin car cette décision pourrait nécessiter une adaptation de la posologie de Xanthium LP.

Enfant et adolescents

Ne pas prendre Xanthium LP avant l'âge de 6 ans.

Autres médicaments et Xanthium LP
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

L'association avec les sympathomimétiques par inhalation permet de diminuer la posologie des deux substances et ainsi de diminuer le risque d'effets non désirés.

La théophylline peut augmenter les effets sur le cœur si elle est associée à des médicaments digitaux.

Certains médicaments peuvent diminuer la vitesse d'élimination de la théophylline.

Ces médicaments suivants nécessiteront une diminution des doses

de, tréandromycine, clarithromycine, lincomycine,

diméthidine, gels d'aluminium,

prénolol, alprénolol, labétalol,

azine, diltiazem, interféron alfa-2a, ticlopidine,

ne).

Prévenez l'élimination de la théophylline et nécessiteront des doses :

es (barbituriques, phénytoïne, carbamazépine ...).

Le médicament doit être signalé au médecin car il faudra

de du médicament : il sera également averti de la

les doses de théophylline devront alors être

(carbonate de lithium) verront leurs doses

théophylline.

line avec l'éphédrine et les freinateurs d'appétit

liée car les effets non désirés de ces substances

ptifs oraux, la tacrine, le vérapamil et le vaccin

ne augmentation du taux de théophylline.

une diminution du taux de théophylline.

entre le millepertuis (*Hypericum perforatum*) et

thium LP. Cette interaction est probablement due

ymes du foie. Il faut donc éviter de prendre un

ase de millepertuis (*Hypericum perforatum*) en

Les risques de surdosage sont généralement plus fréquents chez les patients âgés, ainsi que chez les personnes atteintes de troubles hépatiques, d'une défaillance cardiaque ou de fièvre prolongée.

Le médecin sera averti en cas d'apparition de l'un de ces troubles. Une hospitalisation pourra être jugée nécessaire en présence de signes manifestes d'intoxication.

On traitera une intoxication à la théophylline par vidange gastrique ou par utilisation de charbon actif : des sédatifs (par exemple du diazépam à raison de 5-10 mg en i.v. (enfants 0,1 à 0,2 mg/kg en injection intraveineuse) seront administrés en cas de convulsions ; oxygénation, maintien de la pression artérielle, traitement de la déshydratation (maintien de l'équilibre hydro-électrolytique), hémoperfusion avec résines.

Une hémoperfusion doit être pratiquée si les taux de théophylline sont supérieurs à :

• 40 à 60 µg/ml chez un patient déjà traité,

• 50 µg/ml chez un patient non traité,

cardiaque ou hépatique.

Une hémodialyse est aussi efficace qu'une hémoperfusion.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Xanthium LP, prenez immédiatement contact avec votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre Xanthium LP
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Xanthium LP
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ces effets sont souvent dus à la prise de trop fortes doses et peuvent consister en :

• Affections du système immunitaire : réactions d'hypersensibilité : urticaire, prurit avec thrombocytopénie et diathèse hémorragique ;

• Plus rarement, dermatites de contact, érythrodermie exfoliative accompagnée de bronchospasme ;

• Affections endocriniennes : troubles du métabolisme et de la nutrition : hypokaliémie, hyperglycémie, hypophosphatémie, hypomagnésémie, sécrétion d'hormones antidiabétiques, anomalies lipidiques, poignée ;

• Affections du système nerveux : insomnie, nervosité, maux de tête, irritabilité, tremblements, convulsions ;

• Affections cardiovasculaires : troubles du rythme, hypotension ;

• Affections cardiaques : palpitations, rougeurs ;

• Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : accélération de la respiration, arrêt de la respiration, alcalose respiratoire ;

• Affections gastro-intestinales : nausées, douleurs d'estomac, vomissements, diarrées, manque d'appétit, vomissements sanglants, ulcère peptique et œsophagien.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5. COMMENT CONSERVER XANTHIUM LP ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Antidote : caféine.

LOT 20K02 1
EXP 11 2023
PPV 21.80 DH

Xanthium LP 200 mg
30 gélules à libération prolongée
AMM N° 308/17 DMP/21/NRQ



6 118001 070954