

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| O Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| O Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| O Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-713560

Magh

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule : <b>10327</b>	Société : <b>RAI</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : <b>AZZABO Ouhamed</b>			
Date de naissance : <b>06/11/1974</b>			
Adresse : <b>3 rue Rafael Yacoub les Riad El Fouach Emr. C Atif 11 Casablanca</b>			
Tél. : <b>06 66 49 38 49</b>	Total des frais engagés :	<b>865,00</b>	

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
Date de consultation : <b>20/06/2022</b>			
Nom et prénom du malade : <b>AZZABO Ouhamed</b>			
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même	<input checked="" type="checkbox"/> Dr. S. Allal Ben Abdellah	<input type="checkbox"/> Conjoint
Nature de la maladie : <b>Prostate</b>			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous un sceau confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **Casablanca**

Signature de l'adhérent(e) :

**Dr. EL ALLAL BEN ABDELLAH**  
Signature : **20/06/2022**

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Membre du Conseil d'Administration attestant le Paiement des Honoraires
-----------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	--

20/05/22 Cn Dr. A. J. TACHFINE CASABLANCA


EXECUTION DES ORDONNANCES				
Cachet du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Dr.	Montant de la Facture	
PHARMACIE IBN TACHFINE CASABLANCA N° 278 Boulevard Ibn Tachfine Casablanca - Tel: 05 22 62 06 50 07 24 73 R.C. 367429 - T.P: 375495	03/06/2022	Dr. A. J. TACHFINE CASABLANCA	132,00 Dhs	
	30/5/2022	Dr. A. J. TACHFINE CASABLANCA	283,00 Dhs	
	02/06/22 Cn	Dr. A. J. TACHFINE CASABLANCA	250,00 Dhs	
ANALYSES - RADIographies				
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients		
LABORATOIRE DE LA VILLETTA 07 ADC Residence salam boulevard Ibn Tachfine casablanca Tel: 0522 600 406 / 0522 600 409	03/06/22 B. 227	Dr. A. J. TACHFINE CASABLANCA	250,00 Dhs	

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

Soins	Coefficient	
		COEFFICIENT DES TRAVAUX
		MONTANTS DES SOINS
		DEBUT D'EXECUTION
		FIN D'EXECUTION
		COEFFICIENT DES TRAVAUX
		MONTANTS DES SOINS
		DATE DU DEVIS
		DATE DE L'EXECUTION




O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
	00000000	00000000
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
B		

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Cabinet de Pédiatrie

## Dr EL ALAMI ☺

Docteur EL ALAMI Abdellatif

Spécialiste Pédiatre

Ex-Enseignant à la Faculté de Médecine  
de Casablanca

Fibroscopie Digestive Biopsie Jejunale

Sur Rendez-vous

الدكتور العلمي عبد اللطيف  
اختصاصي في أمراض الأطفال والرضيع  
أستاذ سابق بكلية الطب بالدار البيضاء  
التنظير الداخلي للجهاز الهضمي

بالموعد

Casablanca, le

03 06 22


الدار البيضاء، في:

N° 278 Boulevard Ibn Tachfine  
Casablanca - Tél: 05 22 62 05 50  
f: 207729473 - DC: 267429 - Tp: 37094395

SARL AU  
PHARMACIE BEN TACHFINE CASABLANCA

66,00 + 2

132,00



شارع 11 يناير (جانب سينما كوليزي) الدار البيضاء - الهاتف : 00 95 22 31 52 05  
87, Bd. 11 Janvier (à coté du cinéma colisée) - Casablanca - Tél : 05 22 31 95 00  
En cas d'Urgence, Contacter GSM : 06 13 83 40

# LEVAMOX®

## (Amoxicilline + acide clavulanique)

### DENOMINATION DU MÉDICAMENT

- LEVAMOX® 1/g/125 mg Comprimé effervescent adulte, boîte de 12, 16 et 24
- LEVAMOX® 500 mg/62,5 mg Comprimé effervescent enfant, boîte de 12 et 24
- LEVAMOX® 1 g/125 mg Poudre pour suspension buvable adulte en sachet-dose, boîte de 12 et 16
- LEVAMOX® 500 mg/62,5 mg Poudre pour suspension buvable enfant en sachet-dose, boîte de 12
- LEVAMOX® 100 mg/12,5 mg par ml Poudre pour suspension buvable nourrisson en flacon de 30 ml
- LEVAMOX® 100 mg/12,5 mg par ml Poudre pour suspension buvable enfant en flacon de 60 ml

(Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que LEVAMOX® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVAMOX® ?
3. Comment prendre LEVAMOX® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVAMOX® ?
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE LEVAMOX® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### - Classe pharmacothérapeutique ou le type d'activité

LEVAMOX® est un antibiotique qui lutte contre les responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactives). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

**- Indications thérapeutiques**

LEVAMOX® est utilisé chez l'adulte, chez l'enfant et chez le nourrisson pour traiter les infections suivantes :

- Infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- Infections des voies respiratoires,
- Infections des voies urinaires,
- Infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- Infections des os et des articulations.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LEVAMOX® ?

#### - Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

LEVAMOX® contient de l'aspartam, si votre médecins vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**- Ne prenez jamais LEVAMOX® (Contre-indications)**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans LEVAMOX®.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.
- Si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

**Ne prenez pas LEVAMOX® si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.**

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre LEVAMOX®.

#### - Fautes d'attention avec LEVAMOX® (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ou avant d'administrer LEVAMOX® à votre enfant.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable

de l'infection.

Selon les résultats, il pourra vous ou à votre enfant prescrire un dosage différent de LEVAMOX® ou un autre médicament.

#### - Réactions nécessitant une attention particulière

LEVAMOX® peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions graves d'intestin. Tenez-vous à jour pour surveiller certains symptômes : Troubles digestifs et diarrhée. Si vous effectuez ou votre enfant rouges ou exfoliations (petit glucose), vous devez informer l'enfant prend LEVAMOX®. E types de tests.

Tenez compte, au besoin, de :

#### - Enfants et adolescents

Demandez conseil au médi

ce médicament à votre enf

et souffre de mononucléo

• est traité(e) pour des pr

• n'urinez pas régulierem

• En cas de doute, dema

d'administrer LEVAMOX®

#### - Prises d'autres médic

Prise ou utilisation d'a

Si vous ou votre enf

parlez-en à votre méde

et ordonnance, et ai

Si vous prenez ou voir

Si vous prenez ou vot

médicament ou dérivé

Si des médicaments

(warfarine) sont pris avec LEVAMOX®,

peuvent être requises.

LEVAMOX® peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le cancer ou les malades rhumatismaux).

LEVAMOX® peut influer sur l'action du mycophénolate moftéfil (traitement pour prévenir le rejet de greffe d'organes).

#### - Aliments et boissons (Interactions)

Sans objet

#### - Interactions avec les produ

Sans objet

#### - Utilisation pendant la gross

Si vous êtes enceinte ou si s

avez envie d'en informer votre méde

Demandez conseil à votre m

quelconque médicament.

#### - Sportifs

Sans objet

#### - Effets sur l'aptitude à condu

Poudre pour suspension buv

1 g/12,5 mg

Conduite de véhicules et utili

LEVAMOX® peut provoquer des

à conduire.

#### - Excipients à effet noto

- Aspartam :

- 30 mg/ cor

- 15 mg/ sac

- 15 mg/ cont

- 7,5 mg/ sa

- 2,5 mg/ p

LEVAMOX® contient de l'Aspa

Coll- ce peut être nocive chez le

• phénylettonuria •.

- Potassium : - 27,91 mg/

- 13,95 mg/

- 2,8 mg/ml p

Les comprimés effervescents, le

buvable contiennent du potassium

régime pauvre en potassium.

- Sodium : - 294 mg/ cor

- 147 mg/ cont

- 0,32 mg/ml po

Les comprimés effervescents et la

sodium, en tenir compte chez les pers.

### 3. COMMENT PRENDRE LEVAMOX® ?

#### - Instruction pour un bon usage

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute,

consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**- Posologie, mode d'emploi et durée du traitement**

#### **POSOLOGIE**

Adultes et enfants de 40 kg et plus

• Dose habituelle : 1 comprimé effervescent

et 1/2 cuillère à soupe d'eau et les sach

prendre tous les jours, sous

surveillance d'un m

kg/5 mg à 80 mg/1

vescents et les sach

ain de 40 kg.

ipension buvable, les

généralement pas adapt

de problèmes réna

èmes rénaux, une adap

prescrire un dosage diff

problème au foie, des anal

de vérifier le fonctionne

ndre LEVAMOX® ?

la prise de LEVAMOX®, ouv

re d'eau

meiléngé au début d'un repas

az les deux heures, sans attendre

d'au moins 4 heures. Ne pren

juicez pas et n'utilisez pas de ma

chez LEVAMOX® pendant plu

persistent, consultez de nouvau

comprimés effervescent

Le comprimé effervescent

est à dissoudre

avant chaque utili

à votre enfant au

manière régulière

N'administrez pas LEVAMOX® à votre enfant si le

est persistant, com

enfants et les adole

nts et les sache

140 mg/

est pas destiné

LEVAMOX® (le surdosage

cassive de LEVAM

ou diarrhée) ou q

la bolle de m

ndre LEVAMO

loose, prenez-la

prendre la dose

à votre enfant

0 mg/62,5 mg

une dose à

nviron 4 heures.

LEVAMOX® peut r

rendre LEVAM

utes les doses

valeNT survi

stions sur l'utili

enfant ou votre p

FETS INDÉSIRAB

lables, LEVAMOX®

pas systématiqu

els indésirables me

stant une atten

• éruption cutanée,

• inflammation des vaisseaux sanguins (va

de taches rouges ou violettes sur la peau

LEVAMOX® 100mg/12,5mg/1ml  
Poudre pour suspension buvable - 60ml

6 118000 032908

PPV 66DH00

LOT 10033 6

EXP 01/2024

100 mg/12,5 mg/1ml

60 ml

Enfants

# LEVAMOX®

## (Amoxicilline + acide clavulanique)

### DENOMINATION DU MÉDICAMENT

- LEVAMOX® 1/g/125 mg Comprimé effervescent adulte, boîte de 12, 16 et 24
- LEVAMOX® 500 mg/62,5 mg Comprimé effervescent enfant, boîte de 12 et 24
- LEVAMOX® 1 g/125 mg Poudre pour suspension buvable adulte en sachet-dose, boîte de 12 et 16
- LEVAMOX® 500 mg/62,5 mg Poudre pour suspension buvable enfant en sachet-dose, boîte de 12
- LEVAMOX® 100 mg/12,5 mg par ml Poudre pour suspension buvable nourrisson en flacon de 30 ml
- LEVAMOX® 100 mg/12,5 mg par ml Poudre pour suspension buvable enfant en flacon de 60 ml

(Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que LEVAMOX® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVAMOX® ?
3. Comment prendre LEVAMOX® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVAMOX® ?
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE LEVAMOX® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### - Classe pharmacothérapeutique ou le type d'activité

LEVAMOX® est un antibiotique qui lutte contre les responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactives). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

- Indications thérapeutiques

LEVAMOX® est utilisé chez l'adulte, chez l'enfant et chez le nourrisson pour traiter les infections suivantes :

- Infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- Infections des voies respiratoires,
- Infections des voies urinaires,
- Infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- Infections des os et des articulations.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LEVAMOX® ?

#### - Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

LEVAMOX® contient de l'aspartam, si votre médecins vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

- Ne prenez jamais LEVAMOX® (Contre-indications)
- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans LEVAMOX®.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.
- Si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

Ne prenez pas LEVAMOX® si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre LEVAMOX®.

- Fautes attention avec LEVAMOX® (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ou avant d'administrer LEVAMOX® à votre enfant.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable

de l'infection.

Selon les résultats, il pourra vous ou à votre enfant prescrire un dosage différent de LEVAMOX® ou un autre médicament.

#### - Réactions nécessitant une attention particulière

LEVAMOX® peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions graves d'intestin. Tenez-vous à jour pour surveiller certains symptômes : Troubles digestifs et diarrhée. Si vous effectuez ou votre enfant rouges ou exfoliations (petit glucose), vous devez informer l'enfant prend LEVAMOX®. E types de tests.

Tenez compte, au besoin, de :

#### - Enfants et adolescents

Demandez conseil au médecin à ce médicament à votre enfant souffre de mononucléose.

• est traité(e) pour des problèmes d'urine pas régulièrement.

• En cas de doute, demandez d'administrer LEVAMOX®.

#### - Prises d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autre médicament à votre enfant parlez-en à votre médecin ordonnance, et ai

Si vous prenez ou voir LEVAMOX® lorsque

Si vous prenez ou voir médicament ou dérivé.

Si des médicaments (par exemple warfarine) sont pris avec LEVAMOX®, peuvent être requises.

LEVAMOX® peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le cancer ou les malades rhumatismaux).

LEVAMOX® peut influer sur l'action du mycophénolate moftéfil (traitement pour prévenir le rejet de greffe d'organes).

#### - Aliments et boissons (Interactions)

Sans objet

#### - Interactions avec les produits

Sans objet

#### - Utilisation pendant la grossesse

Si vous êtes enceinte ou si l'es

avez envie d'en informer votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin quelconque médicamenteux.

#### - Sportifs

Sans objet

#### - Effets sur l'aptitude à conduire

Poudre pour suspension buv

1 g/12,5 mg

Conduite de véhicules et utili

LEVAMOX® peut provoquer des

#### - Excipients à effet notable

- Aspartam :

- 30 mg/ cor

- 15 mg/ sac

- 15 mg/ cont

- 7,5 mg/ sa

- 2,5 mg/ p

LEVAMOX® contient de l'Aspa

Coll- ce peut être nocive chez le

• phénylettonuria.

- Potassium :

- 27,91 mg/

- 13,95 mg/

- 2,8 mg/ml p

Les comprimés effervescents, le

buvable contiennent du potassium

régime pauvre en potassium.

- Sodium :

- 294 mg/ cont

- 147 mg/ cont

- 0,32 mg/ml po

Les comprimés effervescents et la

sodium, en tenir compte chez les pers.

LEVAMOX® 100mg/12,5mg/1ml  
Poudre pour suspension buvable - 60ml



PPV 66DH00 LOT 10033 6  
EXP 01/2024

**LEVAMOX®**  
100 mg/12,5 mg/1ml  
60 ml  
**Enfants**

consultez votre médecin ou votre pharmacien

- Posologie, mode d'emploi et durée du traitement
- POSSOLOGIE
- Adultes et enfants de 40 kg et plus
- Dose habituelle : 1 comprimé effervescent et les sachets recommandés pour votre médecin
- 40 kg
- 60 ml
- 100 mg/5 mg/ 60 ml
- 120 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 150 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 180 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 210 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 240 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 270 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 300 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 330 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 360 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 390 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 420 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 450 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 480 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 510 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 540 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 570 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 600 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 630 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 660 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 690 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 720 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 750 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 780 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 810 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 840 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 870 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 900 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 930 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 960 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 990 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1020 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1050 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1080 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1110 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1140 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1170 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1200 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1230 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1260 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1290 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1320 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1350 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1380 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1410 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1440 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1470 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1500 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1530 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1560 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1590 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1620 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1650 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1680 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1710 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1740 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1770 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1800 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1830 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1860 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1890 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1920 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1950 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 1980 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2010 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2040 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2070 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2100 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2130 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2160 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2190 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2220 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2250 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2280 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2310 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2340 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2370 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2400 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2430 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2460 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2490 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2520 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2550 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2580 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2610 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2640 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2670 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2700 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2730 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2760 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2790 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2820 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2850 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2880 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2910 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2940 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 2970 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3000 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3030 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3060 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3090 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3120 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3150 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3180 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3210 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3240 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3270 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3300 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3330 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3360 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3390 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3420 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3450 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3480 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3510 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3540 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3570 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3600 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3630 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3660 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3690 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3720 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3750 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3780 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3810 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3840 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3870 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3900 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3930 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3960 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 3990 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4020 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4050 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4080 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4110 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4140 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4170 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4200 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4230 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4260 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4290 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4320 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4350 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4380 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4410 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4440 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4470 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4500 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4530 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4560 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4590 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4620 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4650 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4680 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4710 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4740 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4770 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4800 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4830 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4860 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4890 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4920 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4950 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 4980 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5010 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5040 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5070 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5100 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5130 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5160 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5190 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5220 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5250 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5280 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5310 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5340 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5370 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5400 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5430 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5460 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5490 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5520 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5550 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5580 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5610 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5640 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5670 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5700 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5730 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5760 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5790 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5820 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5850 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5880 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5910 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5940 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 5970 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6000 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6030 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6060 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6090 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6120 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6150 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6180 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6210 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6240 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6270 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6300 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6330 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6360 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6390 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6420 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6450 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6480 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6510 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6540 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6570 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6600 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6630 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6660 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6690 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6720 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6750 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6780 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6810 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6840 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6870 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6900 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6930 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6960 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 6990 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7020 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7050 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7080 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7110 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7140 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7170 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7200 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7230 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7260 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7290 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7320 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7350 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7380 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7410 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7440 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7470 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7500 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7530 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7560 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7590 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7620 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7650 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7680 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7710 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7740 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7770 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7800 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7830 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7860 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7890 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7920 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7950 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 7980 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8010 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8040 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8070 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8100 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8130 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8160 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8190 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8220 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8250 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8280 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8310 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8340 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8370 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8400 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8430 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8460 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8490 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8520 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8550 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8580 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8610 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8640 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8670 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8700 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8730 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8760 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8790 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8820 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8850 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8880 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8910 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8940 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 8970 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9000 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9030 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9060 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9090 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9120 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9150 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9180 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9210 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9240 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9270 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9300 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9330 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9360 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9390 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9420 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9450 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9480 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9510 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9540 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9570 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9600 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9630 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9660 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9690 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9720 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9750 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9780 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9810 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9840 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9870 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9900 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9930 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 9960 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 10000 mg/12,5 mg/ 60 ml
- 10

# Cabinet de Pédiatrie

## Dr EL ALAMI ☺

Docteur EL ALAMI Abdellatif

Spécialiste Pédiatre

Ex-Enseignant à la Faculté de Médecine  
de Casablanca  
Fibroscopie Digestive Biopsie Jejunale

Sur Rendez-vous

الدكتور العلمي عبد اللطيف  
اختصاصي في أمراض الأطفال والرضيع  
أستاذ سابق بكلية الطب بالدار البيضاء  
التنظير الداخلي للجهاز الهضمي

بالموعد

Casablanca, le

30 oct 22

الدار البيضاء، في

PHARMACIE IBN TACHFINE CASABLANCA

SARL AU

N°.278 Boulevard Ibn Tachfine  
Casablanca - Tél.: 05 22 31 06 50  
- 05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

05 22 31 95 00

Téléphone  
Tia wle Rd x ray  
- Ante ob  
Tia ll wle x ray  
- levaux

Dr. EL ALAMI Abdellatif  
Spécialiste Pédiatre  
87 Tr. 11 Janvier  
(à coté du cinéma collège) - Casa  
Tel: 05 22 31 95 00 - Gsm: 01 13 83 30  
INPE : 091045425



## **CONSEILS D'UTILISATION :**

- Fitorax®** Solution buvable Adultes : 1 cuillère à soupe 3 à 4 fois par jour.
- Fitorax®** Solution buvable Enfants : - Moins de 4 ans : 1 cuillère à café 3 fois par jour.  
- De 4 à 12 ans : 1 cuillère à soupe 3 fois par jour.


## **PRECAUTIONS D'UTILISATION :**

- Déconseillé aux personnes allergiques aux produ
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Après ouverture, à conserver au frais et à consor
- Le produit peut présenter des sédiments dûs à l  
sa qualité et son efficacité ne sont pas altérées.
- **Fitorax®** Solution buvable Adultes est décons

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicame

Fabriqué par Pharmalife Research - Italie.

Importé et distribué au Maroc par MEDIPRO Phar



Autorisations du Ministère de la Santé n° :

**Fitorax®** Solution buvable Adultes : DA20211405040/MAv2/DMP/CA/18

**Fitorax®** Solution buvable Enfants : 20211405616 MAv2/CA/DMP/18

# **LABORATOIRE LAVILLETTÉ**

## **D'ANALYSES MEDICALES ET BIOLOGIQUES**

423, Bd Ibn Tachfine 1<sup>er</sup> étage La villette Casablanca

Tel: 0522 60 04 06 / 04 09 – Fax: 05 22 60 04 09 – email : [lavillettelab@gmail.com](mailto:lavillettelab@gmail.com)

CNSS : 4445591 IF : 15167174 PATENTE : 31490706

ICE : 000526665000051

**Dr Dallal JEDDI**

*Directeur Biologiste Médical*

*Diplômé de l'Université de Médecine et Pharmacie de Rabat*

Code INPE : 093062339  
**INPE : 093062339**

Casablanca, le : 03/06/2022

**FACTURE N° : 220004201**

**Nom et Prénom : Enf Kenza AZZAB**

### **Récapitulatif des analyses**

<i>CN</i>	<i>Analyse</i>	<i>Val</i>	<i>Clefs</i>
PC	Prélèvement sang adulte	B17	B
	CRP	B100	B
	Glycémie à jeun	B30	B
	Numeration Formule Sanguine NFS	B80	B

**Total des B : 227**

Montant total de la facture : 250.00Dhs

**Arrêtée la présente facture à la somme de : deux cent cinquante dirhams s.**

**NB : Tout changement de la date de la facture est non permis (veuillez respectez les délais de dépôt de vos dossiers médicaux auprès des organismes d'assurance).**



**LABORATOIRE**  
**La Villette**

D'Analyses Médicales et Biologiques

Dr. Dallal JEDDI

Biochimie clinique  
Bactériologie médicale  
Hématologie clinique  
Immunologie

Hormonologie - Oncologie  
Parasitologie - Mycologie  
Virologie médicale  
Spermiologie

CODE INPE

\* 0 9 3 0 6 2 3 3 9 \*

Date du prélèvement : 03/06/2022 à 08:05  
Code patient : 220119-0061  
Né(e) le : 14/10/2017 (4 ans)



**Enf Kenza AZZAB**  
Dossier N° : 220603-0003  
Prescripteur : \*

## HEMATOLOGIE

### HEMOGRAMME (Automate : HORIBA Medical ABX PENTRA)

"Les valeurs de référence sont en fonction de l'âge, du sexe, état physiologique du patient(e) et l'âge de grossesse"

Hématies :	4,56 M/mm <sup>3</sup>	(3,85-5,15)
Hémoglobine :	11,7 g/dL	(10,7-13,9)
Hématocrite :	35,4 %	(32,5-41,5)
VGM :	78 fL	(74-89)
TCMH :	26 pg	(25-31)
CCMH :	33,1 g/dL	(28,0-36,0)
 <b>Leucocytes :</b>	 11 670 /mm <sup>3</sup>	 (5 400-13 800)
Polynucléaires Neutrophiles :	64 %	
Soit:	7 469 /mm <sup>3</sup>	(1 700-8 500)
Lymphocytes :	26 %	
Soit:	3 034 /mm <sup>3</sup>	(2 000-8 000)
Monocytes :	8 %	
Soit:	934 /mm <sup>3</sup>	(<1 000)
Polynucléaires Eosinophiles :	2 %	
Soit:	233 /mm <sup>3</sup>	(0-600)
Polynucléaires Basophiles :	0 %	
Soit:	0 /mm <sup>3</sup>	(0-150)
 <b>Plaquettes :</b>	 481 000 /mm <sup>3</sup>	 (200 000-500 000)
 <b>Commentaire :</b>	Hémogramme normal.	



**LABORATOIRE**  
**La Villette**

D'Analyses Médicales et Biologiques

Dr. Dallal JEDDI

Biochimie clinique  
Bactériologie médicale  
Hématologie clinique  
Immunologie

Hormonologie - Oncologie  
Parasitologie - Mycologie  
Virologie médicale  
Spermiologie

CODE INPE

  
\* 0 9 3 0 6 2 3 3 9 \*

220603-0003 – Enf Kenza AZZAB

## BIOCHIMIE SANGUINE

### Protéine C-réactive (CRP)

(Immunoturbidimétrie Haute Sensibilité - Roche Diagnostic Cobas)

**39,9** mg/L

(<5,0)

### Glycémie à jeun

(Hexokinase G6PD-H - Roche Diagnostics Cobas)

**0,91** g/L

(0,70–1,10)

**5,05** mmol/L

(3,89–6,11)

#### Consensus :

- Taux normal : de 0,60 à 1,10 g/L
- Diminution de la tolérance au glucose : de 1,10 à 1,26 g/L
- Sujet diabétique : > à 1,26 (sur deux prélèvements distincts)

Validé par :Dr Dallal JEDDI

