

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-676157


219868

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)		Société :	
Matricule : 7085		Autre :	
<input checked="" type="checkbox"/> Actif		<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	
Nom & Prénom : Lotfi Fouzia		Date de naissance : 02/05/1964	
Adresse : 211 ALSAT TAKA - MARAKKECH		Tél. : 0661243301	
Total des frais engagés : Dhs			

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cachet du médecin :	<b>Dr. Nabil BOURAS</b> Professeur en Oncologie Chimiothérapie - Radiothérapie Tél : 05 24 42 13 13 Mapp : 09 14 69 10		
Date de consultation :	31/03/2022	Age :	57 ans
Nom et prénom du malade :	Lotfi Fouzia.		
Lien de parenté :	<input checked="" type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	Cancer du sein		
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :	Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.		

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : MRC Le : 03/10/2022  
Signature de l'adhérent(e) : 

Dé	Re	Il se	récl
Co	re	re	er

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/02/29	Controle	Chirurgien	Dr. Najib BOURAIDI Professeur en Oncologie Chimiothérapie Radiothérapie Tél : 05 24 42 11 13	INP

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. SEMAÏDJI Pharmacie Marrakech Lot Massalout 10 Tél : 05 25 08 56 59	03/02/29	1067,70

### ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

Le j... Im... Ve... S...		Le j... Im... Ve... S...	
<p>Date de fabrication : A consommer de préférence avant fin : N° de lot :</p> <p>04/2021 04/2024 0521116</p> <p>PPC = 95,00 DHS</p> <p>D A B C D E F G H</p> <p>O.D.F PROTHESES DENTAIRES</p> <p>25533412 00000000 00000000 00 35533411 1143</p> <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>		<p>V002 - 01/21 ETEXMAC030CP</p> <p>3 760162 579741</p> <p>MONTANTS DES SOINS</p> <p>DEBUT D'EXECUTION</p> <p>V002 - 01/21 ETEXMAC030CP</p> <p>3 760162 579741</p> <p>MONTANTS DES SOINS</p> <p>DATE DU DEVIS</p> <p>DATE DE L'EXECUTION</p> <p>VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS</p> <p>VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION</p>	

Pr. Najib BOURAS

Spécialiste en Oncologie - Radiothérapie

Lauréat des Facultés de Médecine de Casablanca et Bordeaux

Ex-enseignant aux Facultés de Médecine

de Casablanca et Marrakech

Ex-vice doyen à la Faculté de Médecine de Marrakech

INPE : 091146019

مراكش، في : 03/03/2022.

الدكتور نجيب بوراس

اختصاصي في الأنسنجلوجيا والعلاج بالأشعة

خريج كلية الطب الدار البيضاء وبوردو

أستاذ بكلية الطب الدار البيضاء ومراكش سابقا

نائب عميد كلية الطب بمراكش سابقا



Mme Lotfia Fouzia.

58,60 x 2

1) Solupred 20 mg CP eff.



3 cp le matin après repas x 3 jours.

2) Chemoset cp 8 mg

PHARMACE OUHOUD

DR SEMMAR Jihane  
 294, Lot Massimo Targa - Marrakech  
 Tél: 05 25 02 30 33

123,60 x 2 1 cp matin et 1 cp avant repas x 6 j.

3) INEXIUM 40 mg CP N°.

45,00 x 2 1 cp à jeun x 2 mois.

4) Extramag 140 mg CP N°.

MMAR Jihane Targa - Marrakech x 1 mois

5) Taroliferon 39 CP 59,59 1 cp matin après repas x 1 mois.

Dr. Najib BOURAS.

[www.cliniquemenara.ma](http://www.cliniquemenara.ma) | Patente : 45326432 - I.F. 40434684 - ICE. 00154843/000074 - CINSS. 9421413

الرّيـكـ جـلـزـ جـلـزـ (قـرـبـ مـنـدـوـبـيـةـ الصـحـةـ)ـ مـرـاكـشـ

19, Albek Quartier de l'hôpital (à côté de la délégation du Ministère de la Santé) - Route Marrakech

Tel : 05 24 44 71 74 - GSM : 06 61 46 36 88 - Fax : 05 24 44 70 21 - المـهـوـلـ - الـهـاـفـ - الـفاـكـ

**SYNTHEMEDIC**  
22 rue zoubair bnou al aquam roches  
noires casablanca

**INEXIUM**

20 mg

Cpr GR

Boite 14

64015DMP/21NRQ P.P.V: 82,10 DH

6 118001 020591

**SYNTHEMEDIC**  
22 rue zoubair bnou al aquam roches  
noires casablanca

**INEXIUM**

20 mg Cpr GR

Boite 14

64015DMP/21NRQ P.P.V: 82,10 DH

6 118001 020591

**SYNTHEMEDIC**  
22 rue zoubair bnou al aquam roches  
noires casablanca

**INEXIUM**

20 mg

Cpr GR

Boite 14

64015DMP/21NRQ P.P.V: 82,10 DH

6 118001 020591

**SYNTHEMEDIC**  
22 rue zoubair bnou al aquam roches  
noires casablanca

**INEXIUM**

20 mg Cpr GR

Boite 14

64015DMP/21NRQ P.P.V: 82,10 DH

6 118001 020591

**SYNTHEMEDIC**  
22 rue zoubair bnou al aquam roches  
noires casablanca

**INEXIUM**

40 mg

Cpr GR

Boite 14

64115DMP/21NRQ P.P.V: 123,60 DH

6 118001 020607

**SYNTHEMEDIC**  
22 rue zoubair bnou al aquam roches  
noires casablanca

**INEXIUM**

40 mg Cpr GR

Boite 14

64115DMP/21NRQ P.P.V: 123,60 DH

6 118001 020607

**SYNTHEMEDIC**  
22 rue zoubair bnou al aquam roches  
noires casablanca

**INEXIUM**

20 mg Cpr GR

Boite 14

64015DMP/21NRQ P.P.V: 82,10 DH

6 118001 020591

PHARMACIE OUHOUD  
Dr. SEMMAR Jihane  
294, Lot Massmoudi Tarqa - Marrakech  
Tél: 05 25 08 55 59

# Tardyferon B9

Comprimé pelliculé  
(Fer et acide folique)

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TARDYFERON B9, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : PRÉPARATIONS ANTIANÉMIQUES -

Code ATC : B03AD03

Apport de fer et d'acide folique.

Traitement préventif des carences en fer et en acide folique en cas de grossesse lorsqu'un apport alimentaire suffisant ne peut être assuré.

Ne doit pas être utilisé dans la prévention primaire des risques d'anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural (AFTN : spina bifida...).

Tardyferon B9, comprimé pelliculé est indiqué seulement chez la femme enceinte.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

**Ne prenez jamais TARDYFERON B9, comprimé pelliculé :**

- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez plus de fer dans votre organisme qu'il ne vous faut.
- Si vous avez une anémie (quantité insuffisante de globules rouges dans le sang) non liée à une carence en fer, ou causant une surcharge en fer (par exemple la thalassémie, l'anémie réfractaire, l'anémie par insuffisance médullaire).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé. En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être suçés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

Informez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser TARDYFERON B9 :

- Si vous avez des difficultés à avaler.

• Si vous vous étrouvez accidentellement -



6 118001 100620

**TARDYFERON B9**  
30 comprimés pelliculés  
Fer 50 mg / Acide folique 0,350 mg

Distribué par **Cooper Pharma**  
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Amina DAOUDI - Pharmacien Responsable  
PPV : 51.60 DH

comprimé, veuillez  
jul y a un risque  
mé entre dans les  
nt, des crachats  
ent s'est produit  
manifestent. Par  
us assurer que le  
rès des données  
ions de la paroi  
gés recevant un

322084  
une insuffisance rénale chronique  
(mauvais fonctionnement de votre rein, diminution importante du volume des urines), de diabète (taux élevé de sucre dans le sang) et/ou d'hypertension (augmentation de la pression artérielle). Cette coloration peut gêner une intervention chirurgicale au niveau gastro-intestinal.

Si vous prenez TARDYFERON B9, comprimé pelliculé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter. Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ne sera pas efficace. En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### Autres médicaments et TARDYFERON B9, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps que le traitement par TARDYFERON B9, comprimé pelliculé, alors que d'autres nécessitent des changements spécifiques de dose ou de moment de prise par exemple.

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer, vous devez éviter de prendre TARDYFERON B9 comprimé pelliculé.
- Si vous prenez les médicaments suivants, vous devez séparer leurs administrations avec TARDYFERON B9 comprimé pelliculé d'au moins 2 heures:
  - un médicament pour traiter les calculs urinaires infectieux (l'acide acétohydroxamique).
  - certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
  - des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates).
  - un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
  - un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
  - des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la lédopoda).
  - des produits contenant du zinc, du strontium et du calcium.
  - un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antiacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).

En raison de la présence d'acide folique dans TARDYFERON B9, comprimé pelliculé, d'autres associations de médicaments nécessite une précaution d'utilisation :

Anticonvulsivant comme le phénobarbital, phénytoïne, fosphénytoïne, primidone.

### TARDYFERON B9, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons Sans objet.

### Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant le deuxième et troisième trimestre de la grossesse que si nécessaire sur les conseils de votre médecin.

L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée chez la femme qui allaité.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que l'utilisation de TARDYFERON B9, comprimé pelliculé puisse avoir une influence sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

### TARDYFERON B9, comprimé pelliculé contient Sans objet.