

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0012174

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 875 Société : Royal Air Maroc
 Actif Pensionné(e) Autre : 120306
 Nom & Prénom : KARBAJ Abdelline
 Date de naissance : 01 - 01 - 1942
 Adresse : 11, rue des Bouzguen's 3Aejis Casablanca
 Tél. : 0661 310214 Total des frais engagés : 565,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : 
 Date de consultation : 20/05/2022
 Nom et prénom du malade : Bennani Naima Epkabbaj Age : 72 ans
 Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant
 Nature de la maladie : Affection pelviaine
 Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : casablanca

Le : 20/05/22

Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
2015/02	CHIR	2 (1)	250,00 Dhs	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE AL MUDABI 9.Aut. 116 Bouvreuil's Oasis Gaspé Québec Tel: 01 2299 6A 10	Le 20/05/22	315,90 Dh

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 35533411	G 21433552 00000000 11433553	B	Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Date du devis
				Date de l'exécution

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur KABBAJ Ghita Ep. SEBTI
Gynécologue Obstétricienne

Diplômée de la Faculté de médecine
de Casablanca
Ancien médecin interne
au CHU Ibn Rochd



الدكتورة قباج غيثة زوجة السبتي
طبيبة اختصاصية في أمراض النساء والتوليد

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء
طبيبة داخلية سابقا
بالمؤتمر الاستشفائي الجامعي ابن رشد

Casablanca le 20/05/22 الدار البيضاء في

Nom et Prénom :

Jme Blumeni Nauma Epkabbaj

89⁰⁰ × 2
Vibra 200
S.V

→ 1 cplj 25ج.
16 ج.

117³⁰ Celebrex 800 mg 1cplj 18ج

103⁰⁰ Doliprane 500 1cp x 3 1ج 28ج

315⁹⁰

PHARMACIE ABOUDABI
9, Rue des Bouveuils Oasis
Casablanca
Tél: 0522 99 64 10

Doliprane® 500 mg

PARACETAMOL

comprimé

COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

- Paracétamol.....
 - Excipients : qsp 1 comprimé
- Boîte de 20 comprimés.

PROPRIÉTÉS :

Ce médicament est un **antalgique**. Il calme
Il est **antipyrrétique**. Il fait baisser la température.

INDICATIONS :

Ce médicament contient du paracétamol.
Il est indiqué dans les maladies avec
tête, états grippaux, douleurs dentaires,
chez l'adulte et l'enfant à partir de



CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser en cas :

- d'allergie connue au paracétamol
- maladie grave du foie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Il existe des dosages plus adaptés pour l'enfant de moins de 27 kg : (moins de 8 ans environ).
 - Compte-tenu des posologies recommandées, il est inutile d'alterner la prise d'aspirine et de paracétamol.
- Avant de prendre du paracétamol, il est nécessaire de consulter votre médecin en cas de maladie grave des reins ou du foie.
- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent. Ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES ET AUTRES

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol, d'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.



Doliprane® 500 mg

PARACETAMOL

comprimé

COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

- Paracétamol.....
 - Excipients : qsp 1 comprimé
- Boîte de 20 comprimés.

PROPRIÉTÉS :

Ce médicament est un **antalgique**. Il calme
Il est **antipyrrétique**. Il fait baisser la température.

INDICATIONS :

Ce médicament contient du paracétamol.
Il est indiqué dans les maladies avec
tête, états grippaux, douleurs dentaires,
chez l'adulte et l'enfant à partir de



CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser en cas :

- d'allergie connue au paracétamol
- maladie grave du foie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Il existe des dosages plus adaptés pour l'enfant de moins de 27 kg : (moins de 8 ans environ).
 - Compte-tenu des posologies recommandées, il est inutile d'alterner la prise d'aspirine et de paracétamol.
- Avant de prendre du paracétamol, il est nécessaire de consulter votre médecin en cas de maladie grave des reins ou du foie.
- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent. Ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES ET AUTRES

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol, d'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.



CELEBREX® gé Celecoxib 100 ou 200

CELEBREX®
100 mg
20 GÉLULES

LISEZ ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DE CETTE NOTICE AVANT DE PRENDRE
Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres
d'informations à votre médecine ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été
quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être noté
de la retraite.

CELEBREX 100 mg, gélule

La substance active est le celecoxib (100 mg).

Les autres composants sont : lactose monohydrate, laurylsulfate de sodium, povidone K30, croscarmellose

magnésium

Enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane (E171), encrage contenant de l'oxyde

CELEBREX 200 mg, gélule

La substance active est le celecoxib (200 mg).

Les autres composants sont : lactose monohydrate, laurylsulfate de sodium, povidone K30, croscarmellose

magnésium.

Enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane (E171), encrage contenant de l'oxyde

DANS QUEL CAS UTILISER CELEBREX ?

Ce médicament se présente sous forme de gélule. Boîte de 10 gélules ou 20 gélules.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Par son mécanisme d'action, il fait partie sélectionné de cyclo-oxygénase-2 (COX-2). Il est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans), pour soulager les signes et les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde. Il est également indiqué dans le traitement des l'arthrose et les signes et symptômes de la spondylarthrite ankylosante.

NE PAS PRENDRE CELEBREX DANS LES CAS SUIVANTS :

antécédent d'allergie à l'un des constituants de ce médicament ou aux sulfamides, ulcère gastro-duodénal en cours, maladie inflammatoire de l'intestin, maladie grave du foie, maladie grave du cœur, maladie grave de l'estomac, maladie grave de l'intestin, maladie grave du cœur, maladie grave du foie, maladie grave d'asthme ou d'allergie (rhinite, polypes dans le nez, brusque gonflement du visage et du cou, urticaire ou autres réactions d'hypersensibilité à la prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, y compris les inhibiteurs de la COX-2), susceptible d'être enceinte, en l'absence d'intolérance au lactose (galactosemia), de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares), en raison de la présence d'un facteur de risque cardio-vasculaire (antécédent d'accident vasculaire cérébral ou d'ischémique transitoire).

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC CELEBREX :

Ce médicament est réservé à l'adulte (plus de 15 ans).

Le Celebrex doit être utilisé avec prudence par les patients présentant des facteurs de risque cardio-vasculaire, tel qu'un taux de cholestérol élevé, un diabète ou un tabagisme.

AVANT LE TRAITEMENT, PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN : en cas d'antécédents digestifs (oesophagite, gastrite, ou de l'inflammation aigüe ou hémostase digestive), en cas de maladie du cœur, du foie ou du rein, d'hypertension artérielle, de traitement par diurétique, en cas de traitement anti-agrégant plaquettaire ou anticoagulant concomitant (ex : aspirine), warfarine, anticoagulants oraux, en cas d'intolérance au lactose (galactosemia), de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares), en raison de la présence d'un facteur de risque cardio-vasculaire (antécédent d'accident vasculaire cérébral ou d'ischémique transitoire).

Ce médicament peut être donné à vous suivre régulièrement et/ou à adapter, si nécessaire, la posologie de votre

médicament. Il en est de même en fonction de votre âge.

NE COURS DU TRAITEMENT, ARRÊTER CELEBREX ET CONTACTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL.

D'URGENCE en cas d'hémorragie gastro-intestinale (réfet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration noire des selles), de symptômes pouvant évoquer une réaction allergique sévère telle que crise d'asthme, gêne respiratoire, brusque réaction du visage et du cou ou toute réaction cutanée, de maladie cardiaque dont les symptômes semblent s'aggraver (essoufflement, douleurs thoraciques ou augmentation des œdèmes). Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le célocoxib. Vous devez éviter de prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens (y compris les médicaments contenant du célocoxib) et/ou de l'aspirine (sauf à dose anti-agrégante plaquettaire). Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est CONTRAINDICUÉE pendant la grossesse et pour les femmes susceptibles d'être enceintes (absence de contraception efficace). Les effets de ce médicament, notamment à partir du 3ème trimestre de la grossesse, peuvent avoir des conséquences graves sur votre enfant, sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela, même avec une seule prise. Si vous découvrez



Vibramycine® 100 mg

Vibra® 200 mg

Comprimé sécable
Doxycycline monohydrate

NOTICE

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament.

Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent

présenter les mêmes symptômes que vous.

Le médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez l'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que Vibramycine/Vibra et quand est-

Vibramycine/Vibra est un antibiotique du groupe des tetracyclines qui agit contre des agents pathogènes, des bactéries qui provoquent des infections.

Vibramycine/Vibra est utilisé pour le traitement de :

- les infections des voies respiratoires
- les infections du nez, de la gorge et des oreilles ou oto-rhino-laryngologiques)
- les infections des voies urinaires
- les infections des organes génitaux
- les infections de la peau et des tissus mous
- les infections gastro-intestinales
- les infections obstétricales et gynécologiques
- les infections de la bouche (infections buccales)
- les infections des yeux (infections oculaires)
- certaines infections transmises par les tiques

Vibramycine/Vibra est indiqué pour la prévention des infections suivantes :

- diarrhée des voyageurs
- paludisme dans certaines régions du globe.

Vibramycine/Vibra ne peut être pris que sur prescription médicale.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

N'oubliez pas que ce médicament vous a été prescrit par votre médecin en traitement de la maladie dont vous souffrez actuellement. Il ne doit pas être utilisé pour soigner d'autres personnes ou d'autres personnes.

L'antibiotique que contient Vibramycine/Vibra n'est pas efficace contre tous les micro-organismes à l'origine de maladies infectieuses. La prise d'un antibiotique mal choisi ou mal dosé peut entraîner des complications. Ne l'utilisez par conséquent pas de votre propre initiative pour traiter d'autres maladies ou d'autres personnes. En cas de nouvelle infection ultérieure, vous ne devez pas non plus utiliser Vibramycine/Vibra sans une nouvelle prescription médicale.

Quand Vibramycine/Vibra ne doit-il pas être utilisé ?

Vous ne devez pas prendre Vibramycine/Vibra si vous êtes allergique au principe actif de Vibramycine/Vibra, la doxycycline, à un autre composant du médicament ou à d'autres antibiotiques de la famille des tétracyclines. Prévenez votre médecin si vous avez déjà connu des effets secondaires avec des antibiotiques ou si vous n'avez pas bien supporté un traitement antérieur par Vibramycine/Vibra.

Une hypersensibilité se manifeste notamment par une dyspnée, une difficulté à respirer (asthme), des problèmes de circulation, des tuméfactions, des enflures ou un gonflement de la peau (par ex. urticaire) et des muqueuses, des démangeaisons ou des éruptions cutanées.

Vibramycine/Vibra ne doit pas être pris en cas de maladies hépatiques graves.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Vibramycine/Vibra ?

L'administration de tétracyclines à des femmes enceintes de plus de quatre mois (au cours de la deuxième moitié de la grossesse), à des petits enfants et à des enfants de moins de 12 ans, peut entraîner une coloration (jaune-gris-brun) permanente des dents ou une formation impréférée de l'émail dentaire (hypoplasie de l'émail). Ces patients et patients ne prendront donc Vibramycine/Vibra que si le médecin l'ordonne expressément.

Si vous souffrez d'une affection hépatique, vous ne devriez prendre Vibramycine/Vibra que si votre médecin vous l'a prescrit expressément et si vous restez sous strict contrôle médical.

En cas d'apparition d'une réaction de la peau (telle qu'une éruption cutanée ou des démangeaisons), vous devez arrêter de

prendre ce médicament.

Vibra® 200 mg

8 comprimés sécables

6 118000 250449

LOT N°:

FM 4659

UT.AV:

0 8 2 3

P.P.V

89,00

P10023688

en plus de Vibramycine/Vibra ne devra se faire sur ordonnance du médecin le prescrit expressément.

Si vous prenez un anticoagulant (médicament pour liquéfier le sang), un antidiabétique oral (médicament pour abaisser la glycémie, c'est à dire le taux de sucre dans le sang), un médicament pour réduire la fréquence des crises d'épilepsie (un anti-convulsivant), un somnifère ou un contraceptif oral (« pilule contraceptive»), vous devez en informer votre médecin. Si vous prenez un contraceptif oral (« pilule contraceptive»), notez que son efficacité peut être réduite pendant un traitement par des antibiotiques. Votre médecin ou votre pharmacien peut alors vous conseiller d'autres méthodes de contraception.

Informez votre médecin si vous devez prochainement subir une anesthésie. En effet, l'utilisation simultanée d'un anesthésiant particulier (le méthoxyflurane) peut entraîner une lésion rénale fatale.

Ne consommez pas d'alcool pendant un traitement Vibramycine/Vibra.

L'utilisation concomitante de doxycycline et de cyclosporine peut augmenter l'effet toxique de l'immunosupresseur (la cyclosporine A).

L'utilisation concomitante de théophylline et de tétracycline peut augmenter le risque d'effets indésirables au niveau gastro-intestinal.

L'utilisation de tétracyclines, y compris la doxycycline, peut entraîner une augmentation bénigne de la pression intracrânienne qui est normalement réversible. Cela peut être rapporté des cas de céphalée permanente suite à une augmentation de la pression à l'intérieur de la tête sous traitement avec des tétracyclines, y compris la doxycycline.

Contactez votre médecin dans les plus brefs délais si vous constatez l'apparition de troubles de la vision.

Il est établi que l'isotétrinoïne, un principe actif dans le traitement de l'acné, peut elle aussi entraîner une augmentation bénigne de la pression intracrânienne; il convient donc d'éviter l'isotétrinoïne et de doxycycline.

La concentration de méthotrexate peut être élevée lorsque l'administration simultanée de méthotrexate et de doxycycline.

Si vous contrôlez vous-même votre glycémie (glycosurie), veuillez en informer votre médecin.

Ce médicament peut affecter l'aptitude à conduire un véhicule automobile et la capacité à marcher.

Veuillez informer votre médecin si vous avez :

- vous souffrez d'une affection hépatique
- vous êtes allergique à Vibramycine/Vibra
- vous prenez des médicaments

édialement votre
s ultraviolets, car
d'hypersensibilité
ou aux rayons
cutanées, vous
er le médecin
u d'un ulcère
s comprimés
les avaler avec
de la prise de
gastro-intesti-



Vibramycine® 100 mg

Vibra® 200 mg

Comprimé sécable
Doxycycline monohydrate

NOTICE

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament.

Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent

présenter les mêmes symptômes que vous.

Le médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez l'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que Vibramycine/Vibra et quand est-

Vibramycine/Vibra est un antibiotique du groupe des tetracyclines qui agit contre des agents pathogènes, des bactéries qui provoquent des infections.

Vibramycine/Vibra est utilisé pour le traitement de :

- les infections des voies respiratoires
- les infections du nez, de la gorge et des oreilles ou oto-rhino-laryngologiques)
- les infections des voies urinaires
- les infections des organes génitaux
- les infections de la peau et des tissus mous
- les infections gastro-intestinales
- les infections obstétricales et gynécologiques
- les infections de la bouche (infections buccales)
- les infections des yeux (infections oculaires)
- certaines infections transmises par les tiques

Vibramycine/Vibra est indiqué pour la prévention des infections suivantes :

- diarrhée des voyageurs
- paludisme dans certaines régions du globe.

Vibramycine/Vibra ne peut être pris que sur prescription médicale.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

N'oubliez pas que ce médicament vous a été prescrit par votre médecin en traitement de la maladie dont vous souffrez actuellement. Il ne doit pas être utilisé pour soigner d'autres personnes ou d'autres personnes.

L'antibiotique que contient Vibramycine/Vibra n'est pas efficace contre tous les micro-organismes à l'origine de maladies infectieuses. La prise d'un antibiotique mal choisi ou mal dosé peut entraîner des complications. Ne l'utilisez par conséquent pas de votre propre initiative pour traiter d'autres maladies ou d'autres personnes. En cas de nouvelle infection ultérieure, vous ne devez pas non plus utiliser Vibramycine/Vibra sans une nouvelle prescription médicale.

Quand Vibramycine/Vibra ne doit-il pas être utilisé ?

Vous ne devez pas prendre Vibramycine/Vibra si vous êtes allergique au principe actif de Vibramycine/Vibra, la doxycycline, à un autre composant du médicament ou à d'autres antibiotiques de la famille des tétracyclines. Prévenez votre médecin si vous avez déjà connu des effets secondaires avec des antibiotiques ou si vous n'avez pas bien supporté un traitement antérieur par Vibramycine/Vibra.

Une hypersensibilité se manifeste notamment par une dyspnée, une difficulté à respirer (asthme), des problèmes de circulation, des tuméfactions, des enflures ou un gonflement de la peau (par ex. urticaire) et des muqueuses, des démangeaisons ou des éruptions cutanées.

Vibramycine/Vibra ne doit pas être pris en cas de maladies hépatiques graves.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Vibramycine/Vibra ?

L'administration de tétracyclines à des femmes enceintes de plus de quatre mois (au cours de la deuxième moitié de la grossesse), à des petits enfants et à des enfants de moins de 12 ans, peut entraîner une coloration (jaune-gris-brun) permanente des dents ou une formation impréférée de l'émail dentaire (hypoplasie de l'émail). Ces patients et patients ne prendront donc Vibramycine/Vibra que si le médecin l'ordonne expressément.

Si vous souffrez d'une affection hépatique, vous ne devriez prendre Vibramycine/Vibra que si votre médecin vous l'a prescrit expressément et si vous restez sous strict contrôle médical.

En cas d'apparition d'une réaction de la peau (telle qu'une éruption cutanée ou des démangeaisons), vous devez arrêter de

prendre ce médicament.

Vibra® 200 mg

8 comprimés sécables

6 118000 250449

LOT N°:

FM 4659

UT.AV:

0 8 2 3

P.P.V

89,00

P10023688

en plus de Vibramycine/Vibra ne devra se faire sur ordonnance du médecin le prescrit expressément.

Si vous prenez un anticoagulant (médicament pour liquéfier le sang), un antidiabétique oral (médicament pour abaisser la glycémie, c'est à dire le taux de sucre dans le sang), un médicament pour réduire la fréquence des crises d'épilepsie (un anti-convulsivant), un somnifère ou un contraceptif oral (« pilule contraceptive»), vous devez en informer votre médecin. Si vous prenez un contraceptif oral (« pilule contraceptive»), notez que son efficacité peut être réduite pendant un traitement par des antibiotiques. Votre médecin ou votre pharmacien peut alors vous conseiller d'autres méthodes de contraception.

Informez votre médecin si vous devez prochainement subir une anesthésie. En effet, l'utilisation simultanée d'un anesthésiant particulier (le méthoxyflurane) peut entraîner une lésion rénale fatale.

Ne consommez pas d'alcool pendant un traitement Vibramycine/Vibra.

L'utilisation concomitante de doxycycline et de cyclosporine peut augmenter l'effet toxique de l'immunosupresseur (la cyclosporine A).

L'utilisation concomitante de théophylline et de tétracycline peut augmenter le risque d'effets indésirables au niveau gastro-intestinal.

L'utilisation de tétracyclines, y compris la doxycycline, peut entraîner une augmentation bénigne de la pression intracrânienne qui est normalement réversible. Cela peut être rapporté des cas de céphalée permanente suite à une augmentation de la pression à l'intérieur de la tête sous traitement avec des tétracyclines, y compris la doxycycline.

Contactez votre médecin dans les plus brefs délais si vous constatez l'apparition de troubles de la vision.

Il est établi que l'isotétrinoïne, un principe actif dans le traitement de l'acné, peut elle aussi entraîner une augmentation bénigne de la pression intracrânienne; il convient donc d'éviter l'isotétrinoïne et de doxycycline.

La concentration de méthotrexate peut être élevée lorsque l'administration simultanée de méthotrexate et de doxycycline.

Si vous contrôlez vous-même votre glycémie (glycosurie), veuillez en informer votre médecin.

Ce médicament peut affecter l'aptitude à conduire un véhicule automobile et la capacité à marcher.

Veuillez informer votre médecin si vous avez :

- vous souffrez d'une affection hépatique
- vous êtes allergique à Vibramycine/Vibra
- vous prenez des médicaments

édialement votre
s ultraviolets, car
d'hypersensibilité
ou aux rayons
cutanées, vous
er le médecin
u d'un ulcère
s comprimés
les avaler avec
de la prise de
gastro-intesti-