

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| ○ Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



## Déclaration de Maladie

N° W21-713718

120823

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : 1053	Société : R.A.T. Société		
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre	
Nom & Prénom : K HIDIOUI - Khadija			
Date de naissance : 22/02/1945			
Adresse : 342 Bd Omed aum Rabii aufla -			
Tél. : 0662256446		Total des frais engagés : 0522905132 Dhs	

Autorisation CNDP N° : AA-215/2019

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
Date de consultation : 31/05/2022			
Nom et prénom du malade : Khadija Khadiga			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie :			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / /

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :


RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le remboursement des honoraires
31/05/2022	C. ECG		3000 hs	 <b>Dr. M. BOUZOUA</b> Cardiologue 1 rue Faubourg de la Croix - Bourgogne - Caen N° 022 21 15 12 tél. 02 31 20 00 00 fax 02 31 20 00 00

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	31/05/22	1772,60

ANALYSES - RADIGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES																
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																
<b>Important :</b> Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'O.D.F.																
<b>SOINS DENTAIRES</b>  	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>												
				<b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b> <input type="text"/>												
				<b>MONTANTS DES SOINS</b> <input type="text"/>												
				<b>DEBUT D'EXECUTION</b> <input type="text"/>												
				<b>FIN D'EXECUTION</b> <input type="text"/>												
<b>O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES</b>  	<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b>			<b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b> <input type="text"/>												
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">35533411      11433553</td> </tr> </table>			H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B			35533411      11433553			<b>MONTANTS DES SOINS</b> <input type="text"/>
	H	25533412	21433552													
	D	00000000	00000000													
	B															
	35533411      11433553															
				<b>DATE DU DEVIS</b> <input type="text"/>												
				<b>DATE DE L'EXECUTION</b> <input type="text"/>												
	<b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession															



# CABINET DE CARDIOLOGIE ET D'EXPLORATIONS CARDIO-UASCULAIRES

Le 31/05/2022

بام السافي

الدكتور محمد بو زباع  
أمراض القلب والشرايين

Dr. M. BOUZOUBAA  
CARDIOLOGUE

Echocardiographie Doppler Couleur

Echo Doppler Veineux et Artériel

Holter Tensionel

Holter Rythmique

Epreuve d'Effort

Urgences Cardiologiques

Mme KHIDIOUI KHADIJA

50,70 x 2

1/ CARDENSIEL 2.5



1 CP / J Matin

27,70 x 8

2/ TENSEMIDE 5



½ CP / J Matin

97,60 x 6

3/ CARDIO-ASPIRINE



1 CP / J Midi

4/ CALCINIB 5



1 CP / J Midi

5/ NOCOL 20



1 CP / J Soir

108,00 x 8

6/ RAMIPRIL WIN 10



1 CP / J Soir

Traitemennt de 3.... Mois

TRAITEMENT A NE PAS ARRETER JUSQU'A LA PROCHAINE VISITE.

1772160

Dr. M. BOUZOUBAA  
CARDIOLOGUE

13, Bd Ain Taoujitate (en face de Clinique Badr), Résidence Ain Taoujitate en face Clinique Badr  
Casablanca - Tél. : 05 22 27 20 20 - Fax : 05 22 27 10 10 - e-mail : 6 Bourgogne

13, Bd Ain Taoujitate (en face de Clinique Badr), Résidence Ain Taoujitate en face Clinique Badr  
Casablanca - Tél. : 05 22 27 20 20 - Fax : 05 22 27 10 10 - e-mail : 6 Bourgogne  
Tél. : 05 22 27 20 20 - e-mail : cardiobouzoubaa@gmail.com

# NOCOL®

1 comprimé pelliculé

20 mg

40 mg

97,60

Co-A réductase (système cardiovasculaire).

LOT 219783

EXP 08/24

PPV 97DH60

chez les patients ayant des antécédents de maladie coronaire avérée, d'accident vasculaire cérébral, d'lipémie associée.  
chez les patients diabétiques sans antécédents coronariens ni céphéro-vasculaires ayant un haut risque de risque suivants (hypertension, âge ≥ 65 ans, créatinine élevée, tabagisme présent ou passé), avec ou sans antécédents de maladie coronaire et/ou d'accident vasculaire cérébral ischémiques.  
lement par simvastatine a permis de réduire significativement la mortalité totale, le risque d'événements cérébraux ischémiques.  
nutes (type II b et III) en complément d'un régime adapté et assidu. Pour ces indications, la poursuite e : Hypertriglycéridémie isolée (types I, IV et V) : la simvastatine n'est pas indiquée.

is suivants :

cament.  
elevée, élévation transitoire des transaminases.  
( cf interaction).

97,60

de votre médecin ou de votre pharmacien.

et musculaires, augmentant avec la dose, une évaluation précise du rapport efficacité/sécurité sera notamment 80 mg.

nt au lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémié congénitale, du syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

LOT 219112

EXP 10/24

PPV 97DH60

yoplipidémiant, des élévations modérées (inférieures à 3 fois la limite supérieure des valeurs normales) des transaminases peuvent survenir chez certains patients traités par NCOL nécessite d'interrompre le traitement (grossesse/allaitement).  
ation chez les patients consommant d'importantes quantités d'alcool et/ou présentant un antécédent de maladie hépatique.

ues de créatine phosphokinase (CPK) d'origine musculaire sont communément observées chez les patients traités par NCOL.

e s'associe rarement à la survenue d'atteintes musculaires. Devant des signes cliniques évocateurs ou faiblesses musculaires), un dosage de la CPK d'origine musculaire sera pratiqué.

lent présentant des myalgies diffuses, une sensibilité musculaire douloureuse et/ou une élévation IRS à 5 fois la normale ; dans ces conditions, le traitement doit être arrêté.

inhibiteurs de l'HMG Co-A réductase sont augmentés par l'association à des médicaments qui n'administrent seuls, tels que les fibrates.

gue secondaire à la myoglobinurie ont été rapportées.

ra être interrompu ou arrêté en cas de survenue d'un facteur prédisposant à l'apparition d'une infection aiguë sévère, hypotension, intervention chirurgicale majeure, traumatisme majeur,

La simvastatine est métabolisée par l'isoforme 3A4 du cytochrome P450. Le risque d'atteinte musculaire semble être augmenté lors de l'administration de l'inhibiteur puissant du CYP 3A4 aux doses thérapeutiques, car les taux plasmatiques de l'isoforme 3A4 peuvent être élevés.

pas été établies, la simvastatine n'est pas recommandée chez l'enfant. De plus, il n'existe pas de recommandation pour l'hypercholestérolémie familiale homozygote.

utilisation d'une dose supérieure à 40 mg ne devrait être envisagée après 70 ans que sous une

ir, saquinavir) : risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomolyses érémiant). Utiliser une autre statine.

- Itraconazole, ketoconazole (par extrapolation à partir de l'itraconazole) : risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomolyses par diminution du métabolisme hépatique de l'hydroxylémiant. Utiliser une autre statine ou interrompre le traitement hydroxylémiant pendant la durée du traitement par l'itraconazole (ou le ketoconazole).

- Delavirdine : risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomolyse (diminution du métabolisme hépatique de l'hydroxylémiant). Utiliser une autre statine.

97,60

**Comprimé sécable**

Veuillez lire attentivement ce médicament.

- Gardez cette notice, vous en aurez besoin.
- Si vous avez toute autre question, contactez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre médecin, même en cas de symptômes identiques.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice vous affecte, contactez votre pharmacien.

- Qu'est-ce que Ramipril V?
- Quelles sont les informations importantes à connaître?
- Comment prendre Ramipril V?
- Quels sont les effets indésirables?
- Comment conserver Ramipril V?
- Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE RAMIPRIL V EST-IL UTILISÉ ?

#### Classe pharmacothérapeutique

Ramipril Win, comprimé sécable, appartient à un groupe de médicaments.

- Diminuant la production d'acide rénalique et de la pression artérielle,
- Faisant se relâcher et se dilater les vaisseaux sanguins,
- Facilitant à votre cœur le passage du sang.

#### Indications thérapeutiques

Ramipril Win, comprimé sécable, est utilisé pour :

- Pour traiter une hypertension artérielle (HTA),
- Pour réduire le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC),
- Pour réduire le risque ou prévenir les complications diabétiques,
- Pour traiter votre cœur lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de faire fonctionner le reste de votre organisme (insuffisance cardiaque),
- En traitement à la suite d'un accident vasculaire cérébral.

108,00

يرجى الاطلاع على هذه النشرة.  
احتفظ بهذه النشرة، قد تتحسن  
احتياجاتك الطبية في المستقبل.

إذا كانت لديك أستهلاك آخر لدواء لك

لقد تم وصف هذا الدواء لك

مثاباه، لأنك قد تسبب الض

إذا أصبحت أحد الأعراض

مذكور في هذه النشرة، تحدث عن ذلك مع الطبيب أو مع

1. ما هو راميبيريل وين، قرص قابل للكسر وما الحالات التي يستعمل فيها؟

2. ما المعلومات الضرورية قبل تناول راميبيريل وين،

3. كيف يمكن تناول راميبيريل وين،

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب

5. كيف يحفظ راميبيريل وين، قر

6. معلومات إضافية

1. ما هو راميبيريل وين، قرص الصيادي العلاجي  
راميبيريل وين، قرص قابل للكسر

أنتيم التحويل

راميبيريل وين، قرص قابل للكسر

• تقليل انتاج الجسم للمواد التي قد

استرخاء وتعدد الأوعية الدموية

• تسهيل ضخ الدم من القلب إلى مختلف

الإرشادات العلاجية

يُنصح باستعمال راميبيريل وين، قرص

• لعلاج ضغط الدم الشريان المترافق

• للتقليل من خطر الاصابة بنوبة قلبية

• للتقليل من خطر أو تأخير تفاقم المرض

حيثما لا يستطع ضخ ك

الرا الاصابة بأزمة قلبية ()

يات الضرورية فيما

تعمال

تعمال راميبيريل

أنني من حساسية

الموجودة براميبيريل وين، قر

• علامات الحساسية يمكن أن

اللسان.

إذا كنت قد عانيت من حساسية تسمى الورم الوعائي، العدوى مع التهاب

البدن والقدمين والحلق، تورم في الحلق، اللسان، تورم حول العينين، والشفا، صعوبات في

التنفس، تختنق لفاس، الكل، أو أي نوع آخر من تضيقية الدم، اعتمادا على الجهاز المس

عن، قرص قابل للكسر

108,00

يات الضرورية فيما

تعمال

تعمال راميبيريل

أنني من حساسية

الموجودة براميبيريل وين، قر

• علامات الحساسية يمكن أن

اللسان.

إذا كنت قد عانيت من حساسية تسمى الورم الوعائي، العدوى مع التهاب

البدن والقدمين والحلق، تورم في الحلق، اللسان، تورم حول العينين، والشفا، صعوبات في

التنفس، تختنق لفاس، الكل، أو أي نوع آخر من تضيقية الدم، اعتمادا على الجهاز المس

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Oez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharma-

Cardioaspirine 100 mg/30cps  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.



Cardioaspirine 100 mg/30cps  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.



Cardioaspirine 100 mg/30cps  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.



6 118001 090280

Cardioaspirine 100 mg/30cps  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.



Cardioaspirine 100 mg/30cps  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.



ice :

CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?

Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?

Où sont indésirables éventuels ?

Quel est le risque cardiovasculaire de CardioAspirine 100 mg ?

complémentaires

**E CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**  
est comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissoit que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la

Cardioaspirine 100 mg/30cps  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.



6 118001 090280

doit être pris que selon la prescription du médecin.

t indiqué pour:

des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et

ne sténose des artères coronaires);

des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques

);

des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un

phylaxie secondaire de l'infarctus);

de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque

fections concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides

et également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer;

l'angine de poitrine instable;

... Je l'infarctus du myocarde aigu;

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations;

- la prévention de l'aggravation d'une artérite.



# CARDENSIEL®, comprimé 'pelliculé'

## Bisoprolol Fumarate

### Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament est prescrit par un professionnel prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Il peut être grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.



6 118001 100859

76216246

t dans quel cas est-il utilisé ?  
à connaître avant de prendre CARDENSIEL?

EL?

bles éventuels ?  
SIEL?

Cardensiel® 2,5 mg  
Comprimés pelliculés sécables B/30

PPV: 50,70 DHS

76216246

### ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

Fiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et réduit la quantité de sang pompé par le cœur.

lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. C'est pourquoi les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
  - asthme sévère,
  - troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
  - phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
  - acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,
- Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :
- insuffisance cardiaque aiguë,
  - aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,
  - rythme cardiaque lent,
  - pression artérielle basse,
  - certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,
  - choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

Faites attention avec CARDENSIEL :

Résultats mesures:

QRS : ms  
QT/QTcB : / ms  
PQ : ms  
P : ms  
RR/PP : / ms  
P/QRS/T : / / degrés  
QTD/QTcBD : ms  
Sokolow : mV  
NK :

Interprétation:

rapport non confirmé.

