

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

190681

Déclaration de Maladie : N° P19- 0005704

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10079 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : EZZABDI Date de naissance :

FATIMA

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 10/06/2021

Nom et prénom du malade : EZZABDI. FATIMA Age :

Lien de parenté : **Lui-même** **Conjoint** **Enfant**

Nature de la maladie : Sécheresse Bofle Lehla

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : R. BOUZIDI



Adresses Mails utiles

- Réclamation** : contact@mupras.com
- Prise en charge** : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut** : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/06/2022			160 CHF	interventeur GHAF Medecin N° 22 J. Hassan Appt. N° 22 J. Hassan Filiere HEP Azzeddine 185 Appt. N° 22 J. Hassan Medecin N° 22 J. Hassan interventeur GHAF
11/06/2022				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie ISIS 143 Lot Wafir éf: 05 22 53 31 71 - Berrechid -	10/06/12	825,20
	17/06/12	838,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient													
					Coefficient des travaux												
					Montants des soins												
					Début d'exécution												
					Fin d'exécution												
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE															
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">G</td> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> </table>			H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	00000000	00000000	G	35533411	11433553	Coefficient des travaux
H	25533412	21433552															
D	00000000	00000000															
B	00000000	00000000															
G	35533411	11433553															
		<p>(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			Montants des soins												
					Date du devis												
					Date de l'exécution												

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Ancien médecin à l'hôpital Mohamed Boaifi

طبيبة داخلية سابقة بمستشفى محمد بوافي

Diplôme en échographie de l'université

دبلوم الفحص بالصدى من جامعة باريس ديكارت

Paris Descartes

دبلوم مرض السكري من جامعة الطب والصيدلة

Diplôme en diabétologie

- الرياض -

Berrechid le 10/06/2022 برشيد في

EZ ZAKOUI FATHIA

S.V

1) Rehaneh
53,10 1yp 23% sperme

S.V

2) Diffl 1yp 3% sperme
324,00 3

S.V

3) Torsade 28%
24,70 1yp 6% (1meli)

S.V

4) Sénéhys
320 1xx = 2yp 1meli (2meli)
640, = 1yp

S.V 1meli

S.P S.P

5) MZAKIR 2yp 1meli

S.V

GHAFIRI AICHA
Générale



24,70

Althea, SA
76, Allée des Casuarinas
20580, Ain Sebaa
Casablanca

PPC : 320.00 Dhs

Sérélus®

Distribué par :
Althea, SA
76, Allée des Casuarinas
20580, Ain Sebaa
Casablanca

Sérélus®

PPC : 320.00 Dhs

Dr. GHAFIRI AICHA

الدكتورة غفراني عائشة

Ancien médecin à l'hôpital Mohamed Boaifi

طبية داخلية سابقة بمستشفي محمد يوافي

دبلوم الفحص بالصدى من جامعة باريس ديكارت

دبلوم مرض السكري من جامعة الطب والصيدلة

الرباط -

Berrechid le

17106/1022 پرشید فی

Diplôme en diabétologie

دبلوم مرض السكري من جامعة الطب والصيدلة

Paris Descartes

Diplôme en diabétologie

185 ، الطابق الثاني شارع حسان بن ثابت حي الزهراء برشيد : 62 62 51 22 05

PER. 01/2025
101-22001

RELAXOL 500MG/2MG
CP 820

P.P.V: 53DH10



6 118000 060833

Veuillez
ce m

• Gard... vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. • Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE Relaxol et DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un relaxant musculaire. Il est utilisé chez les adultes et les adolescents de plus de 16 ans en tant que traitement d'appoint de contractures musculaires douloureuses. Il doit être utilisé pour des affections aigues liées à la colonne vertébrale.

Ne pas prendre un autre médicament contenant du paracétamol.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Relaxol ?

Ne prenez jamais Relaxol :

• Si vous avez une hypersensibilité au thiocolchicoside et/ou au paracétamol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6). • Si vous avez une maladie grave du foie. • Si vous présentez une affection caractérisée par une perte de contrôle et du mouvement des muscles (paralysie flasque). • Si vous souffrez d'une faiblesse musculaire (hypotonie musculaire). • Si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que vous pourriez être enceinte. • Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas de contraception. • Si vous allaitez:

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent.

Vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des médicaments obtenus sans prescription.

Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. (voir « Posologie » et « Si vous avez pris plus de RELAXOL que vous n'auriez dû »).

Avertissements et précautions : Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre RELAXOL 500 mg/2 mg comprimé.

Si vous remarquez des symptômes pouvant indiquer une atteinte du foie pendant le traitement avec ce médicament (par exemple : perte d'appétit, nausée, vomissement, douleurs abdominales, fatigue, urine foncée, jaunisse, démangeaisons) vous devez arrêter de prendre/d'utiliser RELAXOL 500 mg/2 mg, comprimé et demander immédiatement un avis médical si l'un des symptômes apparaît.

En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la dose.

Utilisez ce médicament avec précaution et prévenez votre médecin si vous souffrez de crises épileptiques ou présentez un risque de convulsions, car Relaxol pourrait aggraver ces troubles.

Respectez rigoureusement les doses et la durée du traitement décrites à la rubrique 3. Vous ne devez pas utiliser ce médicament à une dose plus élevée ou pour une durée dépassant 7 jours. Ceci est dû au fait que les produits formés dans votre organisme lorsque vous prenez du thiocolchicoside à des doses élevées peuvent provoquer des lésions sur certaines cellules (nombre anormal de chromosomes). Cela a été mis en évidence lors d'études chez l'animal et d'études

3/2mg

SANOFI

avant de prendre
tantes pour vous.

en laboratoire. Chez l'homme, ce type de lésions cellulaires est un facteur de risque de cancer, d'altération de la fertilité masculine et peut être dangereux pour un enfant à naître. Parlez-en à votre médecin si vous avez plus de questions. Votre médecin vous

veillera sur toutes les mesures relatives à une

grossesse.

Le votre médecin avant de prendre ce médicament :

• Si vous avez une maladie du foie ou maladie fréquemment de l'alcool ou que vous avez arrêté

• Si vous souffrez de déshydratation. • Si vous

• Si vous êtes en période de jeûne, le poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou

• Si vous présentez des maladies de longue durée, si

• Si vous présentez des maladies de longue durée, si

• Si vous avez une maladie hépatique virale chronique, si vous

• Si vous avez une maladie hépatique génétique et héritée (caractérisée

• Si vous êtes atteints de

• Si vous avez une maladie hépatique (maladie hépatique associée à une augmentation du

taux de bilirubine dans le sang). • Si vous êtes allergique à l'aspirine et/ou aux

• Si vous êtes allergique aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. • La consommation de boissons alcoolisées

pendant le traitement est déconseillé. • En cas de sevrage récent d'un alcoolisme

chronique, le risque d'atteinte hépatique est majoré. • En cas d'hépatite virale

aigüe, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

Analyses de sang : devez faire un test : taux d'acide urique

EN CAS DE DOUCE VOTRE PHARMACIE

Enfants et adolescents âgés

Autres médicaments : Informez votre

pourriez prendre d'autres médicaments.

Aucun trouble interne d'autres médicaments.

• Ne prenez pas d'autres médicaments cons

risqueriez un surdosage ».

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par warfarine ou

ou antivitamine K AVK), la prise de Paracetamol aux doses maximales (4g/jour)

pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance renforcée des examens

biologiques dont notamment l'INR. Dans ce cas, consultez votre médecin.

L'efficacité du paracétamol peut être diminuée si vous prenez simultanément des

résines chélatrices - médicament qui diminue le taux de cholestérol dans le sang

(respectez un intervalle de plus de 2 heures entre les 2 prises).

Si vous recevez en même temps que du paracétamol, un traitement par

flucoxacilline (un antibiotique), vous risquez de présenter une acidose

metabolique (sang trop acide à l'origine d'une accélération de la fréquence

respiratoire).

La toxicité du paracétamol peut être augmentée, si vous prenez :

• Des médicaments potentiellement toxiques pour le foie. • Des médicaments qui

favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol tels que les

medicaments antiepileptiques (phénobarbital, phénopyridine, carbamazépine, topiramate). • De la rifampicine (un antibiotique). • En même temps de l'alcool,

RELAXOL 500 mg/2 mg, comprimé avec des aliments, boissons et de l'alcool :

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez

une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de

prendre ce médicament.

Ne prenez pas ce médicament :

• si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que vous pourriez

être enceinte. • si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas

de contraception.

Ce médicament peut mettre en danger votre enfant à naître.

Ne prenez pas ce médicament si vous allaitez car ce médicament passe dans le lait maternel.

Ce médicament peut entraîner des problèmes de fertilité masculine par altération

potentielle des cellules spermatiques (nombre anormal de chromosomes) ; ceci a

le votre médecin avant de prendre ce médicament :

• Si vous avez une maladie du foie ou maladie

fréquemment de l'alcool ou que vous avez arrêté

• Si vous souffrez de déshydratation. • Si vous

• Si vous êtes en période de jeûne, le poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou

• Si vous présentez des maladies de longue durée, si

• Si vous avez une maladie hépatique virale chronique, si vous

• Si vous avez une maladie hépatique génétique et héritée (caractérisée

• Si vous êtes atteints de

• Si vous avez une maladie hépatique (maladie hépatique associée à une augmentation du

taux de bilirubine dans le sang). • Si vous êtes allergique à l'aspirine et/ou aux

• Si vous êtes allergique aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. • La consommation de boissons alcoolisées

pendant le traitement est déconseillé. • En cas de sevrage récent d'un alcoolisme

chronique, le risque d'atteinte hépatique est majoré. • En cas d'hépatite virale

aigüe, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

Analyses de sang : devez faire un test : taux d'acide urique

EN CAS DE DOUCE VOTRE PHARMACIE

Enfants et adolescents âgés

Autres médicaments : Informez votre

pourriez prendre d'autres médicaments.

Aucun trouble interne d'autres médicaments.

• Ne prenez pas d'autres médicaments cons

risqueriez un surdosage ».

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par warfarine ou

ou antivitamine K AVK), la prise de Paracetamol aux doses maximales (4g/jour)

pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance renforcée des examens

biologiques dont notamment l'INR. Dans ce cas, consultez votre médecin.

L'efficacité du paracétamol peut être diminuée si vous prenez simultanément des

résines chélatrices - médicament qui diminue le taux de cholestérol dans le sang

(respectez un intervalle de plus de 2 heures entre les 2 prises).

Si vous recevez en même temps que du paracétamol, un traitement par

flucoxacilline (un antibiotique), vous risquez de présenter une acidose

metabolique (sang trop acide à l'origine d'une accélération de la fréquence

respiratoire).

La toxicité du paracétamol peut être augmentée, si vous prenez :

• Des médicaments potentiellement toxiques pour le foie. • Des médicaments qui

favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol tels que les

medicaments antiepileptiques (phénobarbital, phénopyridine, carbamazépine, topiramate). • De la rifampicine (un antibiotique). • En même temps de l'alcool,

RELAXOL 500 mg/2 mg, comprimé avec des aliments, boissons et de l'alcool :

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez

une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de

prendre ce médicament.

Ne prenez pas ce médicament :

• si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que vous pourriez

être enceinte. • si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas

de contraception.

Ce médicament peut mettre en danger votre enfant à naître.

Ne prenez pas ce médicament si vous allaitez car ce médicament passe dans le lait

maternel.

Ce médicament peut entraîner des problèmes de fertilité masculine par altération

potentielle des cellules spermatiques (nombre anormal de chromosomes) ; ceci a

le votre médecin avant de prendre ce médicament :

• Si vous avez une maladie du foie ou maladie

fréquemment de l'alcool ou que vous avez arrêté

• Si vous souffrez de déshydratation. • Si vous

• Si vous êtes en période de jeûne, le poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou

• Si vous présentez des maladies de longue durée, si

• Si vous avez une maladie hépatique virale chronique, si vous

• Si vous avez une maladie hépatique génétique et héritée (caractérisée

• Si vous êtes atteints de

• Si vous avez une maladie hépatique (maladie hépatique associée à une augmentation du

taux de bilirubine dans le sang). • Si vous êtes allergique à l'aspirine et/ou aux

• Si vous êtes allergique aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. • La consommation de boissons alcoolisées

pendant le traitement est déconseillé. • En cas de sevrage récent d'un alcoolisme

chronique, le risque d'atteinte hépatique est majoré. • En cas d'hépatite virale

aigüe, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

Analyses de sang : devez faire un test : taux d'acide urique

EN CAS DE DOUCE VOTRE PHARMACIE

Enfants et adolescents âgés

Autres médicaments : Informez votre

pourriez prendre d'autres médicaments.

Aucun trouble interne d'autres médicaments.

• Ne prenez pas d'autres médicaments cons

risqueriez un surdosage ».

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par warfarine ou

ou antivitamine K AVK), la prise de Paracetamol aux doses maximales (4g/jour)

pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance renforcée des examens

biologiques dont notamment l'INR. Dans ce cas, consultez votre médecin.

L'efficacité du paracétamol peut être diminuée si vous prenez simultanément des

résines chélatrices - médicament qui diminue le taux de cholestérol dans le sang

(respectez un intervalle de plus de 2 heures entre les 2 prises).

Si vous recevez en même temps que du paracétamol, un traitement par

flucoxacilline (un antibiotique), vous risquez de présenter une acidose

metabolique (sang trop acide à l'origine d'une accélération de la fréquence

respiratoire).

La toxicité du paracétamol peut être augmentée, si vous prenez :

• Des médicaments potentiellement toxiques pour le foie. • Des médicaments qui

favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol tels que les

medicaments antiepileptiques (phénobarbital, phénopyridine, carbamazépine, topiramate). • De la rifampicine (un antibiotique). • En même temps de l'alcool,

RELAXOL 500 mg/2 mg, comprimé avec des aliments, boissons et de l'alcool :

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez

une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de

prendre ce médicament :

2025 GA10466
PER. 08/2023
PPV. 75 DH 00

بغ

بغ من ليبينيل 160 ملг. سوف تتحصل على نفس الكمية من الد

بغ عند مرض القصور الكلوي:

في حالة قصور كلوي، يوصى بتحفيض الجرعة. يجب استشارة الط

بغ عند الأطفال والمرأهقين:

لا ينصح باستعمال ليبينيل 160 ملغ قرص مغلف للأطفال والمرأه

سنه.

إذا تناولت ليبينيل 160 ملغ قرص مغلف أكثر مما يجب:

إذا تناولت ليبينيل 160 ملغ قرص مغلف أكثر مما يجب:

يجب استشارة الطبيب فوراً أو أنه

إذا نسيت تناول لـ: 

إذا

الدا: 

بعد

استهنت: 

نسيت

إذا كنت قلقاً: 

ن. بتحديث مع طبيبك.

إذا توقفت عن العلاج بلبينيل 160 ملغ قرص مغلف:

لا تتوقف عن تناول ليبينيل 160 ملغ قرص مغلف الا تحت طلب الطبيب، أو إذا شعرت

بالسوء اثر تناولك هذا الدواء. فعلا، النسب الغير عاديه للدهون في الدم يلزمها علاج


على مدى طويول.

إذا أوقف الطبيب علاجه: 

ذلك.

إذا كان طبيبك: 

إذا

طبيبك: 

طبيبك


4. ما

مثل جمي:

الجميع

توقف فوراً عن تناول ليبينيل 160 ملغ قرص مغلف و استشر حالاً الطبيب، إذا ظهر

عذنك واحد من الآثار الجانبية الخطيرة التالية. قد تحتاج إلى علاج طبي طارئ:

إذا طلب منك الطبيب 

إذا طلب منك الطبيب علاجه: 

ذلك.

إذا تناولت ليبينيل 160 ملغ قرص مغلف أو فشل عصبي: قد تدل على التهاب أو إنحلال عضلي، و

التي قد تؤدي إلى مشاكل كلوية و حتى إلى الموت.

الآلام في المعدة: قد تدل على التهاب البنكرياس.

الآلام في الصدر وضيق التنفس: قد تدل على جلطة دموية في الرئتين (انسداد رئوي).

الآلام، احرار أو انتفاخ الساقين: قد تدل على جلطة دموية في ساق (جلطة وربدة

عميقه).

نادرة (قد تحدث عند أقل من شخص 1 من 1000): 

نادرة (قد تحدث عند أقل من شخص 1 من 1000):

حساسية: العلامات الدالة قد تتضمن انتفاخ في الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة،

التي قد تؤدي إلى معيوبات في التنفس.

اصفرار البشرة و بياض العيون (البرقان)، أو ارتفاع انزيمات الكبد: قد تدل على

التهاب الكبد.

آثار جانبية غير معروفة التردد:

آثار جانبية غير معروفة التردد:

طفح جاهي حاد مع احرار، بثور و وذمات للجلد تشبه حروق شديدة.

بنين.

٣١.

١٦٠

ملغ

قرص

مغلف

و استشر الط

سابقة.

٤٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٥

٣

٢

١

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

LOT 212862
EXP 11 2024
PPV 107.60

Veuillez lire attentivement cette notice
médicamenteuse car elle contient des informations importantes
pour vous.

pourriez avoir besoin de la relire.

LOT 213487
EXP 012025
PV 107.60

Que contient cette notice ?

**1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg , comprimé sécable ET DANS
QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

LOT 212862
EXP 11 2024
P&V 107.60

Il est destiné au traitement du diabète associé à un régime alimentaire adéquat. Il peut parfois être prescrit en association à l'insuline.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé s

Ne prenez jamais STAGID 700 mg, comprimé
- si vous êtes allergique à la metformine
composants contenus dans ce médicament
rubrique 6,
- si vous avez des problèmes hépatiques,
- si vous souffrez d'une détérioration sévère de
- si vous avez un diabète non contrôlé avec
hyperglycémie sévère (taux élevé de glucos
nausées, des vomissements, une diarrhée
rapide, une acidose lactique (voir « Risque
ci-dessous) ou une acidocétose. En cas d'acid

PFV:49,60 DH
LOT: 21I29
EXP: 09/2024

PPV: 49, DH
LOT: 2201
EXP: 03/2025

65,70

- si vous prenez
vous avez réce
graves problèm
avez des difficu
d'apport en oxy
d'acidose lactique
- si vous consom
Si l'un des cas
médecin avant q

Avertissements

Risque d'acide

STAGID peut être appelé « acidose pas correctement augmentée également graves, de jeûn déshydratation et problèmes auquel lesquelles une certaine maladie cardiaque. Si l'une de ces maladies, le médecin pourra

Arrêtez de prendre des médicaments sans prescrire. Souffrez d'une déshydratation. Misez sur l'hydratation et la chaleur ou sur les suppléments.

êtez de pre-
édecin ou l'
mptômes d'
traîner un com-

- vomissements
- maux d'estomac
- crampes musculaires
- tension générale
D H
- états à résistance de la peau
- se lactique

devez suivre STAGID, après l'inauguration vous devrez arrêter STAGID à lui seul, le sang trempe que engendre démantelant la pycémie, et des formations, de la des différentes contenants.

Veillez à demander

- vous devez parfois pourrez nécessaire dans votre circuit
 - vous devez suivre. Vous devez arrêter après de tels exercices, décidera si vous allez dormir pendant la nuit précisément les