

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

## Déclaration de Maladie : N° P19-0010246

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 4658 Société : 121086

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Zerkaoi Date de naissance :

Adresse :

Tél. : ..... Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**Dr. LAKHLOUFI SALEM**  
Médecine Générale  
Rue 19 N° 24 Bloc 6 Salmia 2 - Sidi Othmane  
Casablanca

Date de consultation : 21/06/2022

Nom et prénom du malade : M. ZERKAOUI Abdellah Age : 1957

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : .....



**MUPRAS**

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21.06.22	Examen	1	150DH	Dr. LAKHLOU Médecine Générale N° 24 Bloc 6 Salmia 2 - Sidi Othmane Casablanca
8.7.22				

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien	Date	Montant de la Facture
<b>PHARMACIE FILALI CASABLANCA</b> 	21/06/2022	121,80
Mme FILALI GUENNOUN Ibtissam 226, Boulevard Al Joud Salma 2 - Casablanca Tél: 05 22 38 01 47 ICE : 002115854000092 LMPE : 092004506		

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	SA/MA Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
DR MAHMOUD SALMIA SALMIA 2 <sup>me</sup> CASA 06 08 54 01 30 / ICE : 003034168000975	21/09/98	B 15.00	150.00

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

#### **(Création, remont, adjonction)**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. LAKHLOUFI SALEM

Médecine Générale

Rue 18 N° 24 Bloc 6 Salmia 2 - Sidi Othmane

Tél : 05.22.33.16.20 - Casablanca

21.06.22

M ZEKRADOU Abdenasser

Colymie <sup>1957</sup> - Polydypnie  
fine : - Ga<sup>5</sup>  
- HbAlc

Dr. LAKHLOUFI SALEM

Médecine Générale

Rue 18 N° 24 Bloc 6 Salmia 2 - Sidi Othmane

Tél : 05.22.33.16.20 - Casablanca

Dr. LAKHLOUFI Salem  
MEDECINE GENERALE

الدكتور لخلوفي سالم

الطب العام

Ancien Médecin aux F.A.R.  
Rue 18 - N° 24 - Bloc 6  
Salmia II - Sidi Othmane  
Tél : 0522 38 16 20  
Casablanca 04

المستعجلات  
URGENCE  
0666 24 36 82

الزنقة 18 رقم 24 - بلوك 6  
السالمية 2 - سيدى عثمان  
الهاتف : 0522 38 16 20  
دار البيضاء 04

Casablanca, le 21 - 06 - 22 الدار البيضاء، في

M<sup>r</sup> ZEKRADOU

Abderahmane

51000

①

Taganil 500

15

note

14 34

دواء

دواء

23,60 x 3 = 70,80

15

②

Cardioflex

CP

4135

دواء

PHARMACIE FARMACEUTIQUE  
Mme FILALI GUENNOUNI Attissam  
228, Bd de la Gendarmerie  
Salmia 2 - Casablanca

228, Bd de la Gendarmerie  
Salmia 2 - Casablanca  
Tél : 05 22 38 01 47  
ICE : 009211585400092  
I.N.P.E : 092004506

Dr. LAKHLOUFI SALEM  
Médecine Générale  
Rue 18 N° 24 Bloc 6 Salmia 2 - Sidi Othmane  
Tél : 05 22 38 16 20 - Casablanca

**CARDIOFLEX® 100 mg**  
**Comprimé Pelliculé**  
**Boîte de 30**  
**Acide Acétylsalicylique**

• Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire.

• Si vous avez d'autres questions, demandez d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit, donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Quel contient cette notice?**

1. Qu'est-ce que CARDIOFLEX et dans quel cas est-il utilisé ?  
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CARDIOFLEX ?

3. Comment utiliser CARDIOFLEX ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver CARDIOFLEX ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations

**1. QU'EST-CE QUE CARDIOFLEX ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : antithrombotiques ;

antimétabolites plaquettaires à l'exclusion de l'héparine. CARDIOFLEX contient de l'acide acétylsalicylique, qui à faibles doses, appartient au groupe de médicaments appelés antiagrégant plaquettaires. Les plaquettes sont des petites cellules sanguines qui provoquent la coagulation du sang et sont impliquées dans le phénomène de thrombose. Lorsqu'un caillot sanguin se forme dans une artère, il bloque la circulation sanguine et l'apport en oxygène. Au niveau du cœur, cela peut causer une crise cardiaque ou une crise d'angine de poitrine; au niveau du cerveau, cela peut causer un accident vasculaire cérébral.

CARDIOFLEX est utilisé pour réduire le risque de formation de caillots sanguins et prévenir ainsi la survenue de :

• Crises cardiaques (chez des patients ayant eu une crise cardiaque par le passé).

• Accidents vasculaires cérébraux (chez des patients ayant eu un accident vasculaire cérébral par le passé).

• Problèmes cardiaques chez des patients atteints d'angor stable (un type de douleur thoracique).

• Problèmes cardiaques chez des patients ayant des antécédents d'angor instable (un type de douleur thoracique), en dehors d'une crise aiguë récente.

CARDIOFLEX est également utilisé pour prévenir la formation de caillots sanguins chez les patients qui ont subi certains types d'interventions cardiaques destinées à élargir ou désobstruer les vaisseaux sanguins.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDIOFLEX ?**

Ne prenez jamais de CARDIOFLEX si :

• Si vous êtes allergique à l'acide acétylsalicylique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

• Si vous êtes allergique à d'autres salicylates ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Les AINS sont souvent utilisés pour traiter les problèmes d'arthrite, de rhumatisme et pour soulager la douleur.

• Si vous avez eu une crise d'asthme ou des crachats (gonflements du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue; édème de Quincke) suite à la prise de salicylates ou d'AINS.

• Si vous souffrez ou avez souffert d'un ulcère de l'estomac ou duodénum ou de tout autre type de saignements comme un accident vasculaire cérébral.

• Si vous souffrez de problèmes de coagulation sanguine.

• Si vous présentez une maladie hépatique ou rénale sévère.

• Si vous êtes actuellement dans le troisième trimestre de grossesse, vous ne devez pas utiliser des doses supérieures à 100 mg/jour (voir rubrique « Grossesse, allaitement et fertilité »).

• Si vous prenez un médicament appelé méthotrexate (par exemple en cas de cancer ou de polyarthrite rhumatoïde) à des posologies supérieures à 15 mg/semaine.

**Mises en garde spéciales & Précautions :**

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre CARDIOFLEX.

• Si vous avez des troubles rénaux, hépatiques ou cardiaques.

• Si vous avez ou avez eu des problèmes d'estomac ou de l'intestin.

• Si vous avez une pression artérielle élevée.

• Si vous souffrez d'asthme, de rhume des foins, de polypes nasaux

23,60

sur, parlez-en à votre médecin.  
**Enfants et adolescents**

L'acide acétylsalicylique peut provoquer un syndrome de Reye lorsqu'il est administré à des enfants. Le syndrome de Reye est une maladie très rare qui affecte le cerveau et le foie, pouvant être mortelle. Pour cette raison, CARDIOFLEX ne doit pas être administré aux enfants âgés de moins de 16 ans, sauf sur l'avis d'un médecin.

**Autres médicaments et CARDIOFLEX**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. L'effet du traitement peut être influencé si l'acide acétylsalicylique est pris en même temps que d'autres médicaments utilisés pour :

- fluidifier le sang/ prévenir la formation de caillots (tels que warfarine, héparine, clopidogrel),
- éviter le rejet d'organe après transplantation (tels que ciclosporine, tacrolimus),
- traiter l'hypertension artérielle (tels que diurétiques et inhibiteurs de l'enzyme de conversion),
- réguler les battements du cœur (tels que digoxine),
- traiter les maladies maniaço-dépressives (tels que lithium),
- traiter la douleur et l'inflammation (tels que AINS comme ibuprofène, ou stéroïdes),
- traiter la goutte (tels que probénécide),
- traiter l'épilepsie (tels que valproate, phén妥toïne),
- traiter le cancer ou la polyarthrite rhumatoïde (tels que méthotrexate),
- traiter le diabète (tels que glibenclamide),
- traiter la dépression (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (IRS) tels que la sertraline ou la paroxétine),
- ou médicaments utilisés en tant que traitement hormonal substitutif lorsque les glandes surrenaliennes ou l'hypophyse ont été détruites, ou pour traiter l'inflammation y compris les maladies rhumatismales ou l'inflammation de l'intestin (tels que corticostéroïdes),
- traiter les modifications du taux de lipides sanguins (acide nicotinique).

**CARDIOFLEX avec des aliments, boissons et de l'alcool**  
La consommation d'alcool peut éventuellement augmenter le risque de saignements gastro-intestinaux et prolonger le temps de saignement.

**Grossesse, allaitement et fertilité :**  
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Les femmes enceintes ne doivent pas prendre de l'acide acétylsalicylique pendant leur grossesse sauf avis contraire de leur médecin.

Vous ne devez pas prendre CARDIOFLEX au cours des 3 derniers mois de votre grossesse, sauf avis contraire de votre médecin et la dose quotidienne ne doit pas dépasser 100 mg (voir rubrique « Ne prenez pas CARDIOFLEX »).

La prise de doses habituelles ou élevées de ce médicament en fin de grossesse peut conduire à des complications graves chez la mère et le bébé. Les femmes qui allaitent ne doivent pas prendre de l'acide acétylsalicylique sauf avis contraire de leur médecin. Conduite de véhicules et utilisation de machines CARDIOFLEX n'entraîne aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

**3. COMMENT PRENDRE CARDIOFLEX ?**  
Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**Posologie**

**CARDIOFLEX® 100 mg**  
**Comprimé Pelliculé**  
**Boîte de 30**  
**Acide Acétylsalicylique**

• Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit, donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Quel contient cette notice?**

1. Qu'est-ce que CARDIOFLEX et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CARDIOFLEX ?

**3. Comment utiliser CARDIOFLEX ?**

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**5. Comment conserver CARDIOFLEX ?**

**6. Contenu de l'emballage et autres informations**

**1. QU'EST-CE QUE CARDIOFLEX ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : antithrombotiques ;

antimétabolites plaquettaires à l'exclusion de l'héparine. CARDIOFLEX contient de l'acide acétylsalicylique, qui à faibles doses, appartient au groupe de médicaments appelés antiagrégant plaquettaires. Les plaquettes sont des petites cellules sanguines qui provoquent la coagulation du sang et sont impliquées dans le phénomène de thrombose. Lorsqu'un caillot sanguin se forme dans une artère, il bloque la circulation sanguine et l'apport en oxygène. Au niveau du cœur, cela peut causer une crise cardiaque ou une crise d'angine de poitrine; au niveau du cerveau, cela peut causer un accident vasculaire cérébral.

CARDIOFLEX est utilisé pour réduire le risque de formation de caillots sanguins et prévenir ainsi la survenue de :

- Crises cardiaques (chez des patients ayant eu une crise cardiaque par le passé).
- Accidents vasculaires cérébraux (chez des patients ayant eu un accident vasculaire cérébral par le passé).
- Problèmes cardiovasculaires chez des patients atteints d'angor stable (un type de douleur thoracique).
- Problèmes cardiovasculaires chez des patients ayant des antécédents d'angor instable (un type de douleur thoracique), en dehors d'une crise aiguë récente.

CARDIOFLEX est également utilisé pour prévenir la formation de caillots sanguins chez les patients qui ont subi certains types d'interventions cardiaques destinées à élargir ou désobstruer les vaisseaux sanguins.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDIOFLEX ?**

Ne prenez jamais de CARDIOFLEX si :

- Si vous êtes allergique à l'acide acétylsalicylique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique à d'autres salicylates ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Les AINS sont souvent utilisés pour traiter les problèmes d'arthrite, de rhumatisme et pour soulager la douleur.
- Si vous avez eu une crise d'asthme ou des crachats (gonflements du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue; édème de Quincke) suite à la prise de salicylates ou d'AINS.
- Si vous souffrez ou avez souffert d'un ulcère de l'estomac ou duodénum ou de tout autre type de saignements comme un accident vasculaire cérébral.
- Si vous souffrez de problèmes de coagulation sanguine.
- Si vous présentez une maladie hépatique ou rénale sévère.
- Si vous êtes actuellement dans le troisième trimestre de grossesse, vous ne devez pas utiliser des doses supérieures à 100 mg/jour (voir rubrique « Grossesse, allaitement et fertilité »).
- Si vous prenez un médicament appelé méthotrexate (par exemple en cas de cancer ou de polyarthrite rhumatoïde) à des posologies supérieures à 15 mg/semaine.

**Mises en garde spéciales & Précautions :**

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre CARDIOFLEX :

- Si vous avez des troubles rénaux, hépatiques ou cardiaques.
- Si vous avez ou avez eu des problèmes d'estomac ou de l'intestin.
- Si vous avez une pression artérielle élevée.
- Si vous souffrez d'asthme, de rhume des foins, de polypes nasaux

23,60

sur, parlez-en à votre médecin.

**Enfants et adolescents**

L'acide acétylsalicylique peut provoquer un syndrome de Reye lorsqu'il est administré à des enfants. Le syndrome de Reye est une maladie très rare qui affecte le cerveau et le foie, pouvant être mortelle. Pour cette raison, CARDIOFLEX ne doit pas être administré aux enfants âgés de moins de 16 ans, sauf sur l'avis d'un médecin.

**Autres médicaments et CARDIOFLEX**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. L'effet du traitement peut être influencé si l'acide acétylsalicylique est pris en même temps que d'autres médicaments utilisés pour :

- fluidifier le sang/ prévenir la formation de caillots (tels que warfarine, héparine, clopidogrel),
- éviter le rejet d'organe après transplantation (tels que ciclosporine, tacrolimus),
- traiter l'hypertension artérielle (tels que diurétiques et inhibiteurs de l'enzyme de conversion),
- réguler les battements du cœur (tels que digoxine),
- traiter les maladies maniaco-dépressives (tels que lithium),
- traiter la douleur et l'inflammation (tels que AINS comme ibuprofène, ou stéroïdes),
- traiter la goutte (tels que probénécide),
- traiter l'épilepsie (tels que valproate, phén妥toïne),
- traiter le cancer ou la polyarthrite rhumatoïde (tels que méthotrexate),
- traiter le diabète (tels que glibenclamide),
- traiter la dépression (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (IRS) tels que la sertraline ou la paroxétine),
- ou médicaments utilisés en tant que traitement hormonal substitutif lorsque les glandes surrenaliennes ou l'hypophyse ont été détruites, ou pour traiter l'inflammation y compris les maladies rhumatismales ou l'inflammation de l'intestin (tels que corticostéroïdes),
- traiter les modifications du taux de lipides sanguins (acide nicotinique).

**CARDIOFLEX avec des aliments, boissons et de l'alcool**  
La consommation d'alcool peut éventuellement augmenter le risque de saignements gastro-intestinaux et prolonger le temps de saignement.

**Grossesse, allaitement et fertilité :**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Les femmes enceintes ne doivent pas prendre de l'acide acétylsalicylique pendant leur grossesse sauf avis contraire de leur médecin.

Vous ne devez pas prendre CARDIOFLEX au cours des 3 derniers mois de votre grossesse, sauf avis contraire de votre médecin et la dose quotidienne ne doit pas dépasser 100 mg (voir rubrique « Ne prenez pas CARDIOFLEX »). La prise de doses habituelles ou élevées de ce médicament en fin de grossesse peut conduire à des complications graves chez la mère et le bébé. Les femmes qui allaitent ne doivent pas prendre de l'acide acétylsalicylique sauf avis contraire de leur médecin. Conduite de véhicules et utilisation de machines CARDIOFLEX n'entraîne aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

**3. COMMENT PRENDRE CARDIOFLEX ?**

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**Posologie**

**CARDIOFLEX® 100 mg**  
**Comprimé Pelliculé**  
**Boîte de 30**  
**Acide Acétylsalicylique**

• Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire.

• Si vous avez d'autres questions, demandez d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit, donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Quel contient cette notice?**

1. Qu'est-ce que CARDIOFLEX et dans quel cas est-il utilisé ?  
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CARDIOFLEX ?

3. Comment utiliser CARDIOFLEX ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver CARDIOFLEX ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations

**1. QU'EST-CE QUE CARDIOFLEX ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : antithrombotiques ;

antimétabolites plaquettaires à l'exclusion de l'héparine

CARDIOFLEX contient de l'acide acétylsalicylique, qui à faibles doses, appartient au groupe de médicaments appelés antiagrégant plaquettaires. Les plaquettes sont des petites cellules sanguines qui provoquent la coagulation du sang et sont impliquées dans le phénomène de thrombose. Lorsqu'un caillot sanguin se forme dans une artère, il bloque la circulation sanguine et l'apport en oxygène. Au niveau du cœur, cela peut causer une crise cardiaque ou une crise d'angine de poitrine; au niveau du cerveau, cela peut causer un accident vasculaire cérébral.

CARDIOFLEX est utilisé pour réduire le risque de formation de caillots sanguins et prévenir ainsi la survenue de :

• Crises cardiaques (chez des patients ayant eu une crise cardiaque par le passé).

• Accidents vasculaires cérébraux (chez des patients ayant eu un accident vasculaire cérébral par le passé).

• Problèmes cardiaques chez des patients atteints d'angor stable (un type de douleur thoracique).

• Problèmes cardiaques chez des patients ayant des antécédents d'angor instable (un type de douleur thoracique), en dehors d'une crise aiguë récente.

CARDIOFLEX est également utilisé pour prévenir la formation de caillots sanguins chez les patients qui ont subi certains types d'interventions cardiaques destinées à élargir ou désobstruer les vaisseaux sanguins.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDIOFLEX ?**

Ne prenez jamais de CARDIOFLEX si :

• Si vous êtes allergique à l'acide acétylsalicylique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

• Si vous êtes allergique à d'autres salicylates ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Les AINS sont souvent utilisés pour traiter les problèmes d'arthrite, de rhumatisme et pour soulager la douleur.

• Si vous avez eu une crise d'asthme ou des crachats (gonflements du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue; édème de Quincke) suite à la prise de salicylates ou d'AINS.

• Si vous souffrez ou avez souffert d'un ulcère de l'estomac ou duodénum ou de tout autre type de saignements comme un accident vasculaire cérébral.

• Si vous souffrez de problèmes de coagulation sanguine.

• Si vous présentez une maladie hépatique ou rénale sévère.

• Si vous êtes actuellement dans le troisième trimestre de grossesse, vous ne devez pas utiliser des doses supérieures à 100 mg/jour (voir rubrique « Grossesse, allaitement et fertilité »).

• Si vous prenez un médicament appelé méthotrexate (par exemple en cas de cancer ou de polyarthrite rhumatoïde) à des posologies supérieures à 15 mg/semaine.

**Mises en garde spéciales & Précautions :**

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre CARDIOFLEX :

• Si vous avez des troubles rénaux, hépatiques ou cardiaques.

• Si vous avez ou avez eu des problèmes d'estomac ou de l'intestin.

• Si vous avez une pression artérielle élevée.

• Si vous souffrez d'asthme, de rhume des foins, de polypes nasaux

23,60

sur, parlez-en à votre médecin.

**Enfants et adolescents**

L'acide acétylsalicylique peut provoquer un syndrome de Reye lorsqu'il est administré à des enfants. Le syndrome de Reye est une maladie très rare qui affecte le cerveau et le foie, pouvant être mortelle. Pour cette raison, CARDIOFLEX ne doit pas être administré aux enfants âgés de moins de 16 ans, sauf sur l'avis d'un médecin.

**Autres médicaments et CARDIOFLEX**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. L'effet du traitement peut être influencé si l'acide acétylsalicylique est pris en même temps que d'autres médicaments utilisés pour :

- fluidifier le sang/ prévenir la formation de caillots (tels que warfarine, héparine, clopidogrel),
- éviter le rejet d'organe après transplantation (tels que ciclosporine, tacrolimus),
- traiter l'hypertension artérielle (tels que diurétiques et inhibiteurs de l'enzyme de conversion),
- réguler les battements du cœur (tels que digoxine),
- traiter les maladies maniaco-dépressives (tels que lithium),
- traiter la douleur et l'inflammation (tels que AINS comme ibuprofène, ou stéroïdes),
- traiter la goutte (tels que probénécide),
- traiter l'épilepsie (tels que valproate, phén妥toïne),
- traiter le cancer ou la polyarthrite rhumatoïde (tels que méthotrexate),
- traiter le diabète (tels que glibenclamide),
- traiter la dépression (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (IRS) tels que la sertraline ou la paroxétine),
- ou médicaments utilisés en tant que traitement hormonal substitutif lorsque les glandes surrenaliennes ou l'hypophyse ont été détruites, ou pour traiter l'inflammation y compris les maladies rhumatismales ou l'inflammation de l'intestin (tels que corticostéroïdes),
- traiter les modifications du taux de lipides sanguins (acide nicotinique).

**CARDIOFLEX avec des aliments, boissons et de l'alcool**

La consommation d'alcool peut éventuellement augmenter le risque de saignements gastro-intestinaux et prolonger le temps de saignement.

**Grossesse, allaitement et fertilité :**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Les femmes enceintes ne doivent pas prendre de l'acide acétylsalicylique pendant leur grossesse sauf avis contraire de leur médecin.

Vous ne devez pas prendre CARDIOFLEX au cours des 3 derniers mois de votre grossesse, sauf avis contraire de votre médecin et la dose quotidienne ne doit pas dépasser 100 mg (voir rubrique « Ne prenez pas CARDIOFLEX »).

La prise de doses habituelles ou élevées de ce médicament en fin de grossesse peut conduire à des complications graves chez la mère et le bébé.

Les femmes qui allaitent ne doivent pas prendre de l'acide acétylsalicylique sauf avis contraire de leur médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines CARDIOFLEX n'entraîne aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

**3. COMMENT PRENDRE CARDIOFLEX ?**

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**Posologie**

# Tangan

 **Tanganil® 500 mg**  
تاجانيل® 500 ملغ  
30 comprimés - قرص 30  
VTE : MA - PPV : 51DH00

728860



6 118001 183340

**Veuillez lire attentivement  
de prendre ce médicament.  
informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TANGANIL 500 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANGANIL 500 mg, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE TANGANIL 500 mg, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER TANGANIL 500 mg, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## **1. QU'EST-CE QUE TANGANIL 500 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

### **Classe pharmacothérapeutique**

#### **ANTIVERTIGINEUX**

Ce médicament est préconisé dans le traitement symptomatique de la crise vertigineuse.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANGANIL 500 mg, comprimé ?**

**Ne prenez jamais TANGANIL 500 mg, comprimé**  
dans les cas suivants:

- allergie connue à l'acétylénacéine ou à l'un des autres composants de ce médicament,

rance au  
LE, IL EST  
L'AVIS DE VOTRE MEDECIN

### **Prise ou utilisation d'au**

Si vous prenez ou avez pris  
y compris un médicament ob  
à votre médecin ou à votre p

### **Grossesse et allaitemen**

Il est préférable de ne pas  
la grossesse ou l'allaitement.

Si vous découvrez que  
le traitement, consultez votre  
de la nécessité de poursuivre.  
Demandez conseil à votre  
avant de prendre tout médic

### **Liste des excipients à effe**

## **3. COMMENT PRENDRE T comprimé ?**

### **Posologie**

Chez l'adulte

### **Fréquence d'administra**

En moyenne 3 à 4 comprimé

### **Durée de traitement**

La durée du traitement est  
au début du traitement ou en  
être augmentée.

DANS TOUS LES CAS, S  
A L'ORDONNANCE DE VO

### **Mode d'administration**

Voie orale.

## **4. QUELS SONT LES EFFE EVENTUELS ?**

Comme to  
est sus  
le mo  
Des  
dér



LABORATOIRE D'ANALYSES  
MÉDICALES SALMIA  
DR. MAHI ZOHIR  
Ex Biologiste à CHU-Casablanca

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES SALMIA

مختبر التحاليل الطبية السالمية

Diplômé d'Etude Spécialisé en Immunologie  
Hématologie - Bactériologie - Virologie  
Biochimie - Parasitologie - Mycologie

CASABLANCA le: 21/06/2022

**FACTURE N° 2622/22**

Médecin

Nom du patient **MR ZEKRAOUI ABDERRAHMANE**

Examens **- HBA1C- GLY**

Cotation **B 150**

Montant **150,00 DH**

**Arrêtée la présente facture à la somme de: CENT CINQUANTE DIRHAMS**

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES SALMIA  
N°9 BD EL JOLANE SALMIA 2  
TEL: 06 08 54 01 30 / ICE: 093034168000075  
DR MAHI ZOHIR  
CISI

**Horaires d'ouverture : Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30, Le Samedi de 8h à 12h30**

N°9, Boulevard Al Joulane, Salmia 2, Ben Msik - Casablanca - Tél/Fax : 08 08 54 01 30 - Email : laboratoire.salmia2@gmail.com

IF : 50351577 - INPE : 093061497 - ICE : 003034168000075 - Prélèvement à domicile sur RDV : +212 664 081 080



# LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES SALMIA

## مختبر التحاليل الطبية السالمية

LABORATOIRE D'ANALYSES

MÉDICALES SALMIA

DR. MAHI ZOHIR

Ex Biologiste à CHU-Casablanca

Diplômé d'Etude Spécialisé en Immunologie  
Hematologie - Bacteriologie - Virologie  
Biochimie - Parasitologie - Mycologie

Prélèvement du : 21/06/2022 à 08:41

Résultats édités le: 21/06/2022



**MME HAMMADI MAMA**

Dossier N° 22F709

Page: 1/1

### **BIOCHIMIE SANGUINE** ( Roche-cobas c311;c 111)

<b>GLYCEMIE A JEUN</b> :	<b>2,83</b>	g/l	(*)	0,7 à 1,1 g/l
(enzymatique à l'hexokinase ROCHE C 311)	15,73	mmol/l		3,9 à 6,1 mmol/l

Valeur normal pour femme enceinte:

0.7 g/l à 0.95 g/l

<b>HEMOGLOBINE GLYQUEE HbA1c.....</b>	<b>12,00</b>	%	(*)	4,00 à 6,00 %
(BIORAD D10:chromatographie HPLC)				


interprétation HbA1c chez un diabétique

4-6%: très bon équilibre glycémique

6.1-8%:bon équilibre glycémique

>8%:Mauvais équilibre glycémique

Total de pages: 1



**Horaires d'ouverture : Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30, Le Samedi de 8h à 12h30**

N°9, Boulevard Al Joulane, Salmia 2, Ben Msik - Casablanca - Tél/Fax : 08 08 54 01 30 - Email : laboratoire.salmia2@gmail.com