

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 84.98

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre : Neuve 12.11.32

Nom & Prénom :

Sakina Dekkan

Date de naissance :

08/08/1991

Adresse :

Rue 18A N 39 GR 4<sup>e</sup> Oulja

Carablanca

Tél. : 0643029621

Total des frais engagés : 1275 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 23/06/2022

Nom et prénom du malade : Dekkan Sakina Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Report MUPRAS Casablanca

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 21/07/2022

Signature de l'adhérent(e) :

LS

MUPRAS

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23/06/2022	C		150.00 DH	
23/06/2022	C			 Dr Mustapha NAJI Omnipraticien Ancien Médecin des Hôpitaux Militaires Lissasta Extension n° 353 - Casablanca Tél 0522 65 07 04

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Pochet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. BENANI Jaafar - CASABLANCA	23/06/2022	332,00 DH
Dr. Bennani Jaafar - CASABLANCA	23/06/2022	213,00 DH

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr Mustapha NAJI	23/06/2022	RAP face	150.00 DH
		sudoscan	400.00 DH

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

**O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES**

H	G
25533412 00000000 00000000 35533411	21433552 00000000 00000000 11433553
B	

**[Création, remont, adjonction]**  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

**DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE**

H	G
25533412 00000000 00000000 35533411	21433552 00000000 00000000 11433553
B	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

## عيادة

طب الأطفال

داء السكري - الكوليسترون

ارتفاع الضغط الدموي - التخطيط الكهربائي للقلب

أمراض الغدد / عقم الزوجين / أمراض المفاصل

الطب النفسي - أمراض الجهاز العصبي



## الدكتور الناجي مصطفى

خريج المدرسة الملكية للصحة العسكرية بالرباط

خريج كلية الطب بالرباط

طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط

طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

Casablanca, le : 23.11.92

Nom et Prénom : Delkar Selma



27,00 x 3 Alivier 50 1 - 0 - 1  
89,00 Bisanfer Mg 0 - 0 - 1

332,00



101mm

Pharmacie TAM  
Dr BENANI Safer  
302 Bd Oued Sbou, Oulfa  
CASABLANCA  
Tél: 05.22.90.18.99

Dr Mustapha NAJI  
Omnipraticien  
Ancien Médecin  
des Hôpitaux Militaires

Yassafia Extension n° 353 - Casablanca  
Tél: 0522 65 07 04

Car d' enregistrement :  
10309235/MAv6/DMP/CA/18

BIOFAR Mag Vita B6 CP Bte 20  
PPC : 89.00

Utl Av Lot :  
07/2024 1224/4

**MAADERM**

6, Rue des Manufactures - 75000 Paris - France  
Laboratoires BIOFAR - 33330 Montauban - France  
Fabriqué en France / Manufactured by France

IBERIA



50 mg

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



6 118000 230250

22/00

IBERIA



50 mg

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



6 118000 230250

22/00

IBERIA



50 mg

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



6 118000 230250

22/00

IBERIA



50 mg

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



6 118000 230250

22/00

IBERIA



50 mg

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



6 118000 230250

22/00

IBERIA



50 mg

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



6 118000 230250

22/00

IBERIA



50 mg

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



6 118000 230250

22/00

IBERIA



50 mg

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



6 118000 230250

22/00

IBERIA



50 mg

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



6 118000 230250

22/00

## الدكتور الناجي مسطفي

خريج المدرسة الملكية للصحة العسكرية بالرباط  
خريج كلية الطب بالرباط  
طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط  
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

## عيادة

طب الأطفال  
داء السكري - الكوليسترون  
ارتفاع الضغط الدموي - التخطيط الكهربائي للقلب  
أمراض الغدد / عقم الزوجين / أمراض المفاصل  
الطب النفسي - أمراض الجهاز العصبي



Casablanca, le : 28-26-92

Nom et Prénom : Dr. Naji Salim

40,50 x 6 Tardyferon 8 : ۴۰  
243,00. 1 — 0 — 1 مسافة العلية



Dr Mustapha NAJI  
Omnipraticien  
Ancien Médecin  
des Hôpitaux Militaires  
Lissasta Extension n° 353 - Casablanca  
Tél 0522 65 07 04

Pharmacie TAM  
Dr. BENANI Jaafar  
302, Bd Oued Sebou, Oulfa  
- CASABLANCA -  
Tél: 05.22.90.18.99

# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament en suivant cette notice ou par n de la relire.

PPV : 40.50 DH  
 conseil ou information. ble, parlez-en à votre que aussi à tout effet ns cette notice. Voir



6 118001 103041

## Tardyferon® 80 mg 30 comprimés pelliculés

319334

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE-QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'augmentation de la tension qui recevaient des médicaments ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

### Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps cette boisson.

### Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devrez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acétoxyhydroxamic.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie articulaire (la penicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc ou du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon

# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament en suivant cette notice ou par n de la relire.

PPV : 40.50 DH  
 conseil ou information. ble, parlez-en à votre que aussi à tout effet ns cette notice. Voir



6 118001 103041

## Tardyferon® 80 mg 30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA

41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

319334

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE-QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'augmentation de la tension qui recevaient des médicaments ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

### Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps cette boisson.

### Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devrez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acétoxyhydroxamic.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie articulaire (la penicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc ou du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon

# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament en suivant cette notice ou par n de la relire.

PPV : 40.50 DH  
 conseil ou information. ble, parlez-en à votre que aussi à tout effet ns cette notice. Voir



6 118001 103041

## Tardyferon® 80 mg 30 comprimés pelliculés

319334

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE-QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'augmentation de la tension qui recevaient des médicaments ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

### Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps cette boisson.

### Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devrez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acétoxyhydroxamic.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie articulaire (la penicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc ou du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon

# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament en suivant cette notice ou par n de la relire.

PPV : 40.50 DH  
 conseil ou information. ble, parlez-en à votre que aussi à tout effet ns cette notice. Voir



6 118001 103041

## Tardyferon® 80 mg 30 comprimés pelliculés

319334

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE-QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'augmentation de la tension qui recevaient des médicaments ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

### Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps cette boisson.

### Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devrez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acétoxyhydroxamic.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie articulaire (la penicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc ou du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon

# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament en suivant cette notice ou par n de la relire.

PPV : 40.50 DH  
 conseil ou information. ble, parlez-en à votre que aussi à tout effet ns cette notice. Voir



6 118001 103041

## Tardyferon® 80 mg 30 comprimés pelliculés

319334

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE-QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'augmentation de la tension qui recevaient des médicaments ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

### Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps cette boisson.

### Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devrez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acétoxyhydroxamic.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie articulaire (la penicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc ou du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon

# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament en suivant cette notice ou par n de la relire.

PPV : 40.50 DH  
 conseil ou information. ble, parlez-en à votre que aussi à tout effet ns cette notice. Voir



6 118001 103041

## Tardyferon® 80 mg 30 comprimés pelliculés

319334

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE-QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'augmentation de la tension qui recevaient des médicaments ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

### Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps cette boisson.

### Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devrez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acétoxyhydroxamic.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie articulaire (la penicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc ou du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon

## عيادة

طب الأطفال  
داء السكري - الكوليسترونول  
ارتفاع الضغط الدموي - التخطيط الكهربائي للقلب  
أمراض الغدد / عقم الزوجين / أمراض المفاصل  
الطب النفسي - أمراض الجهاز العصبي



## الدكتور الناجي مصطفى

خريج المدرسة الملكية للصحة العسكرية بالرباط  
خريج كلية الطب بالرباط  
طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط  
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

Casablanca, le : ٢٣ . ٦ . ٩٢

Nom et Prénom : د. ناجي المصطفى

Sorour

Dr Mustapha NAJI  
Omnipraticien  
Ancien Médecin  
des Hôpitaux Militaires  
Lissasfa Extension n° 353 - Casablanca  
Tél 0522 65 07 04

## عيادة

طب الأطفال  
داء السكري - الكوليسترونول  
ارتفاع الضغط الدموي - التخطيط الكهربائي للقلب  
أمراض الغدد / عقم الزوجين / أمراض المفاصل  
الطب النفسي - أمراض الجهاز العصبي



## الدكتور الناجي مصطفى

خريج المدرسة الملكية للصحة العسكرية بالرباط  
خريج كلية الطب بالرباط  
طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط  
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

Casablanca, le :

23/06/22

Nom et Prénom :

Dekkoor Sakina

## FACTURE 30538

**SUDOSCAN :**

**MONTANT :**

**400.00DH**

Dr Mustapha NAJI  
Omnipraticien  
Ancien Médecin  
des Hôpitaux Militaires  
Lissasta Extension n° 353 - Casablanca  
Tél 0522 65 07 04

## عيادة

طب الأطفال  
داء السكري - الكوليسترونول  
ارتفاع الضغط الدموي - التخطيط الكهربائي للقلب  
أمراض الغدد / عقم الزوجين / أمراض المفاصل  
الطب النفسي - أمراض الجهاز العصبي



## الدكتور الناجي مصطفى

خريج المدرسة الملكية للصحة العسكرية بالرباط  
خريج كلية الطب بالرباط  
طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط  
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

Casablanca, le : 23/06/12

Nom et Prénom : Dekkar Sakina

Rap face

Dr Mustapha NAJI  
Ornithopratien  
Ancien Médecin  
des Hôpitaux Militaires  
Lissasta Extension n° 353 - Casablanca  
Tél : 0522 65 07 02

## عيادة

طب الأطفال  
داء السكري - الكوليسترونول  
ارتفاع الضغط الدموي - التخطيط الكهربائي للقلب  
أمراض الغدد / عقم الزوجين / أمراض المفاصل  
الطب النفسي - أمراض الجهاز العصبي



## الدكتور الناجي مصطفى

خريج المدرسة الملكية للصحة العسكرية بالرباط  
خريج كلية الطب بالرباط  
طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط  
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

Casablanca, le : 23.06.22

Nom et Prénom : Dekkan Sakina

## Radiographie thoracique

Absence de foyer parenchymateux organisé visible.  
Pas dépanchement pleural.  
Pas d'anomalie de la silhouette cardio-médiastinale.  
Pas d'anomalie évidente du cadre osseux

Dr Mustapha NAJI  
Omnipraticien  
Ancien Médecin  
des ~~��~~ Militaires  
Lissasta Extension n° 353 - Casablanca  
Tél 0522 55 00 06

## RAPPORT PATIENT




Médecin	Organisation	Date	Système
Dr. NAJI MUSTAPHA		23-06-2022 14:46	v3.2.4466 236

## DONNEES PATIENT

Nom	Prénom	Identifiant patient	Date de naissance	Age
dekkar	sakina		01-01-1971	51
Genre	Taille	Poids	IMC	SBP (mmHg)
Femme	166 cm	80 kg	29	120

## SCORE PIEDS

## SCORE MAINS



## HISTORIQUE CONDUCTANCES - SCORE PIEDS

Affichage indisponible

## HISTORIQUE CONDUCTANCES - SCORE MAINS

Affichage indisponible

## CONCLUSION

L'examen montre que les niveaux de conductance cutanée (mesurés en microSiemens) sont normaux. Ces résultats indiquent une fonction sudorale normale dans les mains et les pieds. Il est conseillé de prévoir un nouveau test SUDOSCAN dans 12 mois. Aucun examen supplémentaire n'est requis. Il est conseillé de réaliser des bilans de santé réguliers si jugés nécessaires.

## COMMENTAIRES

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce rapport propose une mesure objective et quantitative de la fonction sudorale. L'évaluation de la fonction végétative nerveuse périphérique complète l'examen du patient. Le diagnostic clinique est évidemment fait par le médecin en fonction de toutes les informations disponibles.

signature / tampon

RAPPORT MEDECIN  
(Dr. NAJI MUSTAPHA)


Médecin	Organisation	Date	Système
Dr. NAJI MUSTAPHA		23-06-2022 14:46	v3.2.4466 236

## DONNEES PATIENT


Nom	Prénom	Identifiant patient	Date de naissance	Age
dekkar	sakina		01-01-1971	51
Genre	Taille	Poids	IMC	SBP (mmHg)
Femme	166 cm	80 kg	29	120

## SCORE PIEDS

## CONDUCTANCE ET ASYMETRIE



## CONDUCTANCES GAUCHE ET DROITE




## HISTORIQUE CONDUCTANCES

Affichage indisponible


0 - 50 μS : Fonction sudorale sévèrement altérée  
50 - 70 μS : Fonction sudorale modérément altérée  
70 - 100 μS : Fonction sudorale normale

## SCORE MAINS

## CONDUCTANCE ET ASYMETRIE



## CONDUCTANCES GAUCHE ET DROITE



## HISTORIQUE CONDUCTANCES

Affichage indisponible

0 - 40 μS : Fonction sudorale sévèrement altérée  
40 - 60 μS : Fonction sudorale modérément altérée  
60 - 100 μS : Fonction sudorale normale

## CONCLUSION

L'examen montre que les niveaux de conductance cutanée (mesurés en microSiemens) sont normaux. Ces résultats indiquent une fonction sudorale normale dans les mains et les pieds. Il est conseillé de prévoir un nouveau test SUDOSCAN dans 12 mois. Aucun examen supplémentaire n'est requis. Il est conseillé de réaliser des bilans de santé réguliers si jugés nécessaires.