

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5.2.265

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HARWAL NAZIFISSA Vve CHATOUNI Ned

Date de naissance : 1953

Adresse : 23 Résidence ERAC N°13 MAY EL AULFA CASA

Tél. : 0663635349

Total des frais engagés : 17714,50 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 17 MAI 2022

Nom et prénom du malade : Mme HARWAL NAZIFISSA

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : HTA, DSD, diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 17 MAI 2022

Signature de l'adhérent(e) :

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
	C	+ 2	300 Dhs	<i>Dr. Soualy M. Docteur SOUALY . M Cardiologue N° 10 , Avenue Sidi Abdesslam Bab Diwanat N° 10 - 1er Etage H. Hassan Casablanca - Tel : 0622 91 31 31</i>
17 MAI 2022	E(6)			

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Pharmacie SIDI HASSAN</i>	17.05.22	1074,50

### ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				<input type="text"/>
<img alt="Diagram of upper and lower dental arches with numbered teeth from 1 to 8. Arrows point to specific teeth: H points to upper central incisors; G points to				

**Docteur M. SOUALY**

**Cardiologue**

Diplômée de la Faculté de Paris



**الدكتورة م. اسوالي**

اختصاصية في أمراض القلب

خريجة جامعة باريس

Echo - doppler Cardiaque - Holter TA - Holter Rythmique - ECG Effort

Casablanca, le

17/05/2022

M → HARWATC NNU FISSat

185, 2 x 3

Sur le site 160 - 150

ST, 80 x 3

100

14

100

150

87, 50 x 3

Sur le site 150

100

14

100

200

14

100

14

27, 70 x 3

Sur le site 150

100

14

100

150

14

15, 00 x 6

Sur le site 850 - 14 x 24

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

# LIXIFOR

## COMPOSIT

- Séné .....
- Radis Noir
- Anis Etoilé
- Cascara ....

Lot/A consommer  
de préférence avant fi

XI018 0425

LOT PER

Prix

99.00



3 700221 339503

## PROPRIETES :

LIXIFOR Actif dès le premier jour spécialement formulé

- Régulation du volume et de la fréquence des selles
- Réduction des gaz
- Ballonnements et pesanteur abdominale
- Active le péristaltisme
- Améliore le transit intestinal
- Stimule le transit intestinal
- Combat les flatulences
- Favorise un transit intestinal régulier

Lot/A conser-  
ver de préfér-

XI017 0425

17MA

LOT PER

Prix

99.00



3 700221 339503

## CONSEILS D'UTILISATION

- 1 gélule par jour

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas administrer aux entrants de moins de 12 ans.
- Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent

Conserver dans un endroit sec et frais.

Produit d'origine animale, sans gluten, sans gélatine.

l'absorption de boissons alcoolisées.

#### **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Informez votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez l'intention de prendre d'autres médicaments, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la ritodrine, du paracétamol ou de l'ibuprofène, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contre-indication contre les médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

#### **GROSSESSE ET ALLAITEMENT**

##### **Grossesse**

En cas de grossesse, le traitement du diabète fait nécessairement appel à l'insuline. Informez votre médecin ou à votre pharmacien si vous découvrez une grossesse alors que vous prenez ce médicament et demandez-lui de modifier votre traitement pour de l'insuline.

Prévenez votre médecin traitant qui se chargera de modifier votre traitement.

En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament.

##### **Allaitement**

Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Ce médicament utilisé seul n'entraîne pas d'hypoglycémie importante qui peut entraîner la conduite des véhicules ou à utiliser des machines.

Par contre, en association avec d'autres antidiabétiques (sulfonylure, repaglinide), il convient d'attirer l'attention sur les risques d'hypoglycémie.

#### **EFFETS SECONDAIRES**

Comme tous les médicaments, DIAFORMINE 850 mg peut entraîner des effets indésirables.

Au début du traitement, quelques troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés dans l'estomac vides (généralement passagers (une dizaine de jours) et réduits au bout de 10 à 14 jours).

Si ces troubles persistent, arrêtez ce médicament et consultez votre médecin.

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales, de nausées, accompagnées de crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Il peut s'agir d'une acidose lactique.

Arrêtez aussitôt ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

#### **SURDOSAGE**

Si vous avez pris plus de DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

#### **CONSERVATION**

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

#### **Tableau A (Liste I)**



bottu s.a.

82, Allée des Casuarinas - Aïn Sebâa - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

l'absorption de boissons alcoolisées.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Informez votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la ritodrine, du paracétamol ou de l'ibuprofène, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contrôle de la pression artérielle, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

##### Grossesse

En cas de grossesse, le traitement du diabète fait nécessairement appel à l'insuline. Informez votre médecin ou à votre pharmacien si vous découvrez une grossesse alors que vous prenez ce médicament et demandez-lui de modifier votre traitement pour de l'insuline.

Prévenez votre médecin traitant qui se chargera de modifier votre traitement.

En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament.

##### Allaitement

Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament utilisé seul n'entraîne pas d'hypoglycémie et ne nécessite pas de surveillance lors de la conduite des véhicules ou à utiliser des machines.

Par contre, en association avec d'autres antidiabétiques (sulfonylureas, repaglinide), il convient d'attirer l'attention sur les risques d'hypoglycémie.

#### EFFETS SECONDAIRES

Comme tous les médicaments, DIAFORMINE 850 mg peut entraîner des effets indésirables.

Au début du traitement, quelques troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés au lieu de mordre ou de mastiquer peuvent être temporaires et généralement passagers (une dizaine de jours) et réduits par l'absorption lentement au début du repas.

Si ces troubles persistent, arrêtez ce médicament et consultez votre médecin.

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales, de nausées, de crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Il peut s'agir d'une acidose lactique.

Arrêtez aussitôt ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

#### SURDOSAGE

Si vous avez pris plus de DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous auriez dû : arrêtez le traitement et consultez immédiatement votre médecin.

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

#### CONSERVATION

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

#### Tableau A (Liste I)



bottu s.a.

82, Allée des Casuarinas - Aïn Sebâa - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

l'absorption de boissons alcoolisées.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Informez votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez l'intention de prendre d'autres médicaments, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la ritodrine, du paracétamol ou de l'ibuprofène, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contre-indication contre les médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

##### Grossesse

En cas de grossesse, le traitement du diabète fait nécessairement appel à l'insuline. Informez votre médecin ou à votre pharmacien si vous découvrez une grossesse alors que vous prenez ce médicament et demandez-lui de modifier votre traitement pour de l'insuline.

Prévenez votre médecin traitant qui se chargera de modifier votre traitement.

En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament.

##### Allaitement

Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament utilisé seul n'entraîne pas d'hypoglycémie et ne nécessite pas de surveillance lors de la conduite des véhicules ou à utiliser des machines.

Par contre, en association avec d'autres antidiabétiques (sulfonylureas, repaglinide), il convient d'attirer l'attention sur les risques d'hypoglycémie.

#### EFFETS SECONDAIRES

Comme tous les médicaments, DIAFORMINE 850 mg peut entraîner des effets indésirables.

Au début du traitement, quelques troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés dans l'estomac peuvent être temporaires et généralement passagers (une dizaine de jours) et réduits par l'absorption avec de l'eau ou du jus de fruit au lieu d'un repas.

Si ces troubles persistent, arrêtez ce médicament et consultez votre médecin.

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales, de nausées, de crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Il peut s'agir d'une acidose lactique.

Arrêtez aussitôt ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

#### SURDOSAGE

Si vous avez pris plus de DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous auriez dû : arrêtez le traitement et consultez immédiatement votre médecin.

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

#### CONSERVATION

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

#### Tableau A (Liste I)



bottu s.a.

82, Allée des Casuarinas - Aïn Sebâa - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

l'absorption de boissons alcoolisées.

#### **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Informez votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez l'intention de prendre d'autres médicaments, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la ritodrine, du paracétamol ou de l'ibuprofène, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contre-indication contre les médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

#### **GROSSESSE ET ALLAITEMENT**

##### **Grossesse**

En cas de grossesse, le traitement du diabète fait nécessairement appel à l'insuline. Informez votre médecin ou à votre pharmacien si vous découvrez une grossesse alors que vous prenez ce médicament et demandez-lui de modifier votre traitement pour de l'insuline.

Prévenez votre médecin traitant qui se chargera de modifier votre traitement.

En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament.

##### **Allaitement**

Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Ce médicament utilisé seul n'entraîne pas d'hypoglycémie importante qui peut entraîner la conduite des véhicules ou à utiliser des machines.

Par contre, en association avec d'autres antidiabétiques (sulfonylure, repaglinide), il convient d'attirer l'attention sur les risques d'hypoglycémie.

#### **EFFETS SECONDAIRES**

Comme tous les médicaments, DIAFORMINE 850 mg peut entraîner des effets indésirables.

Au début du traitement, quelques troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés dans l'estomac vides (généralement passagers (une dizaine de jours) et réduits au bout de 10 à 14 jours).

Si ces troubles persistent, arrêtez ce médicament et consultez votre médecin.

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales, de nausées, accompagnées de crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Il peut s'agir d'une acidose lactique.

Arrêtez aussitôt ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

#### **SURDOSAGE**

Si vous avez pris plus de DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

#### **CONSERVATION**

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

#### **Tableau A (Liste I)**



bottu s.a.

82, Allée des Casuarinas - Aïn Sebâa - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

l'absorption de boissons alcoolisées.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Informez votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez l'intention de prendre d'autres médicaments, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la ritodrine, du paracétamol ou de l'ibuprofène, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contre-indication contre les médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

##### Grossesse

En cas de grossesse, le traitement du diabète fait nécessairement appel à l'insuline. Informez votre médecin ou à votre pharmacien si vous découvrez une grossesse alors que vous prenez ce médicament et demandez-lui de modifier votre traitement pour de l'insuline.

Prévenez votre médecin traitant qui se chargera de modifier votre traitement.

En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament.

##### Allaitement

Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament utilisé seul n'entraîne pas d'hypoglycémie et ne nécessite pas de surveillance lors de la conduite des véhicules ou à utiliser des machines.

Par contre, en association avec d'autres antidiabétiques (sulfonylureas, repaglinide), il convient d'attirer l'attention sur les risques d'hypoglycémie.

#### EFFETS SECONDAIRES

Comme tous les médicaments, DIAFORMINE 850 mg peut entraîner des effets indésirables.

Au début du traitement, quelques troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés dans l'estomac peuvent être temporaires et généralement passagers (une dizaine de jours) et réduits par l'absorption avec de l'eau ou du jus de fruit au lieu d'un repas.

Si ces troubles persistent, arrêtez ce médicament et consultez votre médecin.

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales, de nausées, de crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Il peut s'agir d'une acidose lactique.

Arrêtez aussitôt ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

#### SURDOSAGE

Si vous avez pris plus de DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous auriez dû : arrêtez le traitement et consultez immédiatement votre médecin.

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

#### CONSERVATION

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

#### Tableau A (Liste I)



bottu s.a.

82, Allée des Casuarinas - Aïn Sebâa - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

l'absorption de boissons alcoolisées.

#### **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Informez votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez l'intention de prendre d'autres médicaments, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la ritodrine, du paracétamol ou de l'ibuprofène, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contre-indication contre les médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

#### **GROSSESSE ET ALLAITEMENT**

##### **Grossesse**

En cas de grossesse, le traitement du diabète fait nécessairement appel à l'insuline. Informez votre médecin ou à votre pharmacien si vous découvrez une grossesse alors que vous prenez ce médicament et demandez-lui de modifier votre traitement pour de l'insuline.

Prévenez votre médecin traitant qui se chargera de modifier votre traitement.

En cas de désir de grossesse, prévenez votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament.

##### **Allaitement**

Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Ce médicament utilisé seul n'entraîne pas d'hypoglycémie importante qui peut entraîner la conduite des véhicules ou à utiliser des machines.

Par contre, en association avec d'autres antidiabétiques (sulfonylure, repaglinide), il convient d'attirer l'attention sur les risques d'hypoglycémie.

#### **EFFETS SECONDAIRES**

Comme tous les médicaments, DIAFORMINE 850 mg peut entraîner des effets indésirables.

Au début du traitement, quelques troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées) surtout si les comprimés sont absorbés dans l'estomac vides (généralement passagers (une dizaine de jours) et réduits au bout de 10 à 14 jours).

Si ces troubles persistent, arrêtez ce médicament et consultez votre médecin.

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales, de nausées, accompagnées de crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Il peut s'agir d'une acidose lactique.

Arrêtez aussitôt ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

#### **SURDOSAGE**

Si vous avez pris plus de DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé que vous auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DIAFORMINE 850 mg, comprimé pelliculé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

#### **CONSERVATION**

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

#### **Tableau A (Liste I)**



bottu s.a.

82, Allée des Casuarinas - Aïn Sebâa - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous rementionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Cardioaspirine 100 mg/30cps  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.



# CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

## Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous rementionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Cardioaspirine 100 mg/30cps  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.



# CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

## Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous rementionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Cardioaspirine 100 mg/30cps  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.



# CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

## Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le

# s de 14, 28 et 56 odipine

ce médicament car elle contient des informations importantes

pharmacien,  
ennes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont  
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 3- COMMENT Instructions p Veillez à toujours Posologie, Me

### Posologie, Fr

- La dose usuelle
- Patients âgés :
  - Ne pas dépasser

### Selon la mani

#### Mode et voie :

- Prenez ce médicament
- Avelez les comprimés
- Vous pouvez prendre

### Symptômes et

Un surdosage avec tachycardie.  
Si vous avez pris

### Conduite à tenir

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

- Prenez dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel. Si le moment de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.
- Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.  
**Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage**

Si vous arrêtez de prendre SULIAT® comprimés :

- L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.
- N'arrêtez pas votre traitement sauf avis contraire de votre médecin.

185, 20

## 4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate:

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000). Si vous présentez l'un de ces effets, prévenez immédiatement votre médecin:

Réaction allergique avec des symptômes tels que: éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament:

-Fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grippe ; nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler ; maux de tête ; gonflement des bras, des mains, des jambes, des cheveux ou des pieds ; fatigue ; asthénie (faiblesse) ; rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.

-Peu fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : sensations vertigineuses ; nausées et douleur abdominale ; sécheresse de la bouche ; somnolence, picotements ou engourdissement des mains ou des pieds ; vertige ; accélération des battements du cœur, y compris palpitations ; sensations vertigineuses au passage en position debout ; toux ; diarrhée ; constipation ; éruption cutanée, rougeur de la peau ; gonflement des articulations, mal de dos ; douleurs articulaires.

-Rare (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : sensation d'anxiété ; bouffonneries dans les oreilles (acouphènes) ; événouissement ; envies d'uriner plus fréquentes que la normale ou impression de plus grande urgence à uriner ; impossibilité d'avoir ou de maintenir une érection ; sensation de lourdeur ; tension artérielle basse avec des symptômes tels que sensations vertigineuses, sensation de tête vide ; transpiration excessive ; éruption cutanée sur tout le corps ; démangeaisons ; spasmes musculaires.

Si vous présentez un de ces effets sous une forme sévère, veuillez-en informer votre médecin.

Effets indésirables rapportés avec l'amlodipine seule ou le valsartan seul et qui sont soit non observés avec l'association fixe valsartan/amlodipine soit observés plus fréquemment qu'avec valsartan/amlodipine:

### Amlodipine

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, sévères et très rares après la prise de ce

ouvrage de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.  
du traitement

otre dose.

poser une dose plus forte ou plus faible.

ou du jus de pommeousse.

rtigineuses, une vasodilatation périphérique et peut être une crise.

# s de 14, 28 et 56 odipine

ce médicament car elle contient des informations importantes

pharmacien,  
ennes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont  
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 3- COMMENT Instructions p Veillez à toujours Posologie, Me

### Posologie, Fr

- La dose usuelle
- Patients âgés :
  - Ne pas dépasser

### Selon la mani

#### Mode et voie :

- Prenez ce médicament
- Avelez les comprimés
- Vous pouvez prendre

### Symptômes et

Un surdosage avec tachycardie.  
Si vous avez pris

### Conduite à tenir

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

- Prenez dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel. Si le moment de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.
- Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

### Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre SULIAT® comprimés :

- L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.
- N'arrêtez pas votre traitement sauf avis contraire de votre médecin.

185, 20

ouvrage de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.  
du traitement

otre dose.

poser une dose plus forte ou plus faible.

ou du jus de pommeousse.

tigineuses, une vasodilatation périphérique et peut être une crise.

## 4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

### Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate:

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000). Si vous présentez l'un de ces effets, prévenez immédiatement votre médecin:

Réaction allergique avec des symptômes tels que: éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

### Autres effets indésirables possibles de ce médicament:

-Fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grippe ; nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler ; maux de tête ; gonflement des bras, des mains, des jambes, des cheveux ou des pieds ; fatigue ; asthénie (faiblesse) ; rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.

-Peu fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : sensations vertigineuses ; nausées et douleur abdominale ; sécheresse de la bouche ; somnolence, picotements ou engourdissement des mains ou des pieds ; vertige ; accélération des battements du cœur, y compris palpitations ; sensations vertigineuses au passage en position debout ; toux ; diarrhée ; constipation ; éruption cutanée, rougeur de la peau ; gonflement des articulations, mal de dos ; douleurs articulaires.

-Rare (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : sensation d'anxiété ; bouffonneries dans les oreilles (acouphènes) ; événouissement ; envies d'uriner plus fréquentes que la normale ou impression de plus grande urgence à uriner ; impossibilité d'avoir ou de maintenir une érection ; sensation de lourdeur ; tension artérielle basse avec des symptômes tels que sensations vertigineuses, sensation de tête vide ; transpiration excessive ; éruption cutanée sur tout le corps ; démangeaisons ; spasmes musculaires.

Si vous présentez un de ces effets sous une forme sévère, veuillez-en informer votre médecin.

Effets indésirables rapportés avec l'amlodipine seule ou le valsartan seul et qui sont soit non observés avec l'association fixe valsartan/amlodipine soit observés plus fréquemment qu'avec valsartan/amlodipine:

### Amlodipine

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, sévères et très rares après la prise de ce

substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de

les vaisseaux sanguins de se rétrécir.

L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement du vaisseau en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

Le valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle

est abaissée dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par

SULIAT® ?

composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez

être en surpoids.

# s de 14, 28 et 56 odipine

ce médicament car elle contient des informations importantes

pharmacien,  
ennes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont  
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 3- COMMENT Instructions p Veillez à toujours Posologie, Me

### Posologie, Fr

- La dose usuelle
- Patients âgés :
  - Ne pas dépasser

### Selon la mani

#### Mode et voie :

- Prenez ce médicament
- Avelez les comprimés
- Vous pouvez prendre

### Symptômes et

Un surdosage avec tachycardie.  
Si vous avez pris

### Conduite à tenir

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

- Prenez dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel. Si le moment de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.
- Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.  
**Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage**

Si vous arrêtez de prendre SULIAT® comprimés :

- L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.
- N'arrêtez pas votre traitement sauf avis contraire de votre médecin.

185, 20

## 4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate:

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000). Si vous présentez l'un de ces effets, prévenez immédiatement votre médecin:

Réaction allergique avec des symptômes tels que: éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament:

-Fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grippe ; nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler ; maux de tête ; gonflement des bras, des mains, des jambes, des cheveux ou des pieds ; fatigue ; asthénie (faiblesse) ; rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.

-Peu fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : sensations vertigineuses ; nausées et douleur abdominale ; sécheresse de la bouche ; somnolence, picotements ou engourdissement des mains ou des pieds ; vertige ; accélération des battements du cœur, y compris palpitations ; sensations vertigineuses au passage en position debout ; toux ; diarrhée ; constipation ; éruption cutanée, rougeur de la peau ; gonflement des articulations, mal de dos ; douleurs articulaires.

-Rare (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : sensation d'anxiété ; bouffonneries dans les oreilles (acouphènes) ; événouissement ; envies d'uriner plus fréquentes que la normale ou impression de plus grande urgence à uriner ; impossibilité d'avoir ou de maintenir une érection ; sensation de lourdeur ; tension artérielle basse avec des symptômes tels que sensations vertigineuses, sensation de tête vide ; transpiration excessive ; éruption cutanée sur tout le corps ; démangeaisons ; spasmes musculaires.

Si vous présentez un de ces effets sous une forme sévère, veuillez-en informer votre médecin.

Effets indésirables rapportés avec l'amlodipine seule ou le valsartan seul et qui sont soit non observés avec l'association fixe valsartan/amlodipine soit observés plus fréquemment qu'avec valsartan/amlodipine:

### Amlodipine

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, sévères et très rares après la prise de ce

ouvrage de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.  
du traitement

otre dose.

poser une dose plus forte ou plus faible.

ou du jus de pommeousse.

tigineuses, une vasodilatation périphérique et peut être une crise.

# NEBILET® 5 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

## NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

***La substance active est :***

Nébivolol ..... 5,00 mg  
 Sous forme de chlorhydrate de nébivolol ..... 5,45 mg  
 pour un comprimé quadrisécable

***Les autres composants sont :***

Polysorbate 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

## 1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

**ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

(un médicam-

traî-

Mé

l'es

par

être

repa

L'utili

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## \* VIGNETTE

NEBILET® 5mg  
 28 comprimés O  
 PPV 87DH50

ilisé dans le

d'acidité dans  
 (ent antiacide),  
 ET 5 mg doit  
 cide entre les

..... ces médicaments est généralement  
 déconseillée sous traitement par nébivolol sauf  
 avis contraire de votre médecin.

## 3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable ?

### *Hypertension*

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

### *Insuffisance cardiaque chronique stable*

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (environ 1/4 de

# NEBILET® 5 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

## NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

***La substance active est :***

Nébivolol ..... 5,00 mg  
 Sous forme de chlorhydrate de nébivolol ..... 5,45 mg  
 pour un comprimé quadrisécable

***Les autres composants sont :***

Polysorbate 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

## 1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

**ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

(un médicam-

traî-

Mé

l'es

par

être

repa

L'utili

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## \* VIGNETTE

NEBILET® 5mg  
 28 comprimés O  
 PPV 87DH50

ilisé dans le

d'acidité dans  
 (ent antiacide),  
 ET 5 mg doit  
 cide entre les

..... ces médicaments est généralement  
 déconseillée sous traitement par nébivolol sauf  
 avis contraire de votre médecin.

## 3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable ?

### **Hypertension**

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

### **Insuffisance cardiaque chronique stable**

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (environ 1/4 de

# NEBILET® 5 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

## NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

***La substance active est :***

Nébivolol ..... 5,00 mg  
 Sous forme de chlorhydrate de nébivolol ..... 5,45 mg  
 pour un comprimé quadrisécable

***Les autres composants sont :***

Polysorbate 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

## 1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

**ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

(un médicam-

traî-

Mé

l'es

par

être

repa

L'utili

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## \* VIGNETTE

NEBILET® 5mg  
 28 comprimés O  
 PPV 87DH50

ilisé dans le

d'acidité dans  
 (ent antiacide),  
 ET 5 mg doit  
 cide entre les

..... ces médicaments est généralement  
 déconseillée sous traitement par nébivolol sauf  
 avis contraire de votre médecin.

## 3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable ?

### ***Hypertension***

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

### ***Insuffisance cardiaque chronique stable***

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (environ 1/4 de

# LD-NOR®

## 10 mg, 20 mg & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI: Atorvastatine)

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LD-NOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver LD-NOR, comprimé pelliculé?
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE LD-NOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

LD-NOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

LD-NOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, LD-NOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Ne prenez jamais LD-NOR, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à l'atorvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique Informations supplémentaires,
- si vous avez ou avez eu une maladie du foie,
- si vous avez eu des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexplicables,
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable,
- si vous êtes enceinte ou essayez de l'être,
- si vous allaitez,
- si vous utilisez l'association glécaprévir/pibrentasvir dans le traitement de l'hépatite C.

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé.

- si vous avez une insuffisance respiratoire sévère,
- si vous prenez ou avez pris au cours des 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique, (médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes) par voie orale ou injectable. L'association de l'acide fusidique et de LD-NOR peut provoquer des problèmes musculaires graves (rhabdomyolyse),
- si vous avez précédemment eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou si

### 3. COMMENT PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol, que vous devrez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR. La posologie initiale habituelle de LD-NOR est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie dont vous avez besoin. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalles d'au moins 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg une fois par jour.

Les comprimés de LD-NOR doivent être avalés entiers avec un verre d'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez cependant de prendre votre comprimé tous les jours à la même heure.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**La durée du traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé est déterminée par votre médecin.**

Si vous pensez que l'effet de LD-NOR est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin.

**Si vous avez pris plus de LD-NOR, comprimé pelliculé que vous n'aurez dû**

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de LD-NOR que vous n'aurez dû (plus que votre dose quotidienne habituelle), consultez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital le plus proche.

Si vous o

Si vous

normal

Si voi

Sans c

Si voi

trai

LOT : 220041

EXP : 03/2025

PPV : 57,80DH

4. QU'

Com

survie

Si voi

vos c

l'hôp

Rare

- Réa

provoqué

- Pathologie sévère avec pelade et gonflement graves de la peau, cloques sur la peau, dans la bouche, sur la zone génitale et autour des yeux et une fièvre. Eruption cutanée de taches roses-rouges, particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds, qui peuvent former des cloques.

- Faiblesse musculaire, sensibilité douloureuse, douleur ou rupture musculaire, coloration rouge-brun de l'urine associées à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant être causées par une atteinte musculaire anormale (rhabdomyolyse). La dégradation anormale des muscles ne disparaît pas toujours, même après l'arrêt de l'atorvastatine, et peut engager le pronostic vital et entraîner des problèmes aux reins.

**Très rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000**

- La présence inattendue ou inhabituelle de saignements ou d'hématomates peut être le signe d'anomalies du fonctionnement de votre foie. Dans ce cas, consultez votre médecin dès que possible.

- Syndrome lipoïde (incluant éruption cutanée, troubles articulaires et effets sur les cellules sanguines).

#### Autres effets indésirables éventuels de LD-NOR

**Frequent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10**

- inflammation des cavités nasales, maux de gorge, saignement de nez,
- réactions allergiques,
- augmentation du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, continuez à surveiller attentivement votre glycémie), augmentation du taux de créatine phosphokinase dans le sang,
- maux de tête,
- nausées, constipation, fatigue, mal de tête.

# LD-NOR®

## 10 mg, 20 mg & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI: Atorvastatine)

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LD-NOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver LD-NOR, comprimé pelliculé?
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE LD-NOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

LD-NOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

LD-NOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, LD-NOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Ne prenez jamais LD-NOR, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à l'atorvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique Informations supplémentaires,
- si vous avez ou avez eu une maladie du foie,
- si vous avez eu des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexplicables,
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable,
- si vous êtes enceinte ou essayez de l'être,
- si vous allaitez,
- si vous utilisez l'association glécaprévir/pibrentasvir dans le traitement de l'hépatite C.

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé.

- si vous avez une insuffisance respiratoire sévère,
- si vous prenez ou avez pris au cours des 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique, (médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes) par voie orale ou injectable. L'association de l'acide fusidique et de LD-NOR peut provoquer des problèmes musculaires graves (rhabdomyolyse),
- si vous avez précédemment eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou si

### 3. COMMENT PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol, que vous devrez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR. La posologie initiale habituelle de LD-NOR est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie dont vous avez besoin. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalles d'au moins 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg une fois par jour.

Les comprimés de LD-NOR doivent être avalés entiers avec un verre d'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez cependant de prendre votre comprimé tous les jours à la même heure.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**La durée du traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé est déterminée par votre médecin.**

Si vous pensez que l'effet de LD-NOR est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin.

**Si vous avez pris plus de LD-NOR, comprimé pelliculé que vous n'aurez dû**

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de LD-NOR que vous n'aurez dû (plus que votre dose quotidienne habituelle), consultez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital le plus proche.

Si vous o

Si vous

normal

Si voi

Sans c

Si voi

trai

LOT : 220041

EXP : 03/2025

PPV : 57,80DH

### 4. QU'EST-CE QU'UN COMPLÉMENT ALIMENTAIRE?

Complé

survie

Si voi

vos c

l'hôp

Rare

- Réal

provoquer

un r

- Pathologie sévère avec pelade et gonflement graves de la peau, cloques sur la peau, dans la bouche, sur la zone génitale et autour des yeux et une fièvre. Eruption cutanée de taches roses-rouges, particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds, qui peuvent former des cloques.

- Faiblesse musculaire, sensibilité douloureuse, douleur ou rupture musculaire, coloration rouge-brun de l'urine associées à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant être causées par une atteinte musculaire anormale (rhabdomyolyse). La dégradation anormale des muscles ne disparaît pas toujours, même après l'arrêt de l'atorvastatine, et peut engager le pronostic vital et entraîner des problèmes aux reins.

**Très rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000**

- La présence inattendue ou inhabituelle de saignements ou d'hématomates peut être le signe d'anomalies du fonctionnement de votre foie. Dans ce cas, consultez votre médecin dès que possible.

- Syndrome lipoïde (incluant éruption cutanée, troubles articulaires et effets sur les cellules sanguines).

#### Autres effets indésirables éventuels de LD-NOR

**Fréquent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10**

- inflammation des cavités nasales, maux de gorge, saignement de nez,
- réactions allergiques,
- augmentation du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, continuez à surveiller attentivement votre glycémie), augmentation du taux de créatine phosphokinase dans le sang,
- maux de tête,
- nausées, constipation, fatigue, mal de tête.

# LD-NOR®

## 10 mg, 20 mg & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI: Atorvastatine)

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LD-NOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver LD-NOR, comprimé pelliculé?
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE LD-NOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

LD-NOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

LD-NOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, LD-NOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Ne prenez jamais LD-NOR, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à l'atorvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique Informations supplémentaires,
- si vous avez ou avez eu une maladie du foie,
- si vous avez eu des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexplicables,
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable,
- si vous êtes enceinte ou essayez de l'être,
- si vous allaitez,
- si vous utilisez l'association glécaprévir/pibrentasvir dans le traitement de l'hépatite C.

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé.

- si vous avez une insuffisance respiratoire sévère,
- si vous prenez ou avez pris au cours des 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique, (médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes) par voie orale ou injectable. L'association de l'acide fusidique et de LD-NOR peut provoquer des problèmes musculaires graves (rhabdomyolyse),
- si vous avez précédemment eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou si

### 3. COMMENT PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol, que vous devrez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR. La posologie initiale habituelle de LD-NOR est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie dont vous avez besoin. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalles d'au moins 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg une fois par jour.

Les comprimés de LD-NOR doivent être avalés entiers avec un verre d'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez cependant de prendre votre comprimé tous les jours à la même heure.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**La durée du traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé est déterminée par votre médecin.**

Si vous pensez que l'effet de LD-NOR est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin.

**Si vous avez pris plus de LD-NOR, comprimé pelliculé que vous n'aurez dû**

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de LD-NOR que vous n'aurez dû (plus que votre dose quotidienne habituelle), consultez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital le plus proche.

Si vous o

Si vous

normal

Si voi

Sans c

Si voi

trai

LOT : 220041

EXP : 03/2025

PPV : 57,80DH

### 4. QU'EST-CE QU'UN COMPLÉMENT ALIMENTAIRE?

Complé

survie

Si voi

vos c

l'hôp

Rare

- Réal

provoquer

un r

- Pathologie sévère avec pelade et gonflement graves de la peau, cloques sur la peau, dans la bouche, sur la zone génitale et autour des yeux et une fièvre. Eruption cutanée de taches roses-rouges, particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds, qui peuvent former des cloques.

- Faiblesse musculaire, sensibilité douloureuse, douleur ou rupture musculaire, coloration rouge-brun de l'urine associées à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant être causées par une atteinte musculaire anormale (rhabdomyolyse). La dégradation anormale des muscles ne disparaît pas toujours, même après l'arrêt de l'atorvastatine, et peut engager le pronostic vital et entraîner des problèmes aux reins.

**Très rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000**

- La présence inattendue ou inhabituelle de saignements ou d'hématomates peut être le signe d'anomalies du fonctionnement de votre foie. Dans ce cas, consultez votre médecin dès que possible.

- Syndrome lipoïde (incluant éruption cutanée, troubles articulaires et effets sur les cellules sanguines).

#### Autres effets indésirables éventuels de LD-NOR

**Frequent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10**

- inflammation des cavités nasales, maux de gorge, saignement de nez,
- réactions allergiques,
- augmentation du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, continuez à surveiller attentivement votre glycémie), augmentation du taux de créatine phosphokinase dans le sang,
- maux de tête,
- nausées, constipation, fatigue, mal de tête.



90 mg,

et 300 mg. comprimé

A

LOT  
EXP  
PPV

31.30

3 2 5 9  
2 2 5  
3 1 . 3 0

l'allopurinol et contactez le fabricant.

• Si vous souffrez d'effets indésirables, contactez le fabricant.

Lisez attentivement l'notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si des effets indésirables deviennent graves ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### CONTIENT CETTE NOTICE :

est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?  
elles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?

Comment prendre ZYLORIC comprimés ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver ZYLORIC comprimés ?

Informations supplémentaires.

#### 'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il ralentit la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre corps afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte, certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes

#### QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, nez-le avant de prendre ce médicament.

Nez jamais ZYLORIC, comprimé :

Si d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit n'êtes pas dans la rubrique 6.

Si vous êtes enceinte ou si vous êtes allaitante, nez jamais ZYLORIC, comprimé.

Si vous êtes enceinte, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### ELEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

Nez à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC, comprimé si vous :

• Si vous avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.

• Si vous avez des problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de conversion de l'angiotensine).

• Si vous êtes actuellement atteint d'une crise de goutte.

• Si vous êtes d'origine chinoise, ethnique Han, africaine ou indienne.

• Si vous avez des problèmes de thyroïde.

• Si vous avez une réaction allergique particulière avec ZYLORIC, comprimé.

Des réactions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de ZYLORIC. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent suivies par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, douleurs articulaires (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers l'urticaire (éruption de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau). En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre ZYLORIC, comprimé et contactez votre médecin.

- Antibiotiques (ampicilline)
  - Médicaments utilisés contre l'hypertension
  - Médicaments utilisés contre les maladies de l'appareil digestif
  - Médicaments utilisés contre les maladies cardiovasculaires
  - Médicaments pour empêcher la formation des calculs rénaux comme des IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine)
  - Médicaments utilisés contre les maladies de l'appareil respiratoire
  - Médiator
  - Autre médicament
- Veuillez avertir votre médecin de tous les médicaments que vous prenez récemment pris tout, sans ordonnance, y compris les plantes et les compléments alimentaires.
- Grossesse et allaitement**
- Si vous êtes enceinte, contactez votre médecin. Si vous planifiez une grossesse, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.
- L'utilisation de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement n'a pas été étudiée. En raison du passage dans le lait maternel, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement.

#### CONDUITE DE VÉHICULE

Dans de rares cas, la prise de ZYLORIC, comprimé peut entraîner des vertiges, des étourdissements, des nausées et des vomissements. Si vous conduisez un véhicule, une bicyclette ou une autre machine, ou si vous faites de l'escalade, nez jamais ZYLORIC, comprimé.

#### LISTE DES EXCIPENTS

Si votre médecin vous contactez votre pharmacien, il vous donnera une liste des excipients. L'utilisation de ce médicament peut entraîner une intolérance au galactose, à la fructose ou à la sorbitol. La malabsorption du glucose peut également se produire.

#### 3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé

Veuillez à toujours prendre ZYLORIC, comprimé comme prescrit par votre médecin ou pharmacien. Nez jamais ZYLORIC, comprimé à jeun.

Les comprimés doivent être pris avec de l'eau.

#### Posologie

La posologie recommandée est de 300 mg par jour.

Les posologies recommandées sont les suivantes : Vous commencerez généralement par 300 mg par jour, puis augmenterez progressivement jusqu'à 600 mg par jour.

Si vous êtes âgé(e) ou si vous avez une maladie chronique, votre médecin pourra vous prescrire une dose réduite.

Le médicament sera pris une fois par jour, le matin ou le soir, avec un repas.

Les comprimés doivent être pris avec de l'eau.





90 mg,

et 300 mg. comprimé

A

LOT  
EXP  
PPV

31.30

3 2 5 9  
2 2 5  
3 1 . 3 0

l'allopurinol et contactez le fabricant.

• Si vous souffrez d'effets indésirables, contactez le fabricant.

Lisez attentivement l'notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si des effets indésirables deviennent graves ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### CONTIENT CETTE NOTICE :

est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?  
elles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?

Comment prendre ZYLORIC comprimés ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver ZYLORIC comprimés ?

Informations supplémentaires.

#### 'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il ralentit la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre corps afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte, certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes

#### QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, nez-le avant de prendre ce médicament.

Nez jamais ZYLORIC, comprimé :

Si vous êtes allergique connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.

Si vous êtes enceinte ou si vous êtes allaitante : Si vous êtes enceinte, n'enfantez pas moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique comprimé).

Si vous avez des doutes, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### ELEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

Avisez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC, comprimé si vous :

• Si vous avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.

• Si vous avez des problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

• Si vous êtes actuellement atteint d'une crise de goutte.

• Si vous êtes d'origine chinoise, ethnique Han, africaine ou indienne.

• Si vous avez des problèmes de thyroïde.

• Si vous avez une réaction allergique particulière avec ZYLORIC, comprimé.

Des réactions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de ZYLORIC. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent suivies par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, douleurs articulaires (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers l'urticaire (éruption de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau). En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre ZYLORIC, comprimé et contactez votre médecin.

- Antibiotiques (ampicilline)
  - Médicaments utilisés contre l'hypertension
  - Médicaments utilisés contre les maladies de l'appareil digestif, par exemple les laxatifs
  - Médicaments utilisés contre les maladies de l'appareil respiratoire
  - Médicaments pour empêcher la formation des calculs rénaux comme des IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine)
  - Médicaments utilisés pour empêcher la formation des calculs rénaux
  - Toute autre médication
- Veuillez avertir votre médecin de toute médication que vous avez récemment pris tout, sans ordonnance, y compris les vitamines et les minéraux.
- Grossesse et allaitement**  
Si vous êtes enceinte, n'enfantez pas moins de 6 mois. Si vous planifiez une grossesse, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.
- L'utilisation de ce médicament pendant la grossesse**  
En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

#### CONDUITE DE VÉHICULE

Dans de rares cas, la prise de ZYLORIC, comprimé peut entraîner des étourdissements, des vertiges, des nausées et des étourdissements. Ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines si vous avez ces symptômes.

#### LISTE DES EXCIPIENTS

Si votre médecin vous contactez votre pharmacien ou infirmier/ère pour vous donner des informations supplémentaires, il vous conseille de prendre ce médicament. L'utilisation de ce médicament peut entraîner une intolérance au galactose, une malabsorption du glucose et du fructose.

#### 3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC

Veuillez à toujours prendre ce médicament comme prescrit par votre médecin ou pharmacien. Ne prenez pas plus de ce que votre médecin vous a prescrit.

Les comprimés doivent être pris avec de l'eau.

#### Posologie

La posologie recommandée est de 300 mg par jour.

Les posologies recommandées sont les suivantes : Vous commencerez généralement par 300 mg par jour, puis augmenterez progressivement jusqu'à 600 mg par jour.

Si vous êtes âgé(e) ou si vous avez une maladie chronique, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible. Les prises du médicament doivent être effectuées tous les jours, une fois par semaine, votre médecin devra être pris immédiatement.

**Utilisation chez les enfants et les adolescents**  
Les posologies habituelles sont les suivantes : 300 mg par jour.

#### Mode et voie d'administration

Le mode d'administration est la voie orale.

Les comprimés doivent être pris avec de l'eau.