

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2824

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : TAHRI JouTei Naïma

Date de naissance : 05 Avril 1952

Adresse : 518 Hadj Fateh La ouffa casa

Tél. : 0632 300367

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Mounir CHAFIT Chirurgien Urologue  
6ème étage Appart. 88  
Tél. 02 48 40 50 88 Fax 022 48 40 88  
Urgence 061 20 82 14 Casablanca

Date de consultation : 25/05/2022

Nom et prénom du malade : TAHRI JouTei Naïma Age : 69 ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection Molaigia

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

TAHRI

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/05/2022	Canal	30000		
27/05/2022	ACTS	11000		

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	25533412	21433552	MONTANTS DES SOINS
D		00000000	00000000	
		00000000	00000000	
		35533411	11433553	
B				
[Création, remont, adjonction]	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			
				DATE DU DEVIS
DATE DE L'EXECUTION				
				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**CABINET  
D'UROLOGIE**



عيادة جراحية  
المسالك البولية

Dr. Mounir CHARIF  
CHEFCHAOUNI  
Chirurgien Urologue  
Ancien Professeur Assistant  
au C.H.U. IBN SINA  
De Rabat  
Ancien Chef de Clinique  
du Groupe Hospitalier  
COCHIN De Paris  
Membre de L'Association  
Française d'Urologie et  
de l'European Association  
of Urology

الدكتور منير شريف  
شفشاوني  
اختصاصي في أمراض  
وجراحة المسالك البولية  
أستاذ مساعد سابقاً بالمركز  
الصحي الجامعي ابن سينا  
باليهاد وكورشان بباريز  
عضو بالجمعية الفرنسية  
لأمراض المسالك البولية

- Urologie Générale / Circoncision
- Coeliochirurgie
- Chirurgie des Troubles de la Statique pelvipérinéale et de l'incontinence Urinaire chez la femme
- Cancérologie Urologique
- Andrologie (Stérilité masculine et Impuissance - Sexologie)
- Exploration Urodynamique du bas appareil urinaire
- Lithotripsie extra-corporelle
- Echographie prostatique transrectale

Casablanca, le 15/06/2022

**Mme TAHRI JOUTEI Naima 70 ans**

**COLPOTROPHINE CREME**

1 APPLICATION LE SOIR PENDANT 20 JOURS PUIS 1  
APPLICATION 1 SOIR/2, pendant 3 mois

**VECA 5 MG**

1 CP PAR JOUR, pendant 1 mois

Dr Mounir CHARIF CHEFCHAOUNI  
Chirurgien Urologue  
Résid. Parc Lyautey 1 Rond Point S  
Exupery 2ème étage Appt N°11 Casa  
Tél: 0522 48 40 58/88 - Fax: 0522 48 40 88  
Urgence: 06 61 20 82 14

Résidence Parc Lyautey - 1, Rond Point S<sup>1</sup> EXUPERY , Angle Av Hassan II et Rue Allal El Fassi

(en face de parc de la ligue Arabe) 2<sup>o</sup> étage, Appt. n°11 - CASABLANCA

Tél. : 05.22.48.40.58 / 88 - Fax : 05.22.48.40.88 - Urgences : 06.61.208.214 - E-mail : m\_c\_chefchaouni@hotmail.com

**Mounir CHARIF  
CHEFCHAOUNI  
Chirurgien Urologue**

Ancien Professeur Assistant  
au C.H.U. IBN SINA de Rabat  
Ancien Chef de Clinique du Groupe  
Hospitalier COCHIN de Paris  
Membre de L'Association  
Française d'Urologie et  
de l'European Association  
of Urology



الدكتور متير شريف شفشاوني  
اختصاصي في أمراض وجراحة  
المسالك البولية

أستاذ مساعد سابقاً بالمركز الصحي  
الجامعي ابن سينا بالرباط وكوشان بباريز  
عضو بالجمعية الفرنسية والأوروبية  
لأمراض المسالك البولية

Casablanca, le : ..... 27/05/2022

## **COMPTE RENDU D'ECHOGRAPHIE**

**Mme TAHRI JOUTEI Naima**

### **Résultats**

Appareil médical : MINDRAY DC-3. Sonde linéaire 7L4A superficielle de 7 à 10 Mhz  
en Mode B, doppler pulsé, couleur et énergie.

Examen réalisé : ECHOGRAPHIE RENALE ET VESICALE.

Résultats :

- Le rein gauche a des mesures normales. Les contours sont réguliers. L'index cortico-médullaire est respecté. Les cavités rénales ne sont pas dilatées.
- Le rein droit est de taille normale. Les contours sont réguliers. Bonne différenciation cortico-médullaire. Les cavités rénales ne sont pas dilatées.
- Absence de calcul.
- La vessie est pleine. La paroi vésicale est fine et ne présente aucune anomalie.
- Pas de résidu post mictionnel.

Signé : Dr. Mounir C. CHEFCHAOUNI

*Mounir CHARIF CHEFCHAOUNI  
Chirurgien Urologue  
Résid. Parc Lyautey, 1 Rond Point S  
Exupery 2ème étage Appt N°11 Casa  
Tél: 0522 48 40 58/59 - Fax: 0522 48 40 88  
Urgence: 06 61 20 82 14*

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Veca®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Veca®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre Veca®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Veca®, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

#### 1. QU'EST-CE QUE Veca®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicaments urologiques, médicaments de l'incontinence urinaire.

La solifénacine succinate (la substance active de Veca®) appartient à la classe pharmaco-thérapeutique des anticholinergiques. Ces médicaments sont utilisés pour réduire les contractions de la vessie lorsque celle-ci est hyperactive. Ceci vous permettra d'attendre plus longtemps avant de devoir aller aux toilettes et augmentera le volume des urines que peut retenir votre vessie. Veca®, comprimé pelliculé est indiqué dans le traitement des symptômes de la vessie hyperactive (incontinence urinaire). Les symptômes incluent : un besoin pressant et soudain d'uriner sans signe précurseur, des envies fréquentes d'uriner ainsi que des émissions involontaires d'urine sans que vous ayez eu le temps d'aller aux toilettes.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Veca®, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### ~~Ne prenez jamais Veca®, comprimé pelliculé :~~

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous avez des difficultés pour uriner ou si votre vessie ne se vide pas complètement quand vous urinez (rétention urinaire).
- Si vous souffrez d'une affection gastro-intestinale grave (notamment un mégacôlon toxique, complication associée à la rectocolite hémorragique).
- Si vous souffrez d'une maladie des muscles appelée myasthénie, caractérisée par une faiblesse musculaire excessive.
- Si vous souffrez d'une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil, avec perte progressive de la vision (glaucome).
- Si vous êtes hémodialysé.
- Si vous souffrez d'une maladie sévère du foie.
- Si vous souffrez d'une maladie sévère du rein ou d'une maladie modérée du foie et que vous prenez des médicaments susceptibles de ralentir l'élimination de la solifénacine succinate de l'organisme (par exemple le kétocanazole). C'est le cas, votre médecin ou votre pharmacien vous en aura informé.

Prévenez votre médecin avant le début du traitement par Veca®, comprimé pelliculé si vous présentez ou avez déjà présenté l'une des maladies mentionnées ci-dessus.

#### ~~Avertissements et précautions~~

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Veca®, comprimé pelliculé :

- Si votre vessie ne se vide pas complètement quand vous urinez (obstruction des voies urinaires) ou si vous avez des difficultés pour uriner (par exemple faible volume d'urine). Le risque d'accumulation d'urine dans la vessie (rétention urinaire) est alors beaucoup plus élevé.
- Si vous avez une obstruction gastro-intestinale (constipation).
- Si vous avez un risque de ralentissement de la motilité gastro-intestinale (ralentissement de la circulation des matières solides et liquides dans le tube digestif). Si c'est le cas, votre médecin vous en aura informé.
- Si vous souffrez d'une maladie rénale sévère.
- Si vous souffrez d'une maladie modérée du foie.
- Si vous avez une hernie hiatale ou des brûlures d'estomac.
- Si vous avez une atteinte neurologique (neuropathie autonome).

#### ~~Enfants et adolescents~~

Veca®, comprimé pelliculé ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans.

Prévenez votre médecin avant le début du traitement par Veca®, comprimé pelliculé si vous présentez ou avez déjà présenté l'une des maladies mentionnées ci-dessus.

Avant le début du traitement par Veca®, comprimé pelliculé, votre médecin évaluera si votre pollakiurie (envie fréquente d'uriner) a d'autres causes (par exemple une insuffisance cardiaque (capacité

de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein). Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un antibiotique (traitement contre certaines infections bactériennes).

#### **Autres médicaments et Veca®, comprimé pelliculé**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important que vous préveniez votre médecin si vous prenez :

- D'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.
- Des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de Veca®, comprimé pelliculé.
- Des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. Veca®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.
- Des médicaments tels que le kétocanazole, le ritonavir, le neflazin, l'itraconazole, le vérapamil ou le diltiazem, qui ralentissent la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine, car ils peuvent accélérer la dégradation de Veca®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou aggraver une œsophagite (inflammation de l'œsophage).

#### **Veca®, comprimé pelliculé contient du lactose :**

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de l'app ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

#### **Veca®, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons**

Veca®, comprimé pelliculé peut être pris indifféremment pendant ou en dehors des repas.

#### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Il n'est pas recommandé d'utiliser Veca®, comprimé pelliculé pendant la grossesse, sauf nécessité absolue.

N'utilisez pas Veca®, comprimé pelliculé si vous allaitez car la solifénacine succinate pourrait passer dans le lait maternel. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Veca®, comprimé pelliculé peut provoquer une vision trouble et, parfois une somnolence ou une fatigue. Si vous souffrez de l'un de ces effets indésirables, ne conduisez pas et n'utilisez pas de machine.

#### **3. COMMENT PRENDRE Veca®, comprimé pelliculé ?**

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Veuillez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La dose recommandée est de 5 mg par jour, sauf si votre médecin vous demande de prendre 10 mg par jour.

Avez le comprimé en entier avec du liquide. Il peut être pris indifféremment, pendant ou en dehors des repas. Ne pas croquer le comprimé.

#### **Utilisation chez les enfants et adolescents**

Veca® ne doit pas être utilisé chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

#### **Si vous avez pris plus de Veca®, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :**

En cas de prise excessive ou en cas de prise accidentelle par un enfant, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Un surdosage peut se manifester par les symptômes suivants : maux de tête, sécheresse de la bouche, sensations vertigineuses, somnolence et vision trouble, perception de choses qui n'existent pas (hallucinations), excitation importante, convulsions, difficultés à respirer, accélération du rythme cardiaque (tachycardie), accumulation d'urine dans la vessie (rétention urinaire) et dilatation de la pupille (mydriase).

#### **Si vous oubliez de prendre Veca®, comprimé pelliculé :**

Si vous oubliez de prendre un comprimé à l'heure habituelle, prenez-le dès que possible, sauf s'il est déjà l'heure de la prise de la dose suivante. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### **Si vous arrêtez de prendre Veca®, comprimé pelliculé :**

Si vous arrêtez de prendre Veca®, vos symptômes d'hyperactivité vésicale pourraient réapparaître ou s'aggraver. Consultez toujours votre médecin si vous envisagez d'arrêter le traitement. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **4. QUELLES SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous faites un choc allergique, ou une réaction cutanée sévère (par exemple décollement de la peau et formation de bulles), vous devez en informer votre médecin ou votre pharmacien immédiatement.

Un angioédème (réaction allergique cutanée qui se traduit par un gonflement survenant dans le tissu juste sous la surface de la peau) avec obstruction des voies respiratoires (difficulté à respirer) a été rapporté chez quelques patients traités par solifénacine

succinate. En cas de survenue d'un angioédème, la solifénacine succinate doit être immédiatement arrêté et un traitement et/ou des mesures appropriées doivent être pris.

Veca®, comprimé pelliculé peut provoquer les autres effets indésirables suivants :

#### **Très fréquents (peut affecter plus de 1 personne sur 10)**

- Sécheresse de la bouche.

#### **Fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)**

- Vision trouble.

- Constipation, nausées, indigestion avec des symptômes tels que lourdeur abdominale, douleur abdominale, régurgitations, nausées et brûlures d'estomac (dyspepsie), gêne au niveau de l'estomac.

#### **Peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)**

- Infection urinaire, infection de la vessie.

- Somnolence.

- Perturbation du goût (dysgueusie).

- Sécheresse (irritation) des yeux.

- Sécheresse du nez.

- Reflux gastro-œsophagien.

- Sécheresse de la gorge.

- Sécheresse de la peau.

- Difficultés pour uriner.

- Fatigue.

- Accumulation de liquide dans les jambes (œdème).

#### **Rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)**

- Accumulation d'une grande quantité de matières fécales dans le gros intestin (fécalome).

- Accumulation d'urine dans la vessie par impossibilité de vider la vessie (rétenzione urinaire).

- Sensations vertigineuses, maux de tête.

- Vomissements.

- Démangeaisons, rash.

#### **Très rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)**

- Hallucinations, confusion.

- Eruption cutanée allergique.

#### **Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)**

- Diminution de l'appétit, niveaux élevés de potassium dans le sang qui peuvent causer des anomalies du rythme cardiaque.

- Augmentation de la pression intraoculaire.

- Modifications de l'activité électrique du cœur (ECG), battements cardiaques irréguliers, perception de vos battements cardiaques, accélération du rythme cardiaque.

- Troubles de la voix.

- Troubles hépatiques.

- Faiblesse musculaire.

- Troubles rénaux.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez déclarer les effets indésirables directement ou via le centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### **5. COMMENT CONSERVER Veca®, comprimé pelliculé ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

N'utiliser pas ce médicament après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température inférieure à 30 °C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

##### **Ce que contient Veca®, comprimé pelliculé :**

• La substance active : Solifénacine succinate

Veca® 5 mg, comprimé pelliculé : Solifénacine succinate.....5 mg

Excipients q.s.p.....1 comprimé

Excipient à effet notoire : Lactose monohydraté

Veca® 10 mg, comprimé pelliculé : Solifénacine succinate.....10 mg

Excipients q.s.p.....1 comprimé

Excipient à effet notoire : Lactose monohydraté

#### **Qu'est-ce que Veca®, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?**

Veca® se présente sous forme de comprimé pelliculé.

Veca® 5 mg : Boîte de 3, boîte de 5, boîte de 10, boîte de 20 et boîte de 30 comprimés pelliculés.

Veca® 10 mg : Boîte de 3, boîte de 5, boîte de 10, boîte de 20 et boîte de 30 comprimés pelliculés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

#### **Conditions de délivrance :**

Liste II.

#### **Date de création de la notice :**

Août 2020.

A20715 FXT 6

**PHARMA5**

Laboratoires PHARMA 5

21 Rue des Asphodèles - Casablanca - Maroc

Site de fabrication : Zone Industrielle Ouled Saleh

- Bouskoura - Maroc

Yasmine LAHLOU FILALI - Pharmacien Responsable

Mounir CHARIF  
CHEFCHAOUNI  
Chirurgien Urologue

Ancien Professeur Assistant  
au C.H.U. IBN SINA de Rabat  
Ancien Chef de Clinique du Groupe  
Hospitalier COCHIN de Paris  
Membre de L'Association  
Française d'Urologie et  
de l'European Association  
of Urology



الدكتور منير شريف شفشاوني  
اختصاصي في أمراض وجراحة  
المسالك البولية

أستاذ مساعد سابق بالمركز الصحي  
الجامعي ابن سينا بالرباط وكوشان بباريز  
عضو بالجمعية الفرنسية والأوروبية  
لأمراض المسالك البولية

Casablanca, le : ..... 27/05/2022

## COMPTE RENDU D'ECHOGRAPHIE

Mme TAHRI JOUTEI Naima

### Résultats

Appareil médical : MINDRAY DC-3. Sonde linéaire 7L4A superficielle de 7 à 10 Mhz  
en Mode B, doppler pulsé, couleur et énergie.

Examen réalisé : ECHOGRAPHIE RENALE ET VESICALE.

Résultats :

- Le rein gauche a des mesures normales. Les contours sont réguliers. L'index cortico-médullaire est respecté. Les cavités rénales ne sont pas dilatées.
- Le rein droit est de taille normale. Les contours sont réguliers. Bonne différenciation cortico-médullaire. Les cavités rénales ne sont pas dilatées.
- Absence de calcul.
- La vessie est pleine. La paroi vésicale est fine et ne présente aucune anomalie.
- Pas de résidu post mictionnel.

Signé : Dr. Mounir C. CHEFCHAOUNI

Dr Mounir CHARIF CHEFCHAOUNI  
Chirurgien Urologue  
Résid. Parc Lyautey, 1 Rond Point S  
Exupery 10ème étage Appart N°11 Casa  
Tél: 0522.48.40.58/88 - Fax: 0522.48.40.88  
Urgence: 06.61.20.82.14

Résidence Parc Lyautey - 1, Rond Point ST EXUPERY , Angle Av Hassan II et Rue Aljal El Fassi  
(en face du parc de la ligue Arabe) 2<sup>e</sup> étage, App. n°11 - CASABLANCA  
Tél : 05.22.48.40.58/88 - Fax : 05.22.48.40.88 - Urgences : 06.61.208.214 - E-mail : m\_c\_chefchaouni@hotmail.com

**Dr. Mounir CHARIF  
CHEFCHAOUNI  
Chirurgien Urologue**

Ancien Professeur Assistant  
au C.H.U. IBN SINA de Rabat  
Ancien Chef de Clinique du Groupe  
Hospitalier COCHIN de Paris  
Membre de L'Association  
Française d'Urologie et  
de l'European Association  
of Urology



الدكتور منير شريف شفشاوني  
اختصاصي في أمراض وجراحة  
المسالك البولية

أستاذ مساعد سابقاً بالمركز الصحي  
الجامعي ابن سينا بالرباط وكوشاں بیاریز  
عضو بالجمعية الفرنسية والأوروبية  
لأمراض المسالك البولية

Casablanca, le 27/05/2022

Mme TAHRI JOUTEI Naima

**Facture : NH 202205/083**

<b>Actes</b>	<b>Montant</b>
Consultation	300,00
Echographie	450,00
<b>Total :</b>	<b>750,00</b>

Arrêtée la présente facture à la somme de : **SEPT CENT CINQUANTE DIRHAMS**

ICE : 001632746000030  
INP : 091040600

*Dr. Mounir Charif Chefchaouni  
Chirurgien Urologue  
Résidence Parc Lyautey 1, Rond point St Exupery  
2ème Etage Appart N° 11  
Tél 022 48 40 56 88 Fax 022 48 40 88  
Urgence 061 20 82 14 Casablanca*