

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie
M22- 0005706

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11182 Société : 122179

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : HAFID MY AHMAD

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 09/06/22

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : pharyte

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019


Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/06/22		C	150,21	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien
ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

29-06-22

212,50

05-07-22

217,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du
Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des
Coefficients

Montant
des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du
Praticien

Date des
Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé
des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des
Soins


Coefficient

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION



O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT
MASTICATOIRE

	H	
25533412	21433552	
00000000	00000000	
D		G
00000000	00000000	
35533411	11433553	
	B	


(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Oumnia AARIBI

Lauréate de la Faculté de Médecine
et de pharmacie de Casablanca

Médecine Générale

Médecine Esthétique

Hijama médicale

Acupuncture



الدكتورة أمينة أعرابي

خريجة كلية الطب والصيدلة

الدار البيضاء

الطب العام

الطب التجميلي

الحجامة الطبية

الوخز بالإبر

Ordonnance

05/08/20

Najat Amrani

125,00

1) Lavande 50g
1 cp/j
72,00

2) Hansal nml
1 cp/j

217,00

Lotissement Haj Fatih, N° 70, 1er Etage
(à côté de pharmacie Hamza) - Oulfa Casablanca

✉ dr.oumnia.aaribi@gmail.com

تجزئة الحاج فاتح عمارة رقم 70، الطابق الأول
(قرب صيدلية حمزة) الألف الدار البيضاء

☎ 05 20 39 55 56 / 06 03 56 73 00



MULTIVITAMINES

10 VITAMINES ESSENTIELLES - ARÔME ORANGE

10 Comprimés Effervescents

Régulateur d'acidité hydrogénocarbonate de sodium, agent de volume de L-ascorbique (vitamine C), maltodextrine, édulcorant cyclamate de sodium, inositol (vitamine E), poudre de jus de betterave, nicotinamide, édulcorant saccharose, calcium D, colorant riboflavine, pyridoxine (Vitamine B6) riboflavine (vitamine B1), acide pteroylmonoglutamique (acide folique), D-biotine, contient pas de : gluten, lactose, ingrédients d'origine animale, sucres

Poids Net / Net Weight: **82 g e**

PPV 72 DH

LOT :

L1330

EXP :

05/2024

Composition :

VITAMINES	Par Comprimé	% des AJIR
Vitamine C	80 mg	133%
Niacine	16 mg.-TE	81%
Vitamine E	12 mg.-TE	120%
Acide Pantothénique	6 mg	100%
Riboflavine (Vitamine B2)	1.4 mg	78%
Vitamine B6	1.4 mg	70%
Thiamine (Vitamine B1)	1.1 mg	79%
Acide Folique (Vitamine B9)	200 µg	100%
Biotine (Vitamine B8)	50 µg	33%
Vitamine B12	2.5 µg	25%

PROPRIETES : HANSAL MULTIVITAMINES est un complément alimentaire à base de 10 vitamines essentielles. HANSAL MULTIVITAMINES apporte une formule spécifique et synergique dont les actifs contribuent à réduire la fatigue et participent au métabolisme énergétique.

POSOLOGIE : 1 comprimé effervescent par jour, dissout dans un verre d'eau (200 ml). La durée d'utilisation est de 20 jours à renouveler plusieurs fois dans l'année lorsque nécessaire.

MODE D'ADMINISTRATION : Voie Orale. Mettre le comprimé dans verre d'eau et boire après dissolution complète.

CONTRE-INDICATIONS : hypersensibilité à l'un des composants.

VALEURS NUTRITIVES POUR UN COMPRIME :

COMPOSITION	Par Comprimé
Energie	37 kJ / 8.6 kCal
Sel	0.84 g
Glucides	0.7 g
Dont sucres	< 0.1 g
Protéines	< 0.1 g
Lipides	< 0.1 g
dont acides gras saturés	< 0.1 g

PRECAUTIONS D'UTILISATION : HANSAL MULTIVITAMINES est un complément alimentaire avec édulcorant, ce n'est pas un médicament. La dose journalière recommandée ne devrait pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne sont pas un substitut à un régime alimentaire varié et équilibré et à un style de vie sain. Garder hors de la portée de jeunes enfants. Conserver au frais et au sec, moins de 25°C. Garder le tube bien fermé.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF ET TITULAIRE DE L'AMM : PHARMA JOUVENCE SARL

8, RUE MOHAMED SEDKI, 20040 CASABLANCA MAROC

FABRIQUE PAR: SANOTACT GMBH

Hessenweg 10, D-48157 Münster, Allemagne

E : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Tavanic® 250 mg comprimé pelliculé
Tavanic® 500 mg comprimé pelliculé
 floxacine

SANOFI

ez lire
 amen
 ez cet
 av
 armaci
 médica
 autres
 mala
 ous re.
 écin ou à votre
 ésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Tavanic 500mg cp pel b5
P.P.V : 145,00 DH



le prendre ce
 importantes pour vous.
 de la relire.
 : médecin ou votre

écrit. Ne le donnez pas
 même si les signes de
 le, parlez-en à votre
 de aussi à tout effet

ontient cette notice :

est-ce que Tavanic et dans quels cas est-il utilisé ?
 Elles sont les informations à connaître avant de prendre Tavanic
 nement prendre Tavanic
 ls sont les effets indésirables éventuels
 nement conserver Tavanic
 tenu de l'emballage et autres informations

EST-CE QUE TAVANIC ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

icament s'appelle Tavanic. Il contient une substance active appelée
 cine. Celle-ci fait partie des médicaments connus sous le nom
 iques et appartient plus précisément à la famille des quinolones.
 détruisant les bactéries responsables de certaines infections dans
 anisme.
 permet de traiter les infections touchant :
 us
 nches/poumons, chez les personnes atteintes de maladies
 res chroniques ou de pneumonie
 es urinaires, y compris les reins et la vessie
 ate, en cas d'infection persistante
 et et les tissus sous-cutanés, y compris les muscles (ces parties sont
 appelées « tissus mous »).
 nnes circonstances, Tavanic peut être prescrit pour diminuer le
 contracter la forme pulmonaire de la maladie du charbon après
 sition au bacille du charbon ou encore pour réduire le risque
 ation de la maladie.

le prendre ce
 importantes pour vous.
 de la relire.
 : médecin ou votre
 écrit. Ne le donnez pas
 même si les signes de
 le, parlez-en à votre
 de aussi à tout effet

ontient cette notice :

est-ce que Tavanic et dans quels cas est-il utilisé ?
 Elles sont les informations à connaître avant de prendre Tavanic
 nement prendre Tavanic
 ls sont les effets indésirables éventuels
 nement conserver Tavanic
 tenu de l'emballage et autres informations

EST-CE QUE TAVANIC ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

icament s'appelle Tavanic. Il contient une substance active appelée
 cine. Celle-ci fait partie des médicaments connus sous le nom
 iques et appartient plus précisément à la famille des quinolones.
 détruisant les bactéries responsables de certaines infections dans
 anisme.
 permet de traiter les infections touchant :
 us
 nches/poumons, chez les personnes atteintes de maladies
 res chroniques ou de pneumonie
 es urinaires, y compris les reins et la vessie
 ate, en cas d'infection persistante
 et et les tissus sous-cutanés, y compris les muscles (ces parties sont
 appelées « tissus mous »).
 nnes circonstances, Tavanic peut être prescrit pour diminuer le
 contracter la forme pulmonaire de la maladie du charbon après
 sition au bacille du charbon ou encore pour réduire le risque
 ation de la maladie.

- si vous avez une insuffisance cardiaque,
- si vous avez eu un infarctus du myocarde,
- si vous êtes une femme ou une personne âgée,
- si vous prenez d'autres médicaments pouvant conduire à des modifications anormales de l'ECG (voir la rubrique intitulée « Autres médicaments et Tavanic »).
- Si vous êtes diabétique.
- Si vous avez des troubles du foie ou en avez eu par le passé.
- Si vous souffrez d'une myasthénie (grande faiblesse musculaire).

Si vous n'êtes pas certain(e) que l'un des cas ci-dessus vous concerne, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Tavanic.

Autres médicaments et Tavanic

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, ou si vous envisagez d'en prendre, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, car Tavanic peut modifier l'action des autres médicaments. Inversement, certains médicaments peuvent influencer le mode d'action de Tavanic.

Informez votre médecin en particulier si vous prenez l'un des médicaments ci-après, car le risque d'effets indésirables peut augmenter quand ces médicaments sont utilisés au cours du traitement par Tavanic :

- Les corticoïdes, parfois appelés corticostéroïdes, utilisés pour traiter une inflammation, car le risque d'inflammation et/ou de rupture d'un tendon peut augmenter.
- La warfarine, utilisée pour fluidifier le sang, car la prédisposition aux saignements peut augmenter. Le cas échéant, votre médecin vous prescrira des prises de sang régulières pour contrôler la coagulation sanguine.
- La théophylline, utilisée dans les maladies respiratoires chroniques, car le risque de convulsions est plus élevé en cas de prise en association avec Tavanic.
- Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS), utilisés contre la douleur et l'inflammation, tels que l'aspirine, l'ibuprofène, le fénébène, le kétoprofène et l'indométacine, car le risque de convulsions est plus élevé en cas de prise en association avec Tavanic.
- La ciclosporine, utilisée après une greffe d'organes, car le risque d'effets indésirables liés à la ciclosporine est plus élevé.
- Les médicaments ayant un effet connu sur le rythme cardiaque, c'est-à-dire les produits utilisés dans les troubles du rythme (antiarythmiques tels que la quinidine, l'hydroquinidine, le disopyramide, l'amiodarone, le sotalol, le dofétilide ou l'ibutilide), les dépressions (antidépresseurs tricycliques tels que l'amitriptyline ou l'imipramine), les infections bactériennes (antibiotiques de la famille des macrolides tels que l'érythromycine, l'azithromycine ou la clarithromycine) et les maladies mentales (certains psychotropes).
- Le probénécide, utilisé pour traiter la goutte. Votre médecin est susceptible de réduire la dose si votre fonction rénale est diminuée.
- La cimétidine, contre les ulcères et les brûlures d'estomac. Votre médecin est susceptible de réduire la dose si votre fonction rénale est diminuée.

Si l'un des cas ci-dessus vous concerne, consultez votre médecin.

Ne pas

Dr. Oumnia AARIBI

Lauréate de la Faculté de Médecine
et de pharmacie de Casablanca

Médecine Générale

Médecine Esthétique

Hijama médicale

Acupuncture



الدكتورة أمينة أعربي

خريجة كلية الطب والصيدلة

الدار البيضاء

الطب العام

الطب التجميلي

الحجامة الطبية


الوخز بالإبر

Ordonnance

29/06/22

N e Amrani Najat

29,80



1) Aspirine 100-8
1 cp → 1-1
1/2 cp → 1-1

2) Doliprane 1000
2 cp → 3-1

14,80

3) Vit C 1000
2 cp → 2-1

Lotissement Haj Fatih, N° 70, 1er Etage
(à côté de pharmacie Hamza) - Oulfa Casablanca

✉ dr.oumnia.aaribi@gmail.com

تجزئة الحاج فاتح عمارة رقم 70، الطابق الأول
(قرب صيدلية حمزة) الألفا الدار البيضاء

☎ 05 20 39 55 56 / 06 03 56 73 00

40,90

5) Znadex 5g
2 p'j



27,70

3) spafu 80 g
2 p'j



49,60

7) Dc fur
2 p'j



212,50

ZINASKIN® 45 mg

PPV 40DH90

EXP 12/2024
LOT 18066 65

20 comprimés effervescents

MACI
Nadia Bouhassani
E. Lotissement Zoubair
Addoha Oufia - Casablanca
sm: 06 67 07 50 25

27,50

PPV: 49,60 DH
LOT: 22C15
EXP: 03/2025

~~Medecin en chef
Lotissement Hal Farah
Addoha Oufia, Casablanca
06 75 60~~

VITAMINE C[®] GALENICA 1g

Acide ascorbique

VITAMINE C 1g

Boîte de 10 comprimés effervescent

PPV : 14.80 Dhs



Boîte de 10 et de 20

notice avant de prendre ce médicament. Les informations importantes pour vous, patient, en suivant scrupuleusement la notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

Il n'est pas nécessaire de prendre ce médicament si vous n'avez pas besoin de la vitamine C. Si vous avez besoin de la vitamine C, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

Que contient cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VITAMINE C[®], ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELS SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VITAMINE C[®] ?
3. COMMENT PRENDRE VITAMINE C[®] ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER VITAMINE C[®] ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE VITAMINE C[®] ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :
ACIDE ASCORBIQUE (VIT C)

Indications thérapeutiques :

Ce médicament contient de la vitamine C. Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

2. QUELS SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VITAMINE C[®] ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications :

Ne prenez jamais VITAMINE C[®] :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,

• Si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein),

• Si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux,

• Si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie),

• Si vous avez moins de 15 ans.

Mise en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITAMINE C[®].

Ce médicament contient du sodium (composant principal du sel de cuisine/table). A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrose/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Si votre fatigue s'accroît ou persiste après 1 mois de traitement ou si elle s'accompagne de manifestations inhabituelles, prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

En raison d'un effet légèrement stimulant, il est souhaitable de ne pas prendre la vitamine C en fin de journée.

Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux issus d'autres sources, comme les médicaments, les aliments enrichis et les compléments alimentaires (risque de surdosage).

La vitamine C augmente l'absorption du fer par votre organisme. En cas d'hémochromatose (maladie héréditaire se caractérisant par une surcharge en fer), adressez-vous à votre médecin car l'utilisation de ce médicament doit faire l'objet de précautions strictes.

La vitamine C doit être utilisée avec prudence en cas de déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées en vitamine C (supérieure à 1 gramme par jour) favorisent le risque d'apparition d'une anémie hémolytique (destruction des globules rouges).

La vitamine C peut fausser les résultats de certaines analyses biologiques, notamment de tests de contrôle du glucose sanguin et urinaire, avertissez votre médecin si des tests sont prévus.

Enfants et adolescents : Sans objet.

Interactions avec d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ce médicament contient de la vitamine C. D'autres médicaments en contiennent. Ne vous associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux, issus des aliments enrichis et des compléments alimentaires.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou

planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse : Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de VITAMINE C[®] pendant la grossesse.

Allaitement : La vitamine C passe dans le lait maternel. Il n'existe pas de données suffisantes sur les effets de la vitamine C chez le nouveau-né/nourrisson. Par conséquent, il est préférable d'éviter l'utilisation de VITAMINE C[®] pendant l'allaitement.

Fertilité : Il n'existe pas de données relatives aux effets de VITAMINE C[®] sur la fertilité humaine.

Sportifs : Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines : VITAMINE C[®] n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

Les effets indésirables à effet notoire :

VITAMINE C, comprimé effervescent contient jaune orangé S (E110), sodium saccharose.

3. COMMENT PRENDRE VITAMINE C[®] ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie :

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.

La dose recommandée est de 1 comprimé par jour.

Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Le comprimé doit être dissous dans un verre d'eau.

Durée du traitement :

La durée du traitement est limitée à 1 mois.

Si vous avez pris plus de VITAMINE C[®] que vous n'auriez dû :

Les symptômes généraux d'un surdosage en vitamine C peuvent inclure des troubles gastro-intestinaux tels que des diarrhées, des nausées et des vomissements.

La consommation chronique de doses élevées d'acide ascorbique (> 500 mg / jour) peut aggraver une surcharge en fer et peut mener à des lésions tissulaires chez les patients atteints d'hémochromatose.

A doses supérieures à 1 g/jour en vitamine C, peuvent survenir des troubles digestifs (brûlures gastriques, diarrhée) ; troubles rénaux et urinaires (calculs rénaux, insuffisance rénale, nécrose tubulaire aiguë) ; hémolyse (destruction des globules rouges) chez les sujets déficients en glucose-6-phosphate déshydrogénase (enzyme spécifique des globules rouges).

Si ces symptômes apparaissent, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre VITAMINE C[®] :

Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre VITAMINE C[®] : Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5. COMMENT CONSERVER VITAMINE C[®] ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :

Que contient VITAMINE C[®] ?

La substance active est :

Par unité de prise

Acide ascorbique1000 mg

Pour un comprimé effervescent

Les autres composants du comprimé sont :

Acide citrique anhydre, cyclamate de sodium, bicarbonate de sodium anhydre, carbonate de sodium, jaune orangé S, huile de vaseline, saccharose, saccharine sodique, arôme orange poudre.

Qu'est-ce que VITAMINE C[®], et contenu de l'emballage extérieur :

Ce médicament se présente sous la forme de comprimés effervescent.

Tube de 10 comprimés en boîte de 1 ou 2 tubes.

Nom et adresse de l'EPI titulaire de l'AMM MAROC : Laboratoires

pharmaceutiques GALENICA N° 13, G 5 - Z.I. Ouled Saleh - Bouskoura -20180

Casablanca - Maroc

Nom et adresse du fabricant (quand celui-ci n'est pas titulaire de l'AMM) :

Néant

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée : Janvier 2020

Conditions de prescription et de délivrance : Médicament non soumis à prescription médicale.

Informations réservées aux professionnels de santé : Sans objet.



LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES GALENICA
Z.I. Ouled Saleh - Casablanca - Maroc