

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- N° 004035

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2847 Société : R.A.M.
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : DOUNIA CHANSAOHA
 Date de naissance : 06/01/1953
 Adresse : 59B ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS
 9ème ETAGE App 28 CASA MAROC
 Tél. : 0651989687 Total des frais engagés : 1640,30 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : Docteur Hamza EL NAIL
 Urologue-Sexologue
 Tél: 06 56 20 62 05
 INPE: 0091186479
 Date de consultation : 16/06/2022
 Nom et prénom du malade : Dounia chansadha Age: 69 ans
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Trouble urinaire du bas Appareil
 Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le :/...../.....

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/06/22	CS + Echo		300 DH + 300 DH	Docteur Hamza EL NEJARI Urologue-Sexologue Tél: 06 56 20 62 06 INPE: 0091186478

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE LATIFA TAHIRI 123, Av. Hassan II - Casablanca Tél: 05 22 22 22 22	27-06-22	28630
PHARMACIE LATIFA TAHIRI 123, Av. Hassan II - Casablanca Tél: 05 22 22 22 22	16-6-22	2800

ANALYSES - RADIOGRAPHES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
CENTRE DE BIOLOGIE DES HOPITAUX - CBH 3, Rue du Colonel GROS - Casablanca Tél: 05 22 20 35 35 / 05 22 27 66 74	24.06.22	B150 HVO	226,00dh

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>														
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>														
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B</td> </tr> </table>		H	H	25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	H	H																
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B	B																
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>														
			DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Hamza EL NEIL
Urologue Sexologue
Andrologue



الدكتور النيل حمزة
أخصائي في جراحة الكلي
والمسالك البولية والتناسلية

27/06/2022

Mme Chamusadha Samir

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Oroken 200 mg, cp, pel b 8
P.P.V : 116,30 BH
6 118000 061069

17000
1 crochen 200 mg pour 19 jours
18421219


Tél: 0522 22 11 29 / 0522 22 96 18
123, Av. Hassan II - Casablanca
Dr. Lotifa TAHIRI
PHARMACIE DU PARC

Cabinet Dr. Hamza EL NEIL
CENTRE DE SOINS D'UROLOGIE

28630

Docteur Hamza EL NEIL
Urologue Sexologue
Tél: 05 56 60 62 05
INPE: 0091186478

إقامة المولد 4 مدخل (ب) الطابق 3 شقة رقم 36 ملتقى شارع أنوال وشارع عبدالمؤمن - الدار البيضاء
Résidence Al MAWLID 4 Porte (B) 3ème étage Apt. N° : B 36 - Angle Bd. Anoual et Bd. Abdelmoumen - B.P. 20340 - Casablanca
Tél.: 0522 23 42 97 - Urg : +212 656 206 206 - elneilhamza@hotmail.com - N° ICE : 002752425000008 - INPE : 091186478



Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous et votre médecin ou votre pharmacien. Il pourrait leur être nocif, même si la maladie est identique à la vôtre. Gardez-la précieusement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VEGA®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VEGA®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre VEGA®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VEGA®, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE VEGA®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicaments urologiques, médicaments de l'incontinence urinaire. La solifénacine succinate (la substance active de VEGA®) appartient à la classe pharmacothérapeutique des anticholinergiques. Ces médicaments sont utilisés pour réduire les contractions de la vessie lorsque celle-ci est hyperactive. Ceci vous permettra d'attendre plus longtemps avant de devoir aller aux toilettes et augmentera le volume des urines que peut retenir votre vessie. VEGA®, comprimé pelliculé est indiqué dans le traitement des symptômes de la vessie hyperactive (incontinence urinaire). Les symptômes incluent : un besoin pressant et soudain d'uriner sans signe précurseur, des envies fréquentes d'uriner ainsi que des émissions involontaires d'urine sans que vous ayez eu le temps d'aller aux toilettes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VEGA®, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Né prenez jamais VEGA®, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous avez des difficultés pour uriner ou si votre vessie ne se vide pas complètement quand vous urinez (rétention urinaire).
- Si vous souffrez d'une affection gastro-intestinale grave (notamment un mégacolon toxique, complication associée à la rectocolite hémorragique).
- Si vous souffrez d'une maladie des muscles appelée myasthénie, caractérisée par une faiblesse musculaire excessive.
- Si vous souffrez d'une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil, avec perte progressive de la vision (glaucome).
- Si vous êtes hémodialysé.

- Si vous souffrez d'une maladie sévère du foie.
- Si vous souffrez d'une maladie sévère du rein ou d'une maladie modérée du foie et que vous prenez des médicaments susceptibles de ralentir l'élimination de la solifénacine succinate de l'organisme (par exemple le kétoconazole). C'est le cas, votre médecin ou votre pharmacien vous en aura informé.
- Prévenez votre médecin avant le début du traitement par VEGA®, comprimé pelliculé si vous présentez ou avez déjà présenté l'une des maladies mentionnées ci-dessus.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre VEGA®, comprimé pelliculé :

- Si votre vessie ne se vide pas complètement quand vous urinez (obstruction des voies urinaires) ou si vous avez des difficultés pour uriner (par exemple un faible volume d'urine). Le risque d'accumulation d'urine dans la vessie (rétention urinaire) est alors beaucoup plus élevé.

- Si vous avez une obstruction gastro-intestinale (constipation).
- Si vous avez un risque de ralentissement de la motilité gastro-intestinale (ralentissement de la circulation des matières solides et liquides dans le tube digestif). C'est le cas, votre médecin vous en aura informé.
- Si vous souffrez d'une maladie rénale sévère.
- Si vous souffrez d'une maladie modérée du foie.
- Si vous avez une hernie hiatale ou des brûlures d'estomac.
- Si vous avez une atteinte neurologique (neuropathie autonome).

Enfants et adolescents

VEGA®, comprimé pelliculé ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans.

Prévenez votre médecin avant le début du traitement par VEGA®, comprimé pelliculé si vous présentez ou avez déjà présenté l'une des maladies mentionnées ci-dessus. Avant le début du traitement par VEGA®, comprimé pelliculé, votre médecin évaluera si votre pollakiurie (envie fréquente d'uriner) a d'autres causes [par exemple une insuffisance cardiaque (capacité

de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein]. Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un traitement contre certaines infections bactériennes). **Antibiotiques et VEGA®, comprimé pelliculé** : Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important que vous préveniez votre médecin si vous prenez :

- D'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.
- Des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de VEGA®, comprimé pelliculé.
- Des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. VEGA®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.
- Des médicaments tels que le kétoconazole, le ritonavir, le nelfinavir, l'itraconazole, le vérapamil ou le diltiazem, qui ralentissent la dégradation de VEGA®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine, car ils peuvent accélérer la dégradation de VEGA®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou aggraver une réaction (inflammation de l'oesophage).

VEGA®, comprimé pelliculé contient du lactose :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

VEGA®, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

VEGA®, comprimé pelliculé peut être pris indifféremment pendant ou en dehors des repas.

Grossesse

Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez d'être enceinte, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

VEGA®, comprimé pelliculé peut provoquer une vision trouble et parfois une somnolence ou une fatigue. Si vous souffrez de l'un de ces effets indésirables, ne conduisez pas et n'utilisez pas de machine.

3. COMMENT PRENDRE VEGA®, comprimé pelliculé ?

Veillez toujours à prendre ce médicament aux indications de votre médecin ou pharmacien. La dose recommandée est de 5 mg par jour. Prenez le comprimé en entier avec de l'eau, indifféremment, pendant ou en dehors du repas. Ne mâchez pas le comprimé.

Utilisation chez les enfants et adolescents

VEGA® ne doit pas être utilisé chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Si vous avez pris plus de VEGA®, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

En cas de prise excessive ou en cas de surdosage, consultez immédiatement votre médecin. Un surdosage peut se manifester par les symptômes suivants : maux de tête, sécheresse de la bouche, somnolence et vision trouble, perception déformée (hallucinations), excitation importante, difficultés à respirer, accélération du rythme cardiaque (tachycardie), accumulation d'urine dans la vessie (rétention urinaire) et dilatation de la pupille (mydriase).

Si vous oubliez de prendre VEGA®, comprimé pelliculé :

Si vous oubliez de prendre un comprimé à l'heure habituelle, prenez-le dès que possible, sauf s'il est déjà l'heure de la prise de la dose suivante. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous arrêtez de prendre VEGA®, comprimé pelliculé :

Si vous arrêtez de prendre VEGA®, vos symptômes pourraient réapparaître ou s'aggraver. Prévenez votre médecin si vous envisagez d'arrêter le traitement. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de VEGA®, demandez plus d'informations à votre médecin ou pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous faites un choc allergique, ou une réaction cutanée sévère (par exemple décollement de la peau et formation de bulles), vous devez en informer votre médecin ou votre pharmacien immédiatement.

Un angioedème (réaction allergique cutanée qui se traduit par un gonflement survenant dans le tissu juste sous la surface de la peau) avec obstruction des voies respiratoires (difficulté à respirer) a été rapporté chez quelques patients traités par solifénacine

de survenue d'un angioedème, la solifénacine ne doit pas être commercialisée.

succin
succin
des n
VECA
indé
Tré
• Si
En
• V
• V
lo
ni
le
Pe
• Infec
• Somnol
• Perturbat
• Sécheresse (irritat
• Sécheresse de la
• Réflex gastro-
• Sécheresse de la
• Sécheresse de la
• Difficultés pour
• Fatigue
• Accumulation de li

Rares (peut affecter)

- Accumulation d'une grande quantité de sel dans le gros intestin (fécalome).
- Accumulation d'urine dans la vessie (rétention urinaire).
- Sensations vertigineuses.
- Vomissements.
- Démangeaisons, rash.

Très rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)

cardiaques irréguliers, accélération du rythme cardiaque.

- Troubles de la voix.
- Troubles hépatiques.
- Faiblesse musculaire.
- Troubles rénaux.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez signaler un effet indésirable à votre médecin ou à votre pharmacien.



Conseils d'utilisation :
2 comprimés par jour pendant 10 jours.
Prenez les comprimés après le repas.
Boire au moins 1 litre d'eau par jour pendant le traitement.
Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Précautions d'emploi :
Se conformer aux conseils d'utilisation. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Alimentation diversifiée et mode de vie sain. L'emploi chez les enfants de moins de 12 ans n'est pas recommandé. A conserver à l'abri de la lumière et d'un endroit frais et sec.

mentionnée sur la boîte. A conserver à une température inférieure à 30 °C.

Les comprimés non utilisés doivent être jetés.

GYSTATIN CP 30
PPC : 104.00 DH
Ut Av : 09-2024 Lot : 1121097
IPHADERM

Exception à noter : Lactose monohydraté

VEGA® 10 mg, comprimé pelliculé - Solifénacine succinate

GYSTATIN CP 30
PPC : 104.00 DH
Ut Av : 09-2024 Lot : 1121097
IPHADERM

ils ne peuvent pas être commercialisés.

Conditions de délivrance :

Liste II.

Date de création de la notice :

Avril 2020.

PHARMA 5
Laboratoires PHARMA 5
21 Rue des Asphodèles - Casablanca - Maroc
Site de fabrication : Zone Industrielle Ouled Saleh - Bouskoura - Maroc
Yasmine LAHLOU FILALI - Pharmacien Responsable

Veca®

Solfénacine Succinate

Comprimé pelliculé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VECA®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VECA®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre VECA®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VECA®, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE VECA®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicaments urologiques, médicaments de l'incontinence urinaire.

La solifénacine succinate (la substance active de VECA®) appartient à la classe pharmaco-thérapeutique des anticholinergiques. Ces médicaments sont utilisés pour réduire les contractions de la vessie lorsque celle-ci est hyperactive. Ceci vous permettra d'attendre plus longtemps avant de devoir aller aux toilettes et augmentera le volume des urines que peut retenir votre vessie.

VECA®, comprimé pelliculé est indiqué dans le traitement des symptômes de la vessie hyperactive (incontinence urinaire). Les symptômes incluent : un besoin pressant et soudain d'uriner sans signe précurseur, des envies fréquentes d'uriner ainsi que des émissions involontaires d'urine sans que vous ayez eu le temps d'aller aux toilettes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VECA®, comprimé pelliculé ?

- Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
- Ne prenez jamais VECA®, comprimé pelliculé :**
- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
 - Si vous avez des difficultés pour uriner ou si votre vessie ne se vide pas complètement quand vous urinez (rétention urinaire).
 - Si vous souffrez d'une affection gastro-intestinale grave (notamment un mégacolon toxique, complication associée à la rectocolite hémorragique).
 - Si vous souffrez d'une maladie des muscles appelée myasthénie, caractérisée par une faiblesse musculaire excessive.
 - Si vous souffrez d'une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil, avec perte progressive de la vision (glaucome).
 - Si vous êtes hémodialysé.
 - Si vous souffrez d'une maladie sévère du foie.
 - Si vous souffrez d'une maladie sévère du rein ou d'une maladie modérée du foie et que vous prenez des médicaments susceptibles de ralentir l'élimination de la solifénacine succinate de l'organisme (par exemple le kétoconazole). Si c'est le cas, votre médecin ou votre pharmacien vous en aura informé.
 - Prévenez votre médecin avant le début du traitement par VECA®, comprimé pelliculé si vous présentez ou avez déjà présenté l'une des maladies mentionnées ci-dessus.

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre VECA®, comprimé pelliculé :
- Si votre vessie ne se vide pas complètement quand vous urinez (obstruction des voies urinaires) ou si vous avez des difficultés pour uriner (par exemple un faible volume d'urine). Le risque d'accumulation d'urine dans la vessie (rétention urinaire) est alors beaucoup plus élevé.
 - Si vous avez une obstruction gastro-intestinale (constipation).
 - Si vous avez un risque de ralentissement de la motilité gastro-intestinale (ralentissement de la circulation des matières solides et liquides dans le tube digestif). Si c'est le cas, votre médecin vous en aura informé.
 - Si vous souffrez d'une maladie rénale sévère.
 - Si vous souffrez d'une maladie modérée du foie.
 - Si vous avez une hernie hiatale ou des brûlures d'estomac.
 - Si vous avez une atteinte neurologique (neuropathie autonome).

Enfants et adolescents

VECA®, comprimé pelliculé ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans.

Prévenez votre médecin avant le début du traitement par VECA®, comprimé pelliculé si vous présentez ou avez déjà présenté l'une des maladies mentionnées ci-dessus.

Avant le début du traitement par VECA®, comprimé pelliculé, votre médecin évaluera si votre pollakiurie (envie fréquente d'uriner) a d'autres causes (par exemple une insuffisance cardiaque (capacité

de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein). Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un antibiotique (traitement contre certaines infections bactériennes).

Autres médicaments et VECA®, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important que vous préveniez votre médecin si vous prenez :

- D'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.
- Des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de VECA®, comprimé pelliculé.
- Des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. VECA®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.
- Des médicaments tels que le kétoconazole, le ritonavir, le nelfinavir, l'itraconazole, le vérapamil ou le diltiazem, qui ralentissent la dégradation de VECA®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine, car ils peuvent accélérer la dégradation de VECA®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou aggraver une œsophagite (inflammation de l'œsophage).

VECA®, comprimé pelliculé contient du lactose :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au lactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

VECA®, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

VECA®, comprimé pelliculé peut être pris indifféremment pendant ou en dehors des repas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Il n'est pas recommandé d'utiliser VECA®, comprimé pelliculé pendant la grossesse, sauf nécessité absolue.

N'utilisez pas VECA®, comprimé pelliculé si vous allaitez car la solifénacine succinate pourrait passer dans le lait maternel. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

VECA®, comprimé pelliculé peut provoquer une vision trouble et parfois une somnolence ou une fatigue. Si vous souffrez de l'un de ces effets indésirables, ne conduisez pas et n'utilisez pas de machine.

3. COMMENT PRENDRE VECA®, comprimé pelliculé ?

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 5 mg par jour, sauf si votre médecin vous demande de prendre 10 mg par jour.

Avalez le comprimé en entier avec du liquide. Il peut être pris indifféremment, pendant ou en dehors des repas. Ne pas croquer le comprimé.

Utilisation chez les enfants et adolescents

VECA® ne doit pas être utilisé chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Si vous avez pris plus de VECA®, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

En cas de prise excessive ou en cas de prise accidentelle par un enfant, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Un surdosage peut se manifester par les symptômes suivants : maux de tête, sécheresse de la bouche, sensations vertigineuses, somnolence et vision trouble, perception de choses qui n'existent pas (hallucinations), excitation importante, convulsions, difficultés à respirer, accélération du rythme cardiaque (tachycardie), accumulation d'urine dans la vessie (rétention urinaire) et dilatation de la pupille (mydriase).

Si vous oubliez de prendre VECA®, comprimé pelliculé :

Si vous oubliez de prendre un comprimé à l'heure habituelle, prenez-le dès que possible, sauf s'il est déjà l'heure de la prise de la dose suivante. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous arrêtez de prendre VECA®, comprimé pelliculé :

Si vous arrêtez de prendre VECA®, vos symptômes d'hyperactivité vésicale pourraient réapparaître ou s'aggraver. Consultez toujours votre médecin si vous envisagez d'arrêter le traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous faites un choc allergique, ou une réaction cutanée sévère (par exemple décoloration de la peau et formation de bulles), vous devez en informer votre médecin ou votre pharmacien immédiatement.

Un angioedème (réaction allergique cutanée qui se traduit par un gonflement survenant dans le tissu juste sous la surface de la peau) avec obstruction des voies respiratoires (difficulté à respirer) a été rapporté chez quelques patients traités par solifénacine

LOT : 6978
UT. AV : 02-25
P.P.V : 108 DH 00

A18780

AMM : 164/200MP/21/NNRd

Veca® 5 mg
Boîte de 30 comprimés pelliculés

6 118000 096528

Veca®
Solfénacine succinate

5 mg

30 comprimés pelliculés
Voie orale

Adultes

- Diminution de l'appétit, niveaux élevés de sucre dans le sang qui peuvent causer des anomalies du rythme cardiaque.
- Augmentation de la pression intraoculaire.
- Modifications de l'activité électrique du cœur (ECG), battements cardiaques irréguliers, perception de vos battements cardiaques, accélération du rythme cardiaque.
- Troubles de la voix.
- Troubles hépatiques.
- Faiblesse musculaire.
- Troubles rénaux.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez déclarer les effets indésirables directement ou via le centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER VECA®, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température inférieure à 30 °C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient VECA®, comprimé pelliculé :

- **La substance active :** Solfénacine succinate
- VECA® 5 mg, comprimé pelliculé : Solfénacine succinate 5 mg
- Excipients q.s.p. 1 comprimé
- Excipient à effet notoire : Lactose monohydraté
- VECA® 10 mg, comprimé pelliculé : Solfénacine succinate 10 mg
- Excipients q.s.p. 1 comprimé
- Excipient à effet notoire : Lactose monohydraté

Qu'est-ce que VECA®, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

VECA® se présente sous forme de comprimé pelliculé.

VECA® 5 mg : Boîte de 3, boîte de 5, boîte de 10, boîte de 20 et boîte de 30 comprimés pelliculés.

VECA® 10 mg : Boîte de 3, boîte de 5, boîte de 10, boîte de 20 et boîte de 30 comprimés pelliculés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Conditions de délivrance :

Liste II.

Date de création de la notice :

Avril 2020.

PHARMA 5

Laboratoires PHARMA 5

21 Rue des Asphodèles - Casablanca - Maroc

Site de fabrication : Zone Industrielle Ouled Saleh

- Bouskoura - Maroc

Yasmine LAHLOU FILALI - Pharmacien Responsable

Docteur Hamza EL NEIL
Urologue Sexologue
Andrologue



الدكتور النيل حمزة
أخصائي في جراحة الكلي
والمسالك البولية والتناسلية

16/06/2022

Mme Dounia Chamscher

108,00 x 2 =

1/ Ueca 5mg p

2p 1/ ptk 2mcis

104,00 x 3 =

2/ Gynostat

528,00

2p 1/ ptk 2mcis

PHARMACIE DU PAIRI
Dr. Lotifa TAHIRI
123, Av Hassan II - Casablanca
Tel: 0522 22 22 22 / 0522 22 66 18

Docteur Hamza EL NEIL
Urologue-Sexologue
Tél.: 06 56 20 62 06
INPE: 0091186478

Docteur Hamza EL NEIL
Urologue Sexologue
Andrologue



الدكتور النيل حمزة
أخصائي في جراحة الكلي
والمسالك البولية والتناسلية

NOTE D'HONORAIRE

Je soussigné, **Dr. EL NEIL HAMZA.**

Présentes meilleurs vœux de rétablissement à :

Mme. CHAMSADHA DOUNIA.

Et lui présente ma note d'honoraire de 600DH.

Le 16/06/2022 à Casablanca

Docteur Hamza EL NEIL
Urologue Sexologue Andrologue
Tél : 06 56 206 206

إقامة المولد 4 مدخل (ب) الطابق 3 شقة رقم 36 ملتقى شارع أنوال وشارع عبدالمؤمن - الدار البيضاء
Résidence Al MAWLID 4 Porte (B) 3ème étage Apt. N° : B 36 - Angle Bd. Anoual et Bd. Abdelmoumen - B.P. 20340 - Casablanca
Tél.: 0522 23 42 97 - Urg : +212 656 206 206 - elneilhamza@hotmail.com - N° ICE : 002752425000008 - INPE : 091186478

Docteur Hamza EL NEIL
Urologue Sexologue
Andrologue



الدكتور النيل حمزة
أخصائي في جراحة الكلي
والمسالك البولية والتناسلية

CASABLANCA LE 16/06/2022

COMPTE RENDU ECHOGRAPHIE RENALE ET VESICALE

Mme CHAMSADHA DOUNIA

LE REIN DROIT DE TAILLE ET MORPHOLOGIE NORMAL SANS DILATATION DES
CAVITES EXCRETRICES NI IMAGE DE CALCUL

LE REIN GAUCHE DE TAILLE ET MORPHOLOGIE NORMAL SANS DILATATION
DES CAVITES EXCRETRICES NI IMAGE DE CALCUL

VESSIE SEMI PLEINE A PAROI FINE ET CONTENUE TRANSSONIQUE

Cabinet Dr. Hamza EL NEIL
CENTRE DE SOINS D'UROLOGIE

Docteur Hamza EL NEIL
Urologue-Sexologue
Tél.: 06 56 20 62 06
INPE: 0091186478

إقامة المولد 4 مدخل (ب) الطابق 3 شقة رقم 36 ملتقى شارع أنوال وشارع عبدالمؤمن • الدار البيضاء

Résidence Al MAWLID 4 Porte (B) 3ème étage Apt. N° : B 36 • Angle Bd. Anoual et Bd. Abdelmoumen • B.P. 20340 • Casablanca

Tél.: 0522 23 42 97 • Urg : +212 656 206 206 • elneilhamza@hotmail.com • N° ICE : 002752425000008 • INPE : 091186478



Analyses

Dr Malika BENKIRAN
Pharmacien Biologiste

- Analyses Médicales
- Biologie Spécialisée
- Procréation Médicalement Assistée

EXAMEN du : 24/06/22 à 16h36

Edité le : 27/06/22 à 13h00

Mme DOUNIA CHAMSA-DHA

Patient 155472 Né(e) le 01/01/1953

Dr. EL NEIL Hamza

Prélevé par le Laboratoire

Page : 1 / 2

BACTERIOLOGIE

NORMES

ANTECEDENTS

EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES

Date réception urines : 24/06/2022

Conditions de recueil : Urines recueillies au laboratoire

EXAMEN PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect	Limpide	(N : Limpide)
Couleur	Jaunâtre	(N : Jaune or)
Culot	Absent	
pH	6,0	(N : 5 à 6)
Nitrites	Recherche NEGATIVE	30/11/21 : 6.5 (N : Absence)

EXAMEN CYTOLOGIQUE

Leucocytes	Absence de leucocytes
Hématies	Absence d'hématies
Cellules épithéliales ..	Absence de cellules épithéliales
Levures	Absentes
Cylindres	Absence de cylindres
Cristaux	Absence de cristaux

NUMERATION DES ELEMENTS

Leucocytes	< 1 000	/ml (N : < 10 000)	30/11/21 : 6000
Hématies	< 1 000	/ml (N : < 5 000)	30/11/21 : < 1 000

EXAMEN DIRECT Absence de germes

CULTURES Il a été isolé quelques colonies de :

Escherichia coli

Numération des germes : 10.3 UFC

Dissociation cyto-bactériologique.

Résultats à interpréter en fonction du contexte clinique.

Dr BIOLOGISTE

**CENTRE DE BIOLOGIE
DES HÔPITAUX - CBH**
3, Rue du Colonel GROS - Casablanca
Tél: 05 22 20 35 35 / 05 22 27 66 74
④ Fax: 05 22 20 35 15

3, rue Caïd Najem ex Colonel GROS, Quartier des Hôpitaux - 20 360 CASABLANCA

Tél.: 05 22 20 35 35 - 05 22 49 06 65 - 05 20 99 99 44 - 06 61 75 52 65

E-mail : cbhmaroc@yahoo.fr - Site web : www.cbh.ma

Urgences - 24 / 24 - 7 / 7 06 61 75 52 65



stationnement
assuré

EXAMEN du : 24/06/22 à 16h36

Edité le : 27/06/22 à 13h00

Mme DOUNIA CHAMSA-DHA

Patient 155472 Né(e) le 01/01/1953

Dr. EL NEIL Hamza

Prélevé par le Laboratoire

Page : 2 / 2

ANTIBIOGRAMME URINE

(Système automatisé VITEK 2 - BIOMERIEUX)

(Normes d'interprétation Global European based + Règles CA-SFM)

Souche testée *Escherichia coli*

BETA-LACTAMINES

Amoxicilline (CLAMOXYL, TOTAPEN)	Résistant
Amoxicilline - Acide clavulanique (AUGMENTIN) ..	Résistant
Ticarcilline (TICARPEN)	Résistant
Pipéracilline - Tazobactam (TAZOCILLINE)	Sensible
Céfalogtine (KEFLIN, ALFATIL, ORACEFAL)	Sensible
Céfoxitine (MEFOXIN)	Sensible
Céfixime (OROKEN)	Sensible
Céfotaxime (CLAFORAN)	Sensible
Ceftriaxone (ROCEPHINE)	Sensible
Ceftazidime (FORTUM)	Sensible
Imipénème (TIENAM)	Sensible
Ertapénème	Sensible

AMINOSIDES

Tobramycine (NEBCINE)	Sensible
Amikacine (AMIKLIN)	Sensible
Gentamycine (GENTALLINE)	Sensible
Nétilmicine (NETROMICINE)	Non testé

QUINOLONES

Acide nalidixique (NEGRAM, APURONE)	Résistant
Oloxacine (OFLOCET)	Résistant
Norfloxacin-Péfloxacine (NOROXINE-PEFLACINE) ..	Résistant
Ciprofloxacine (CIFLOX)	Résistant

AUTRES ANTIBIOTIQUES

Nitrofurantoïne (FURADANTINE)	Sensible
Cotrimoxazole (BACTRIM)	Résistant

Dr BIOLOGISTE

**CENTRE DE BIOLOGIE
DES HÔPITAUX « CBH »**
3, Rue du Colonel Gros - Casablanca
Tél: 05 22 20 33 33 / 05 22 27 66 74
④ Fax: 05 22 20 35 15

Docteur Hamza EL NEIL
Urologue Sexologue
Andrologue



الدكتور النيل حمزة
أخصائي في جراحة الكلي
والمسالك البولية والتناسلية

16/06/2022

Mme Dounia Chamsachha



Cabinet Dr. Hamza EL NEIL
CENTRE DE SOINS D'UROLOGIE

CENTRE DE BIOLOGIE
DES HOPITAUX « CBH »
Rue du Colonel Gros - Casablanca
Tél: 05 22 20 35 35 / 05 22 27 66 74

Docteur Hamza EL NEIL
Urologue-Sexologue
Tél.: 05 56 20 62 06
INPE: 0091186478

إقامة المولد 4 مدخل (ب) الطابق 3 شقة رقم 36 ملتقى شارع أنوال وشارع عبدالمؤمن - الدار البيضاء
Résidence Al MAWLID 4 Porte (B) 3ème étage Apt. N° : B 36 - Angle Bd. Anoual et Bd. Abdelmoumen - B.P. 20340 - Casablanca
Tél.: 0522 23 42 97 - Urg : +212 656 206 206 - elneilhamza@hotmail.com - N° ICE : 002752425000008 - INPE : 091186478

LABORATOIRE CENTRE DE BIOLOGIE DES HÔPITAUX CBH
3, rue du Colonel Gros (Caïd Najem) Quartier des Hôpitaux 20100 Casablanca

Tél : 05.22.20.35.35/05.22.27.66.74

Fax : 05.22.20.35.15

Patente : 36332437

I.F. : 40288423

CNSS : 8036726

N° ICE : 0017 10887 0000 70

Code INPE: 093062362



093062362

FACTURE No : 182422

Casablanca, le : 24/06/2022

Analyses effectuées le .. : 24/06/22 à 16h36

Sur prescription du : Dr EL NEIL Hamza

Identité Patient : Mme DOUNIA CHAMSA-DHA

Code Patient : 155472

BILAN :

1 CBU CYTOLOGIE-CULTURE-IDENTIFICATION
2 ATBU ANTIBIOGRAMME

B 90

B 60

TOTAL B : 150

TOTAL HN : 0

0

MONTANT : 226,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : 226,00 DH

Dr. M. BENKIRAN
Pharmacien Biologiste
Centre de biologie des hôpitaux casablanca
Tél: 0522 20 35 35 - 0662 38 03 39

**CENTRE DE BIOLOGIE
DES HÔPITAUX « CBH »**
3, Rue du Colonel Gros - Casablanca
Tél: 05 22 20 35 35 / 05 22 27 66 74
Fax: 05 22 20 35 15

Ofiken®

Céfixime

200mg



16

Comprimés pelliculés

Voie orale



LOT 220623

EXP 02 24 *

PPV 170.00 DH



DURÉE MATIN MIDI SOIR AVANT APRÈS



سوطيما

