

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : [contact@mupras.com](mailto:contact@mupras.com)
- Prise en charge : [pec@mupras.com](mailto:pec@mupras.com)
- Adhésion et changement de statut : [adhesion@mupras.com](mailto:adhesion@mupras.com)

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



## Déclaration de Maladie

N° M21- 070313

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1251 Société : RAM 123663

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : GOTMI GHANDOUR

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 22/06/2022

Nom et prénom du malade : KHALLAF SAADIA

Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : fracture en pompier

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

## VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° M21-70313

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le. Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :



# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22/06/22	C		300	

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture

22/06/22 288,40

22/06/22 242,20

22/06/22 3000

22/06/22 412,00

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue Date Désignation des Coefficients Montant des Honoraires

30.06.22 2 600,00

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien Date des Soins Nombre AM PC IM IV Montant détaillé des Honoraires

### VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

## Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

## SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

## O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H  
25533412 21433552  
00000000 00000000  
D 00000000 G  
35533411 11433553  
B


COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

(Création, remont, adjonction)  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Khadija BENDDANE

Spécialiste en Médecine Interne

Echographie Médicale

Diplômée de la Faculté de Médecine  
de Casablanca

الدكتورة خديجة بندان

طبيبة اختصاصية في الطب الباطني

الفحص بالصدى

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

لا تغيير تاريخ الفحص

Casablanca, le

01/07/22

N KH ALUAF

DAARI A

139,00

α3

DONA

schub ( ) a' nidi

3 mab

wsf

PHARMACIE GHOF  
Dr. HRIOUA LAILA  
Rue 2 N° 116 Bloc (C)  
Quartier Al Qods Sidi Bel  
Casablanca

Dr. Khadija BENDDANE  
Spécialiste en Médecine Interne  
Diplômée Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca  
68, Hay Kafafa, Bd. Mouad Elouhabal  
Sidi Bemoussi - Casablanca  
Tél : 06 22 33 37 / Gsm : 06 62 15 05 4

2002439

04-2023

139,00 DH

2002439

04-2023

139,00 DH

2002439

04-2023

139,00 DH



**Docteur Khadija BENDDANE**  
 Spécialiste en Médecine Interne  
 Echographie Médicale  
 Diplômée de la Faculté de Médecine  
 de Casablanca

الدكتورة خديجة بندان  
 طبية اختصاصية في الطب الباطني  
 الفحص بالصدى  
 خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

لا نغير تاريخ الفحص

Casablanca, le 15/7/22

N KHAUF  
 FARRIA

123,6

Inexium 40  
 1cp 17 à 19h

entre Inexium 20  
 82,12  
 1cp 17

20,90  
 13  
 utomine DS BON  
 1 dose 1mn (3 doses)  
 (+huile d'olive)

Dr. Khadija BENDDANE  
 Spécialiste en Médecine Interne  
 Diplômée Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca  
 68, Hay Katafa, Bd. Mouad Binou Jabal  
 Sidi Berrouss, Casablanca  
 Tél : 05 22 73 33 37 / Gsm : 06 62 15 05 48

DR. HIRIOT  
 Rue 2 N° 14  
 Quartier Goud  
 Casablanca

ZENITH Pharma  
AMM N° 171/16 DMP/21/NNPR



PPV: 20,90 DH

ZENITH Pharma  
AMM N° 171/16 DMP/21/NNPR



PPV: 20,90 DH

بصرف فقط بموجب وصفة طبية  
لائحة II - List II - II

ZENITH Pharma  
AMM N° 171/16 DMP/21/NNPR



PPV: 20,90 DH

SYNTHEMEDIC  
22 rue zoubair benou al souam roches  
noires casablanca

INEXIUM

20 mg

Boite 14

64015DMP/21/NRO P.P.V: 82,10 DH



6 118001 020591

SYNTHEMEDIC  
22 rue zoubair benou al souam roches  
noires casablanca

INEXIUM

40 mg

Boite 14

64115DMP/21/NRO P.P.V: 123,60 DH



6 118001 020607

Docteur Khadija BENDDANE

Spécialiste en Médecine Interne

Echographie médicale

Diplômée de la Faculté de Médecine  
de Casablanca

الدكتورة خديجة بندان

طبيبة اختصاصية في الطب الباطني

الفحص بالصدى

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

Casablanca, le 22/6/22 لا تغير تاريخ الفحص

V KHAUAF SAADIA

Alopiene 210

4790 ar 2-0-2 No T

Belmo 20 (14)

48 ar 1-0-0

TRACET

1-0-1

LIRAPXN

7280 0-0-1

24779 0-0-2

Temp

05/2023  
PPV: 72.DH.90

an endu  
3T

Khadija B. BENDDANE  
Spécialiste en Médecine Interne  
Pharmacie de Casablanca  
Jabal  
Boulevard de la Faculté de Médecine  
Bd. Mouad Brou  
Casablanca  
Tél : 06.62.15.05.45  
Gsm : 06.62.15.05.45  
Gsm : 05.22.73.33.37

68, شارع معاد بن جبل, حي كتافة, سيدي البرنوصي, الطابق الأول, الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.73.33.37 - المحمول : 06.62.15.05.45

3000



Donch VISA (20/04)

**Dr. Khadija BENDANE**  
Spécialiste en Médecine Interne  
Diplômée Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca  
68, Hay Nahaf, Bd. Mouad Bnou Jabal  
Sidi Bernoussi - Casablanca  
Tél : 05 22 73 38 37 / Csm : 06 62 15 05 46

**Pharmacie Path El Khair**  
30, Groupe Al Baida  
Bernoussi - Casablanca  
Tél : 0522 75 56 06



# BELMAZOL® 20 mg

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### a) DENOMINATION

BELMAZOL® 20 mg

### b) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Par gélule :

Oméprazole ..... 20 mg

Excipients : q.s.

Composition de la gélule : sunset jaune (E110), dioxyde de titane (E171), indigo carmin (E132), gélatine.

### c) FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATIONS

Boîtes de 7, 14 et de 28 gélules.

### d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inhibiteur de la pompe à protons (code ATC : A02BC01).

## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Adulte :

- Traitement des ulcères duodénaux.
- Prévention des récidives d'ulcères duodénaux.
- Traitement des ulcères gastriques.
- Prévention des récidives d'ulcères gastriques.
- En association à des antibiotiques appropriés, éradication de *Helicobacter pylori* (H pylori) dans la maladie ulcéreuse gastro-duodénale.
- Traitement des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
- Prévention des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez les patients à risque.
- Traitement de l'œsophagite par reflux.
- Traitement d'entretien des patients après cicatrisation d'une œsophagite par reflux.
- Traitement du reflux gastro-œsophagien symptomatique.
- Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

### Utilisation pédiatrique :

Enfant à partir de 1 an et  $\geq 10$  kg :

- Traitement de l'œsophagite par reflux.
  - Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-œsophagien.
- Enfant de plus de 4 ans et adolescent :
- En association à des antibiotiques, traitement de l'ulcère duodénal consécutif à une infection par *Helicobacter pylori*.

## 3. ATTENTION !

### a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'oméprazole, aux dérivés benzimidazolés ou à l'un des excipients.
- L'oméprazole ne doit pas être administré de façon concomitante avec le néfivir.

### b) MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

#### UTILISER CE MEDICAMENT AVEC PRECAUTION :

- Certains enfants atteints d'affections chroniques peuvent nécessiter un traitement à long terme bien que cela ne soit pas recommandé.
- Un traitement par inhibiteurs de la pompe à protons pourrait légèrement augmenter le risque d'infections

## 4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

### a) POSOLOGIE USUELLE

#### • Adulte :

Traitement des ulcères duodénaux : 1 à 2 gélules de

Prévention des récidives des ulcères duodénaux

Traitement des ulcères gastriques : 1 à 2 gélules de

Prévention des récidives des ulcères gastriques :

gélules de BELMAZOL® 20 mg par jour.

Éradication de *Helicobacter pylori* dans la maladie ulcéreuse gastro-duodénale :

- soit 1 gélule de BELMAZOL® 20 mg + clarithromycine 500 mg + amoxicilline 1000 mg, <sup>2 fois</sup> par jour pendant une semaine,

- soit 1 gélule de BELMAZOL® 20 mg + clarithromycine 250 mg (ou 500 mg) + métronidazole 400 mg (ou 500 mg ou tinidazole 500 mg), chacun 2 fois par jour pendant une semaine,

- soit 2 gélules de BELMAZOL® 20 mg une fois par jour + amoxicilline 500 mg + métronidazole 400 mg (ou 500 mg ou tinidazole 500 mg), chacun des deux 3 fois par jour pendant une semaine.

Si le patient présente encore H pylori après cette thérapie, le traitement peut être répété.

Traitement des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'AINS : 1 gélule de BELMAZOL® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

Prévention des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'AINS chez les patients à risque (âge > 60 ans, antécédents d'ulcères gastriques et duodénaux, antécédent d'hémorragie digestive haute) : 1 gélule de BELMAZOL® 20 mg par jour.

Traitement de l'œsophagite par reflux : 1 à 2 gélules par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement d'entretien des patients après cicatrisation d'une œsophagite par reflux : la dose peut augmenter à 2 gélules de BELMAZOL® 20 mg par jour.

Traitement du reflux gastro-œsophagien symptomatique : 1 gélule de BELMAZOL® 20 mg par jour pendant 4 semaines.

Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison : 3 gélules par jour. Pour des posologies supérieures à 80 mg par jour, la dose journalière devra être divisée et donnée en 2 prises.

#### • Enfant :

Enfant de plus de 1 an et 10 - 20 kg :

Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-œsophagien : la posologie recommandée est de 10 à 20 mg 1 fois par jour pendant 2 à 4 semaines.

Œsophagite par reflux : la posologie recommandée est de 10 à 20 mg 1 fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Enfant de plus de 2 ans et  $\geq 20$  kg :

Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-œsophagien : la posologie recommandée est de 20 à 40 mg 1 fois par jour pendant 2 à 4 semaines.

Œsophagite par reflux : la posologie recommandée est de 20 à 40 mg 1 fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Adolescent et enfant de plus de 4 ans :

Traitement de l'ulcère duodénal associé à une infection par H.pylori :

Poids (15-30 kg) : oméprazole 10 mg + amoxicilline 25 mg/kg de poids corporel + clarithromycine 7,5 mg/kg de poids corporel sont administrés simultanément 2 fois par jour pendant une semaine.

Poids (31-40 kg) : oméprazole 20 mg + amoxicilline 750 mg + clarithromycine 7,5 mg/kg de poids corporel administrés simultanément 2 fois par jour pendant une semaine.

Poids (> 40 kg) : oméprazole 20 mg + amoxicilline 1 g + clarithromycine 500 mg administrés simultanément 2 fois par jour pendant une semaine.

#### • Population particulière :

Insuffisants rénaux : aucun ajustement posologique n'est nécessaire.

Insuffisants hépatiques : une dose journalière de 10 mg-20 mg peut suffire.

Sujets âgés (> 65 ans) : aucune adaptation posologique n'est nécessaire.

DANS TOUS LES CAS VOUS DEVREZ VOUS CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### b) VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale.





# ALGIXENE® 250mg, boîte de 30 gélules

D.C.I : 1920

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

## • Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **ALGIXENE®** et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **ALGIXENE®** ?
3. Comment prendre **ALGIXENE®** ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **ALGIXENE®** ?
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE ALGIXENE® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIRHUMATISME NON STEROÏDIEN - code ATC : M01AE02

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans) :

- En traitement de longue durée de :
  - o certains rhumatismes inflammatoires chroniques,
  - o certaines arthroses sévères;
- En traitement de courte durée de :
  - o certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë),
  - o douleurs aiguës d'arthrose,
  - o douleurs lombaires aiguës,
  - o douleurs aiguës liées à l'irritation d'un nerf, telles que les sciatiques,
  - o douleurs et œdèmes liés à un traumatisme;
- Lors des règles douloureuses.

Ce médicament est indiqué chez l'enfant à partir de 25 kg et capable d'avaler (soit environ à partir de 6 ans), dans certains rhumatismes.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALGIXENE® ?

• **Ne prenez jamais ALGIXENE® dans les cas suivants :**

- Au-delà de 5 mois de grossesse révolue (24 semaines d'aménorrhée),
- Antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),
- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de la gélule,
- Antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,
- Ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien en évolution ou récidivant,
- Maladie grave du foie,
- Maladie grave des reins,
- Maladie grave du cœur,
- Enfant de moins de 25 kg et ne sachant pas déglutir (soit environ de moins de 6 ans), en raison du caractère inadéquat du dosage unitaire.

• **Mise en garde et précaution d'emploi :**

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre **ALGIXENE®** : Les médicaments tels que **ALGIXENE®** pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Grossesse et allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous planifiez une grossesse, demandez de prendre ce médicament.

Grossesse

**Au cours du premier trimestre**

semaines après le 1er jour de

amenée, si nécessaire, à vous pr

**De 1 à 5 mois de grossesse**

médicament ne sera utilisé qu

brève. L'utilisation prolongée d

**Au-delà de 5 mois de grossesse**

d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses

effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur

un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de plus de cinq

mois révolus, parlez à votre gynécologue obstétricien afin qu'une surveillance

adaptée vous soit proposée.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il

convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

**Effets sur la capacité de conduire et l'utilisation des machines :**

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner vertiges,

somnolence et troubles de la vision.

**Informations importantes concernant certains composants de ALGIXENE® :**

Sans objet.

## 3. COMMENT PRENDRE ALGIXENE® ?

Posologie

**Chez l'adulte :** La posologie est fonction de l'indication.

Elle varie de 2 à 4 gélules à 250 mg, soit 500 mg à 1000 mg par jour.

**Chez l'enfant :** se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Mode d'administration

Voie orale.

Les gélules sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau.

Fréquence d'administration

Les gélules sont à prendre au cours d'un repas.

La posologie est à répartir en 1 ou 2 prises.

DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE

MEDICIN.

Durée du traitement

L'utilisation de cette voie d'administration doit être la plus courte possible en

raison des risques de toxicité locale surajoutée aux risques par voie générale.

DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE

MEDICIN.

Si vous avez pris plus de ALGIXENE® que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET

CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

**Si vous oubliez de prendre ALGIXENE® :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de

prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez

plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, **ALGIXENE®** peut provoquer des effets

indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les médicaments tels que **ALGIXENE®** pourraient augmenter le risque de crise

cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral.

« Peut provoquer des réactions allergiques »



# ALGIXENE® 250mg, D.C.I : Naproxène

Veuillez lire attentivement le médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit pour un usage unique.
- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés dans votre pharmacien. Voir la rubrique.

## • Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALGIXENE®
2. Quelles sont les indications
3. Comment prendre ALGIXENE®
4. Quels sont les effets indésirables
5. Comment conserver ALGIXENE®
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE ALGIXENE®

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIRHUMATISMALE.

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte :

- En traitement de longue durée de certains rhumatismes inflammatoires ou certaines arthroses sévères ;
  - En traitement de courte durée de certaines inflammations d'épaule douloureuse aiguë, de douleurs aiguës d'arthrose, de douleurs lombaires aiguës, de douleurs aiguës liées à l'irritation, de douleurs et œdèmes liés à une lésion.
  - Lors des règles douloureuses.
- Ce médicament est indiqué chez l'enfant (à partir de 6 ans).

## 2. QUELLES SONT LES INDICATIONS ALGIXENE® ?

- Ne prenez jamais ALGIXENE®

- Au-delà de 5 mois de grossesse.
- Antécédent d'allergie ou d'asthme ou d'un médicament appartenant à la famille des stéroïdiens, acide acétylsalicylique.
- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de la gélule.
- Antécédents de saignements, de troubles digestifs, de troubles hépatiques, de troubles rénaux, de troubles cardiaques, de troubles du système nerveux.
- Ulcère de l'estomac ou du duodénum.
- Maladie grave du foie.
- Maladie grave des reins.
- Maladie grave du cœur.
- Enfant de moins de 25 kg et moins de 6 ans, en raison du caractère irréversible.

## - Mise en garde et précaution

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ALGIXENE®. Les médicaments tels que ALGIXENE® peuvent augmenter le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que le traitement est prolongé.

# ite de 30 gélules

égalité de cette notice

- Si vous avez d'autres questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit pour un usage unique.
- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés dans votre pharmacien. Voir la rubrique.

## • Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALGIXENE®
2. Quelles sont les indications
3. Comment prendre ALGIXENE®
4. Quels sont les effets indésirables
5. Comment conserver ALGIXENE®
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE ALGIXENE®

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIRHUMATISMALE.

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte :

- En traitement de longue durée de certains rhumatismes inflammatoires ou certaines arthroses sévères ;
  - En traitement de courte durée de certaines inflammations d'épaule douloureuse aiguë, de douleurs aiguës d'arthrose, de douleurs lombaires aiguës, de douleurs aiguës liées à l'irritation, de douleurs et œdèmes liés à une lésion.
  - Lors des règles douloureuses.
- Ce médicament est indiqué chez l'enfant (à partir de 6 ans).

## 2. QUELLES SONT LES INDICATIONS ALGIXENE® ?

- Ne prenez jamais ALGIXENE®

- Au-delà de 5 mois de grossesse.
- Antécédent d'allergie ou d'asthme ou d'un médicament appartenant à la famille des stéroïdiens, acide acétylsalicylique.
- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de la gélule.
- Antécédents de saignements, de troubles digestifs, de troubles hépatiques, de troubles rénaux, de troubles cardiaques, de troubles du système nerveux.
- Ulcère de l'estomac ou du duodénum.
- Maladie grave du foie.
- Maladie grave des reins.
- Maladie grave du cœur.
- Enfant de moins de 25 kg et moins de 6 ans, en raison du caractère irréversible.

## - Mise en garde et précaution

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ALGIXENE®. Les médicaments tels que ALGIXENE® peuvent augmenter le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que le traitement est prolongé.

# ite de 30 gélules

égalité de cette notice

- Si vous avez d'autres questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit pour un usage unique.
- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés dans votre pharmacien. Voir la rubrique.

## • Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALGIXENE®
2. Quelles sont les indications
3. Comment prendre ALGIXENE®
4. Quels sont les effets indésirables
5. Comment conserver ALGIXENE®
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE ALGIXENE®

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIRHUMATISMALE.

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte :

- En traitement de longue durée de certains rhumatismes inflammatoires ou certaines arthroses sévères ;
  - En traitement de courte durée de certaines inflammations d'épaule douloureuse aiguë, de douleurs aiguës d'arthrose, de douleurs lombaires aiguës, de douleurs aiguës liées à l'irritation, de douleurs et œdèmes liés à une lésion.
  - Lors des règles douloureuses.
- Ce médicament est indiqué chez l'enfant (à partir de 6 ans).

## 2. QUELLES SONT LES INDICATIONS ALGIXENE® ?

- Ne prenez jamais ALGIXENE®

- Au-delà de 5 mois de grossesse.
- Antécédent d'allergie ou d'asthme ou d'un médicament appartenant à la famille des stéroïdiens, acide acétylsalicylique.
- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de la gélule.
- Antécédents de saignements, de troubles digestifs, de troubles hépatiques, de troubles rénaux, de troubles cardiaques, de troubles du système nerveux.
- Ulcère de l'estomac ou du duodénum.
- Maladie grave du foie.
- Maladie grave des reins.
- Maladie grave du cœur.
- Enfant de moins de 25 kg et moins de 6 ans, en raison du caractère irréversible.

## - Mise en garde et précaution

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ALGIXENE®. Les médicaments tels que ALGIXENE® peuvent augmenter le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que le traitement est prolongé.

UT : 0622004  
ER : 02/2027  
PU : 47,90 DH

- Si vous avez d'autres questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit pour un usage unique.
- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés dans votre pharmacien. Voir la rubrique.

## • Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALGIXENE®
2. Quelles sont les indications
3. Comment prendre ALGIXENE®
4. Quels sont les effets indésirables
5. Comment conserver ALGIXENE®
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE ALGIXENE®

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIRHUMATISMALE.

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte :

- En traitement de longue durée de certains rhumatismes inflammatoires ou certaines arthroses sévères ;
  - En traitement de courte durée de certaines inflammations d'épaule douloureuse aiguë, de douleurs aiguës d'arthrose, de douleurs lombaires aiguës, de douleurs aiguës liées à l'irritation, de douleurs et œdèmes liés à une lésion.
  - Lors des règles douloureuses.
- Ce médicament est indiqué chez l'enfant (à partir de 6 ans).

## 2. QUELLES SONT LES INDICATIONS ALGIXENE® ?

- Ne prenez jamais ALGIXENE®

- Au-delà de 5 mois de grossesse.
- Antécédent d'allergie ou d'asthme ou d'un médicament appartenant à la famille des stéroïdiens, acide acétylsalicylique.
- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de la gélule.
- Antécédents de saignements, de troubles digestifs, de troubles hépatiques, de troubles rénaux, de troubles cardiaques, de troubles du système nerveux.
- Ulcère de l'estomac ou du duodénum.
- Maladie grave du foie.
- Maladie grave des reins.
- Maladie grave du cœur.
- Enfant de moins de 25 kg et moins de 6 ans, en raison du caractère irréversible.

## - Mise en garde et précaution

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ALGIXENE®. Les médicaments tels que ALGIXENE® peuvent augmenter le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que le traitement est prolongé.

- Si vous avez d'autres questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit pour un usage unique.
- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés dans votre pharmacien. Voir la rubrique.

## • Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALGIXENE®
2. Quelles sont les indications
3. Comment prendre ALGIXENE®
4. Quels sont les effets indésirables
5. Comment conserver ALGIXENE®
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE ALGIXENE®

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIRHUMATISMALE.

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte :

- En traitement de longue durée de certains rhumatismes inflammatoires ou certaines arthroses sévères ;
  - En traitement de courte durée de certaines inflammations d'épaule douloureuse aiguë, de douleurs aiguës d'arthrose, de douleurs lombaires aiguës, de douleurs aiguës liées à l'irritation, de douleurs et œdèmes liés à une lésion.
  - Lors des règles douloureuses.
- Ce médicament est indiqué chez l'enfant (à partir de 6 ans).

## 2. QUELLES SONT LES INDICATIONS ALGIXENE® ?

- Ne prenez jamais ALGIXENE®

- Au-delà de 5 mois de grossesse.
- Antécédent d'allergie ou d'asthme ou d'un médicament appartenant à la famille des stéroïdiens, acide acétylsalicylique.
- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de la gélule.
- Antécédents de saignements, de troubles digestifs, de troubles hépatiques, de troubles rénaux, de troubles cardiaques, de troubles du système nerveux.
- Ulcère de l'estomac ou du duodénum.
- Maladie grave du foie.
- Maladie grave des reins.
- Maladie grave du cœur.
- Enfant de moins de 25 kg et moins de 6 ans, en raison du caractère irréversible.

## - Mise en garde et précaution

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ALGIXENE®. Les médicaments tels que ALGIXENE® peuvent augmenter le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que le traitement est prolongé.

Docteur Khadija BENDDANE

Spécialiste en Médecine Interne

Echographie médicale

Diplômée de la Faculté de Médecine  
de Casablanca

الدكتورة خديجة بندان

طبيبة اختصاصية في الطب الباطني

الفحص بالصدى

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

Casablanca, le .....

22/6/22

لا نغير تاريخ الفحص

U KHALAF FATIMA

Rx 2 fmmx FHP  
(en charge)

Dr. Khadija BENDDANE  
Spécialiste en Médecine Interne  
Diplômée Faculté de Médecine de Casablanca  
68, Hay Katar, Rd. Mouad Bnou Jabal  
Sidi Bernoussi - Casablanca  
Tél : 06.62.15.05.45 - 05.22.73.33.37

CENTRE DE RADIOLOGIE RAYAN  
Dr. Khalil LEBBAR  
RADIOLOGUE



## CENTRE DE RADIOLOGIE RYANE

Dr. LEBBAR Khalil

Bd Baamrani AIN SEBAA Tél:0522768112

IF 40494831 ICE:001667575000062

### F A C T U R E

N° : 206301130

Du : 30/06/2022

Nom patient : M. KHALLAF SAADIA

Médecin prescripteur ; DrKHADIJA BENDDANE

#### Examens

Cotation(Z) Prix Dhs

GENOUX (F+P)

30

600,00

Total

600,00

Arrêtée la présente facture à la somme de ;  
**SIX CENTS DIRHAMS**

 **CENTRE DE RADIOLOGIE  
RYANE**  
Lot. Chabab, Bd. Mohamed Baamrani  
Tél : 0522 76 81 12 - Fax : 0522 76 81 35  
101110880



## Dr. Khalil LEBBAR

- Professeur Ass. de radiologie CHU (Rabat).
- Praticien certifié des hôpitaux Militaires du Val-de-Grâce (Paris).
- Ancien radiologue des hôpitaux Militaires des forces Armées Royales.
- Diplômé en radiodiagnostic et imagerie médicale de la faculté de Nancy

CASABLANCA LE : 30/06/2022

NOM ET PRENOM  
PRESCRIPTEUR

M. KHALLAF SAADIA  
Dr. KHADIJA BENDDANE

## RX DES 2 GENOUX F+P

### RESULTAT

Pincement de l'interligne tibio-fémoral bilatéral prédominant à gauche, portant essentiellement sur le compartiment interne des 2 genoux, avec présence à gauche d'ostéophytes marginaux et condensation des plateaux vertébraux.

### CONCLUSION

Gonarthrose bilatérale classée stade I de Ahlback à droite et stade III à gauche.

#### • I.R.M 1,5 Tesla

~ Corps entier

#### • Scanner 64 barrettes 3D

- ~ Angioscanner
- ~ Biopsie Scanoguidée
- ~ Arthroscanner
- ~ Dentascanner
- ~ Coloscanner
- ~ Enteroscanner

#### • Radiologie Numérisée

#### • Echographie

~ Doppler Vasculaire Artériel et Veineux

#### • Mammographie - Tomosynthèse

~ Repérage stéréotaxique

#### • Panoramique dentaire

#### • Osteodensitometrie.

Confraternellement.

Dr LEBBAR

Centre de Radiologie Rayan  
Dr. Khalil LEBBAR  
RADIOLOGUE