

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement à caractère personnel.

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019



Déclaration de Maladie

N° W21-629550

124356

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : 0586	Société : R.A.M		
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	Autre : Mohamed Zerrouk	
Nom & Prénom : Mohamed Zerrouk			
Date de naissance : 1937			
Adresse : 31, rue 16, cité Inar I Casablanca			
Tél. : 0700 1888 01 Total des frais engagés : 0 Dhs			
Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin : Dr. Amale ELAMANI CARDIOLOGUE Clinique California Casablanca			
Date de consultation : 05/07/2022			
Nom et prénom du malade : Sfia Bouziane			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint			
Nature de la maladie : HTA			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.			
Fait à : Casablanca			
Signature de l'adhérent(e) : 			
Le : 14/07/2022			

H. HAKANI



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/07/22	Consultation	200fr	200fr	INP : DR. M. J. A. J. S. T. Dr. Amale EL ABBADY CARDIOLOGUE Clinique Californie 2, Avenue Casablanca 1000 Casablanca



مصحة "كاليفورنيا" الدار البيضاء

Urgences Médico-Chirurgicales 24h / 24h

مستعجلات 24/24 ساعة

Mme SFia Bon Tissée 05/07/2012

~~273,00~~ x 3 = 819,00

- Exforge 160mg 125 comprimés

~~30,00~~ x 3 = 90,00

- Raudex 75mg 10 comprimés

~~8,75~~ x 2 = 17,50

- Nebulor 5mg 1/2 g 3 comprimés

99,00 درهما

MB790 1024

LOT PER

Prix

99,00

M. Bous
dernier

MB85,00

Dr. A. CARD
Clinique
545, Bd Panoramique
Tél: 0522 50 80 80

6118001030606
EXFORGE
10mg/160mg
28 comprimés pelliculés
PPV : 273,00 DH

ARMACEUTIQUE
Munich

6118001030606
EXFORGE
10mg/160mg
28 comprimés pelliculés
PPV : 273,00 DH

ARMACEUTIQUE
Munich

54. شارع المنظر العام - الدار البيضاء

545 , Boulevard Panoramique - Californie - Casablanca

الفاكس : 0522 50 76 98 - الهاتف : 0522 50 80 80 / 0522 52 55 55 - Fax : 0522 50 76 98

E-mail : cliniquecalifornie@gmail.com - الموقع الإلكتروني : Site web : www.cliniquecalifornie.net

KARDEGIC® 75mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT CAR ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES POUR VOUS.

- Farder cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interroger votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique :

ANTI-THROMBOIQUE/INHIBITEUR DE L'AGGREGATION PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

Ce médicament contient de l'aspirine. KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose appartient à la famille des inhibiteurs de l'aggrégation plaquettaire.

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang.

Indications thérapeutiques :

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est utilisé pour prévenir les récidives d'accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques provoqués par des caillots dans les artères du cerveau ou du cœur.

Votre médecin peut décider d'associer ce médicament à d'autres traitements s'il le juge nécessaire. Ce médicament est réservé à l'adulte. Vous ne devez pas débuter un traitement par KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose sans l'accord de votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Ne prenez jamais KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

- si vous êtes allergique à la substance active (l'acétylsalicylate de DL-lysine) ou à l'un des autres composants contenus dans KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens = AINS).
- si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour.
- si vous avez ou avez déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille (les AINS).
- si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou duodénum.
- si vous avez déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).
- si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements.
- si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.
- si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

Avant de prendre ce médicament

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :

- si vous avez une maladie héréditaire des globules rouges, appelée déficit en G6PD, car des doses élevées d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges.
- si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite).
- si vous avez déjà eu des saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles).
- si vous avez une maladie des reins ou du foie.
- si vous avez une hypertension artérielle (tension artérielle élevée).
- si vous avez des réactions abondantes.

Des syndromes de Reye, pathologies très rares mais présentant un risque vital, ont été observés chez des enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épidémies d'allure grasse) et recevant de l'acide acétylsalicylique. KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents.

Pendant le traitement, des saignements ou des douleurs dans le ventre peuvent survenir. Le risque de survenue de ces effets augmente avec la dose, chez les personnes âgées, chez les personnes de faible poids corporel, chez les personnes ayant déjà souffert d'ulcère de l'estomac et en cas d'association à certains médicaments (voir rubrique 4). « Autres médicaments et KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose »). Consultez immédiatement votre médecin en cas de survenue de tels effets.

Si une intervention chirurgicale est prévue :

L'aspirine augmente les risques de saignements même à très faibles doses, et ce même lorsque la dernière prise de ce médicament date de plusieurs jours. Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de la prise de ce médicament, dans le cas où une opération, même mineure, est envisagée.

Enfants et adolescents

Voir paragraphe ci-dessus « Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin ». KARDEGIC ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents.

Autres médicaments et KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Ce médicament contient de l'aspirine. D'autres médicaments en contiennent. Vous ne devez pas prendre en même temps que KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose d'autres médicaments contenant de l'aspirine ou un médicament de la même famille (les AINS comme, par exemple l'ibuprofène) sans en parler à votre médecin ou à votre pharmacien. L'association de ces médicaments à KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose pourra entraîner un surdosage et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables, notamment les saignements.

VEUILLEZ ATTENTIVEMENT LES NOTICES DES AUTRES MÉDICAMENTS QUE VOUS PRENEZ AFIN DE VOUS ASSURER QUE CES MÉDICAMENTS NE CONTIENNENT PAS D'ASPIRINE ET/OU D'ANTI-INFLAMMATOIRE NON STÉROÏDIEN.

Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose en même temps que :

- un anticoagulant oral (médicament utilisé pour fluidifier le sang) si vous avez un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum,
- un autre médicament à base de ticlopidine ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang), sauf dans certaines situations où votre médecin pourra vous prescrire conjointement de l'aspirine et du clopidogrel,
- un autre médicament à base de benzboromarone ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),
- un autre médicament à base d'anagrelide (médicament utilisé pour diminuer le nombre de plaquettes dans le sang),
- le ticagrelor en dehors des indications validées,
- un autre médicament à base de fibratolide (médicament utilisé pour le traitement d'une maladie dans laquelle les vaisseaux sanguins du foie sont endommagés et obstrués par des caillots sanguins),
- niforadine (médicament utilisé pour traiter l'angine de poitrine).

Informez votre médecin si vous prenez un médicament à base de :

- méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 20 mg /semaine (médicament utilisé pour traiter certains cancers),- topiques gastro-intestinaux, antiacides, agents digestifs ou les ulcères de l'estomac ou du duodénum,
- anticoagulant oral, thrombolytique,
- anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS),
- ticagrelor (dans les indications de colmétamib, ibutinib, un inhibiteur sélectif de la dépression ou les ITR, médicaments minoxidil, informez votre médecin ou tout autre médicament).

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

et d'absorbants (médicament utilisés pour traiter les diarrées) (medicaments utilisés pour fluidifier le sang),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• ticagrelor (dans les indications de colmétamib, ibutinib, un inhibiteur sélectif de la dépression ou les ITR, médicaments minoxidil, informez votre médecin ou tout autre médicament).

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

et d'absorbants (médicament utilisés pour traiter les diarrées) (medicaments utilisés pour fluidifier le sang),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

et d'absorbants (médicament utilisés pour traiter les diarrées) (medicaments utilisés pour fluidifier le sang),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de la fièvre),

• (medicaments utilisés pour traiter la douleur et de

Bouziane, Sfia

ID:

D-naiiss:

ans,

5-Jul-2022 21:15:27

Fréq. Card.: 65 BPM
Int PR: 169 ms
Dur.QRS: 104 ms
QT/QTc: 402/413 ms
Axes P-R-T: 53 26 62

Clinique CALIFORNIE
945, Bd Panoramique California
Télé: 0522.50.76.94 - Fax: 0522.50.76.94

Dr. Amine ELAMKANI
CARDIOLOGUE
Clinique California
945, Bd Panoramique California
Télé: 0522.50.44.44 - Fax: 0522.50.44.44

