

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0009170

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1273

Société : 124702

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : MORCHAD ABBES

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 25/06/2022

Nom et prénom du malade : MORCHAD ABBES

Age :

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

Diabète de type 2 + G.H.C.

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☒ ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Bilan des Actes
25/06/22	C	C	3000fr	Docteur Samia NEJJAR Endocrinologue - Diabétologue Complexe Al Moustakbal, Imm. 107, GH04 Apt. N°2, Sidi Maarouf - Casablanca

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DE LA DECOUVERTE SARL Box 19, Sidi Maarouf, Casablanca Tél: 0521 97 32 23 - Fax: 0522 97 57 44	25/06/22	25780

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
				MONTANTS DES SOINS														
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Samia NEJJAR

Diplômée de la faculté de Médecine de Casablanca
Ancienne interne des Hôpitaux de Paris
(Hôtel Dieu de Paris)

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie
Maladies Métaboliques et Nutrition

Diabète • Goitre • Obésité • Hypertension artérielle
Cholestérol • Stérilité • Trouble de croissance et de
puberté • Pathologie surrénaliennne & hypophysaire
• Pose de Pompe à Insuline •

Avec Rendez-Vous



Casablanca, le 25/6/2022

MORCHID ABBES

1) BENCLAMID (6B)

2) DOUPRAN (2B)

3) FEBREX (1s x 2b) — 4g



الدكتورة ساهية النجار

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء
طبيبة داخلية سابقا بمستشفيات باريس

اختصاصية في أمراض الغدد، السكري، السمنة

• الغدة الدرقية • داء السكري • السمنة • الكوليسترول
• الضغط الدموي • أمراض النمو والبلوغ • العقم
• أمراض الكظران والغدة النخامية

تركيب مضخة الأنسولين

بالموعد

Docteur Samia NEJJAR
Endocrinologue Diabétologue
Complexe Al Moustakbal, Imm. 107, GH 04, appt 2 - Sidi Maârouf - Casablanca
Tél.: 05 22 97 57 35 / 05 20 12 92 04

Dolipran

PARACETAMOL

con

PPV: 10DH20
PER: 03/25
LOT: L1143

COMPOSITION ET PRESENTATION

- Paracétamol.....
 - Excipients : qsp 1 comprimé
- Boîte de 20 comprimés.



mg

PROPRIETES :

Ce médicament est un **antalgique**. Il calme la douleur.
Il est **antipyrétique**. Il fait baisser la température en cas de fièvre.

INDICATIONS :

Ce médicament contient du paracétamol.
Il est indiqué dans les maladies avec douleur et/ou fièvre, telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses, **chez l'adulte et l'enfant à partir de 27 kg : (environ 8 ans).**

CONTRE-INDICATIONS :

- Ne pas utiliser en cas :
- d'allergie connue au paracétamol
 - maladie grave du foie.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Il existe des dosages plus adaptés pour l'enfant de moins de 27 kg : (moins de 8 ans environ).
 - Compte-tenu des posologies recommandées, il est inutile d'alterner la prise d'aspirine et de paracétamol.
- Avant de prendre du paracétamol, il est nécessaire de consulter votre médecin en cas de maladie grave des reins ou du foie.
- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent. Ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol, d'autres médicaments en contiennent.
Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.



Dolipran

PARACETAMOL

con

PPV: 10DH20
PER: 03/25
LOT: L1143

COMPOSITION ET PRESENTATION

- Paracétamol.....
 - Excipients : qsp 1 comprimé
- Boîte de 20 comprimés.



mg

PROPRIETES :

Ce médicament est un **antalgique**. Il calme la douleur.
Il est **antipyrétique**. Il fait baisser la température en cas de fièvre.

INDICATIONS :

Ce médicament contient du paracétamol.
Il est indiqué dans les maladies avec douleur et/ou fièvre, telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses, **chez l'adulte et l'enfant à partir de 27 kg : (environ 8 ans).**

CONTRE-INDICATIONS :

- Ne pas utiliser en cas :
- d'allergie connue au paracétamol
 - maladie grave du foie.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Il existe des dosages plus adaptés pour l'enfant de moins de 27 kg : (moins de 8 ans environ).
 - Compte-tenu des posologies recommandées, il est inutile d'alterner la prise d'aspirine et de paracétamol.
- Avant de prendre du paracétamol, il est nécessaire de consulter votre médecin en cas de maladie grave des reins ou du foie.
- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent. Ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol, d'autres médicaments en contiennent.
Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.



Composition :

Glibenclamide

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonylurée.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors de la grossesse.

- Diabète non compensé avec troubles métaboliques.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Allaitement.

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose ou de déficit en lactase.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...).

Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

Précautions d'emploi :

Comme chez tout diabétique traité par un sulfamide hypoglycémiant :

- L'utilisation de GLIBENCLAMIDE ne dispense pas du régime hypocalorique et/ou hypoglycémique.

- Les contrôles biologiques, glycémiques à jeun et postprandiaux, doivent être régulièrement pratiqués.

- En cas d'intervention chirurgicale ou d'autres causes de décompensation du diabète, le recours à l'insuline doit être envisagé.

- Les patients devront être prudents en cas de conduite et d'utilisation de machines.

- En période périconceptionnelle, un équilibre aussi bon que possible du diabète doit être réalisé afin de réduire le risque malformatif. Une surveillance néonatale de la glycémie est recommandée.

Mode d'emploi et posologie :

Réservé à l'adulte.

Comme pour tout agent hypoglycémiant, les posologies doivent être adaptées à chaque cas particulier.

Forme et présentations :

Boîte de 30 comprimés sécables

Boîte de 60 comprimés sécables

Boîte de 100 comprimés sécables

Liste I (Tableau A)

BENCLA

Glibenclamide
Comprimés

02, 96



LOT 2180
PER 86/86
PPV 36DH20

Composition :

Glibenclamide

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonylurée.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors de la grossesse.

- Diabète non compensé avec troubles métaboliques.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Allaitement.

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose ou de déficit en lactase.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...).

Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

Précautions d'emploi :

Comme chez tout diabétique traité par un sulfamide hypoglycémiant :

- L'utilisation de GLIBENCLAMIDE ne dispense pas du régime hypocalorique et/ou hypoglycémique.

- Les contrôles biologiques, glycémiques à jeun et postprandiaux, doivent être régulièrement pratiqués.

- En cas d'intervention chirurgicale ou d'autres causes de décompensation du diabète, le recours à l'insuline doit être envisagé.

- Les patients devront être prudents en cas de conduite et d'utilisation de machines.

- En période périconceptionnelle, un équilibre aussi bon que possible du diabète doit être réalisé afin de réduire le risque malformatif. Une surveillance néonatale de la glycémie est recommandée.

Mode d'emploi et posologie :

Réservé à l'adulte.

Comme pour tout agent hypoglycémiant, les posologies doivent être adaptées à chaque cas particulier.

Forme et présentations :

Boîte de 30 comprimés sécables

Boîte de 60 comprimés sécables

Boîte de 100 comprimés sécables

Liste I (Tableau A)

BENCLA

Glibenclamide
Comprimés

02, 96



LOT 2180
PER 86/86
PPV 36DH20

Composition :

Glibenclamide

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonylurée.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors de la grossesse.

- Diabète non compensé avec troubles métaboliques.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Allaitement.

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose ou de déficit en lactase.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...).

Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

Précautions d'emploi :

Comme chez tout diabétique traité par un sulfamide hypoglycémiant :

- L'utilisation de GLIBENCLAMIDE ne dispense pas du régime hypocalorique et/ou hypoglycémique.

- Les contrôles biologiques, glycémiques à jeun et postprandiaux, doivent être régulièrement pratiqués.

- En cas d'intervention chirurgicale ou d'autres causes de décompensation du diabète, le recours à l'insuline doit être envisagé.

- Les patients devront être prudents en cas de conduite et d'utilisation de machines.

- En période périconceptionnelle, un équilibre aussi bon que possible du diabète doit être réalisé afin de réduire le risque malformatif. Une surveillance néonatale de la glycémie est recommandée.

Mode d'emploi et posologie :

Réservé à l'adulte.

Comme pour tout agent hypoglycémiant, les posologies doivent être adaptées à chaque cas particulier.

Forme et présentations :

Boîte de 30 comprimés sécables

Boîte de 60 comprimés sécables

Boîte de 100 comprimés sécables

Liste I (Tableau A)

BENCLA

Glibenclamide
Comprimés

02, 96



LOT 2180
PER 86/86
PPV 36DH20

Composition :

Glibenclamide

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonylurée.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors de la grossesse.

- Diabète non compensé avec troubles métaboliques.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Allaitement.

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose ou de déficit en lactase.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...).

Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

Précautions d'emploi :

Comme chez tout diabétique traité par un sulfamide hypoglycémiant :

- L'utilisation de GLIBENCLAMIDE ne dispense pas du régime hypocalorique et/ou hypoglycémique.

- Les contrôles biologiques, glycémiques à jeun et postprandiaux, doivent être régulièrement pratiqués.

- En cas d'intervention chirurgicale ou d'autres causes de décompensation du diabète, le recours à l'insuline doit être envisagé.

- Les patients devront être prudents en cas de conduite et d'utilisation de machines.

- En période périconceptionnelle, un équilibre aussi bon que possible du diabète doit être réalisé afin de réduire le risque malformatif. Une surveillance néonatale de la glycémie est recommandée.

Mode d'emploi et posologie :

Réservé à l'adulte.

Comme pour tout agent hypoglycémiant, les posologies doivent être adaptées à chaque cas particulier.

Forme et présentations :

Boîte de 30 comprimés sécables

Boîte de 60 comprimés sécables

Boîte de 100 comprimés sécables

Liste I (Tableau A)

BENCLA

Glibenclamide
Comprimés

02, 96



LOT 2180
PER 86/86
PPV 36DH20

Composition :

Glibenclamide

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonylurée.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors de la grossesse.

- Diabète non compensé avec troubles métaboliques.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Allaitement.

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose ou de déficit en lactase.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...).

Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

Précautions d'emploi :

Comme chez tout diabétique traité par un sulfamide hypoglycémiant :

- L'utilisation de GLIBENCLAMIDE ne dispense pas du régime hypocalorique et/ou hypoglycémique.

- Les contrôles biologiques, glycémies à jeun et postprandiales, doivent être régulièrement pratiqués.

- En cas d'intervention chirurgicale ou d'autres causes de décompensation du diabète, le recours à l'insuline doit être envisagé.

- Les patients devront être prudents en cas de conduite et d'utilisation de machines.

- En période périconceptionnelle, un équilibre aussi bon que possible du diabète doit être réalisé afin de réduire le risque malformatif. Une surveillance néonatale de la glycémie est recommandée.

Mode d'emploi et posologie :

Réservé à l'adulte.

Comme pour tout agent hypoglycémiant, les posologies doivent être adaptées à chaque cas particulier. Se conformer à la prescription médicale.

Forme et présentations :

Boîte de 30 comprimés sécables

Boîte de 60 comprimés sécables

Boîte de 100 comprimés sécables

Liste I (Tableau A)

Glibenclamide
Comprimé

BENCLAM

02, 96



LOT 21 80
PER 86/86
PPV 36DH20

PROMOPHARM S.A.
Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc

Composition :

Glibenclamide

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonylurée.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors de la grossesse.

- Diabète non compensé avec troubles métaboliques.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Allaitement.

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose ou de déficit en lactase.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...).

Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

Précautions d'emploi :

Comme chez tout diabétique traité par un sulfamide hypoglycémiant :

- L'utilisation de GLIBENCLAMIDE ne dispense pas du régime hypocalorique et /ou hypoglycémique.

- Les contrôles biologiques, glycémies à jeun et postprandiales, doivent être régulièrement pratiqués.

- En cas d'intervention chirurgicale ou d'autres causes de décompensation du diabète, le recours à l'insuline doit être envisagé.

- Les patients devront être prudents en cas de conduite et d'utilisation de machines.

- En période périconceptionnelle, un équilibre aussi bon que possible du diabète doit être réalisé afin de réduire le risque malformatif. Une surveillance néonatale de la glycémie est recommandée.

Mode d'emploi et posologie :

Réservé à l'adulte.

Comme pour tout agent hypoglycémiant, les posologies doivent être adaptées à chaque cas particulier. Se conformer à la prescription médicale.

Forme et présentations :

Boîte de 30 comprimés sécables

Boîte de 60 comprimés sécables

Boîte de 100 comprimés sécables

Liste I (Tableau A)

Glibenclamide
Comprimé

BENCLAM

02, 96



LOT 2180
PER 86/86
PPV 36DH20

PROMOPHARM S.A.
Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc