

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

M22- N° 002781

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6513 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : MAZOUANI ABDERRAHMANE
 Date de naissance : 1936
 Adresse : HAY ESSARA RUE 23 N° 19 EL OULFA
 Tél. : Total des frais engagés : 662,10 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
 Date de consultation : 2 / 8 / 2022
 Nom et prénom du malade : MAZOUANI ABDERRAHMANE
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : ALD - rhumatisme - IRC
 Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / /

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : /

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Dr. Abderrahman Mazouani
Médecin Prescripteur
Oujda - Cité Hassan II - 34000
CASABLANCA - Tél. 05 22 20 45 45

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
2-8 2022		c	170	Dr. Abdelali BENKARIM Médecin Généraliste Oulfa - Cité Assalam Groupe 8 Appt 7 1er Etage CASABLANCA - Tél: 05 22 934 529

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture

PHARMACIE AHMED RAYAN
Dr. MALKI NOUREDDINE
Résidence Cité Assalam ADDOHA
Imm 77 N° 1 EL Oulfa - CA
Tél: 05 22 89 83 34

02.08.22 512,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue Date Désignation des Coefficients Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien Date des Soins Nombre Montant détaillé des Honoraires

AM PC IM IV

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE


H
25533412 21433552
00000000 00000000
D G
00000000 00000000
35533411 11433553
B

Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Abdelali BENKARIM

Médecine générale

Ex-Médecin Attaché à l'Hôpital

Mohamed V

الدكتور عبد العالي بنكرم

الطب العام

طبيب سابق بمستشفى

محمد الخامس

- Diplôme universitaire de diabétologie
- Diplôme d'université santé Travail environnement « Bourdeaux France »
- Diplôme universitaire diététique - Nutrition
- Diplôme universitaire de l'échographie
- ECG

- دبلوم جامعي في أمراض السكري
- دبلوم جامعي في طب العمل « فرنسا »
- دبلوم جامعي في التغذية - نظام الحمية
- دبلوم جامعي في الفحص بالصدى
- التخطيط القلبي

Casablanca, le : 28-02-2022 : الدار البيضاء في :

7950 Mazouan Abdelrahmane

1) carboplas cp

49,40

1g x 21' 15 min une repas

2) cal cénib ry in 1mer

52,00

2) bwin rimul 1. r in 1mer

(99,00 x 2)

2) cedes

63,20

1g x 11 30 min

75,00

1) 24 rtee

1g x 11 21

Levophtic collyre

59,10

للرجال - النساء و الأطفال

PHARMACIE AHMED RAYAN

Dr. Abdelali BENKARIM
Médecin Généraliste
Oulfa - Cité Essalam Groupe 6 Appt 7 1er Etage
CASABLANCA - Tél: 05.22.934.929


Hommes, femmes & enfants

Hay El Oulfa, Cité Essalam, Groupe 6 Imm 44, 1er étage Appt N°7

حي الألفة، المجمع السكني الضحي دار السلام، طابق الرحمة المجموعة H6 عمارة 44 رقم 7 الطابق الأول

Tél.: 05 22 934 938 / 06 48 63 90 23 هاتف:

أوديسس 20 ملغ حبيبات صامدة للأعصاب العصبية في برشامات (أومبرازول)



3. أهمية هذه البشرة الدوائية كاملة قبل أن تتناولوا هذا الدواء. تتضمن معلومات هامة من أجل علاج الأمراض العصبية. إذا كانت لديك أسئلة، فاسأل طبيبك.

4. الاستعمالات العلاجية: يستخدم أوديسس 20 ملغ لعلاج الأمراض الآتية:

• الجذر الكيوي التريتي، يصعد حمض المعدة عبر المريء (الأنبوب الرابط بين الحلق والمعدة) ما يؤدي إلى آلام الانتفاخ والحرق. • فرجة الحلق الأعلى من المصراع (فرجة الأنفاسية) أو فرجة المعدة.

• الفرقة المتعنتة بجرثومة تسبب اللويحة البيضاء (الأموية) Helicobacter pylori. وفي هذه الحالة، قد يصف لك طبيبكم مضادات حيوية لعلاج التعفن وشفاء الفرقة.

• فرقة المعدة المرتبطة بتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. وقد يستعمل أوديسس أيضاً للوقاية من هذه الفرقة إذا كنت تتناول هذه المضادات الالتهابية غير الستيرويدية.

• فربط الحوض في المعدة بسبب تضخم البانكرياس (ملازمة زولنجر-إليسون).

5. عند الأطفال: الأطفال الذين يتجاوز عمرهم سنة واحدة والذين يكون وزنهم يساوي أو أكثر من 10 كلغ.

• الجذر الكيوي التريتي، يصعد حمض المعدة عبر المريء (الأنبوب الرابط بين الحلق والمعدة) ما يؤدي إلى آلام الانتفاخ والحرق. • قد تشمل الأعراض عند الأطفال صعود محتوي المعدة إلى الفم (التقيؤ) والتقيؤ وارتفاع محدود في الوزن.

الأطفال الذين يبلغون من العمر أكثر من 4 سنوات والمرافقين • الفرقة المتعنتة بجرثومة تسبب اللويحة البيضاء Helicobacter pylori. وفي هذه الحالة، قد يصف لك طبيبكم مضادات حيوية لعلاج شفاء الفرقة.

5. الجرعة ونظام أو طريقة تناول. وقد مررت تناول الدواء، وحضر تلقاً على تناول هذا الدواء وفقاً للجرعة التي وصفها لك الطبيب الخاص بك أو الصيدلي، استشر طبيبكم أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

يجد لك طبيبكم عدة إرشادات التي تتناولوها وفترة الاستعمال حسب حالتكم الصحية وسنكم.

كيف تتصرف إذا وجدت أنت أو طفلك صعوبة في بلع البرشامات: • فتح البرشامة وبلع محتواها مباشرة مع نصف كأس من الماء أو صنع الحنوي في ماء غير غازي. أو عصر فواكه يحتوي على كمية قليلة من الحوض (عصير البرتقال أو التفاح أو الأناناس) أو مربي التفاح.

• حرك الخيط دائما قبل شربه (لا يكون الخيط متجانسا) مباشرة بعد التحريك أو قبل انقضاء 30 دقيقة. • لتأكد من شرب الدواء كاملا اشطف فم الكأس بالماء واشربه. • إذا يجب صنع القطع الصلبة أو قضمها لأنها تحتوي على الدواء.

6. موانع استعمال: • لا يجوز أبدا تناول أوديسس 20 ملغ: • إذا كانت لديك حساسية لأومبرازول أو لأي مكونات أخرى يحتوي عليها أوديسس 20 ملغ.

• إذا كانت لديك حساسية لأي مكونات أخرى من مضطحات مضخة البروتون (مثل بانتوبرازول، لانسوبرازول، الرابرابازول إيسومبرازول).

• إذا كنت تأخذ دواء يحتوي على نيفيننافير (الذي يستخدم في حالة الإصابة بغيروس نقص المناعة المكتسبة). • إذا كنت في الحالة التالية: • لا تأخذ أوديسس 20 ملغ إذا كانت لديك شكوك، استشر طبيبكم أو الصيدلي قبل تناول أوديسس 20 ملغ.

7. الأعراض الجانبية: تشمل كافة الأدوية من احتمال أن يكون لهذا الدواء تأثيرات غير مرغوب فيها رغم أن ذلك لا يخص جميع الأشخاص.

• إذا لاحظت أحد هذه الآثار غير المرغوب فيها الفاترة ولكن الخطيرة، توقف عن تناول أوديسس 20 ملغ واستشر طبيبك الفيا الطبيب: • خال فمجان: للتفتيش الطبي على صغبر أو انتفاخ الشفتين والشفتين والفق والجم، أو طمع جلدي، أو فقدان الوعي أو صعوبات في البلع (تفاعلات حساسية خطيرة).

• احمرار الجلد طمع مع بقور أو قشور تلعو الجلد. في بعض الأحيان يمكن أن تكون البثور كبيرة ومصحوبة بتزف في الشفتين والعينين والفم والأف والأعضاء التناسلية. وقد يدل ذلك على وجود متلازمة ستيفنز جونسون أو الحلال الشرة التحري.

• قد تكون الصفرة والبثور والتهب أعراضا لمرض الكبد. • هناك آثار أخرى جانبية غير مرغوب فيها: • آثار جانبية غير مرغوب فيها شائعة (يمكن أن تظهر في حدود شخص واحد من أصل 10):

• الصداع. • زبائر على المعدة أو الأضلاع كالإسهال وآلم المعدة، والإسهال. • وانفاج البطن. • الغثيان أو القيء.

• الألام الحادة في المعدة. • الآثار الجانبية قليلة التردد (يمكن أن تظهر في حدود شخص واحد من أصل 100):

• تورم القدمين والكاحلين. • مشاكل الرؤية (الآرق). • دوخة. ندم ارتجاع وريغة في النوم. • دوار.

• تقريبات أو نتائج اختبارات الدم التي تضبط طريقة اشتغال الكبد. • طمع جلدي، وتورم الجلد والحكة. • شعور بالضعف العام ونقص الحيوية والنشاط.

• آثار غير مرغوب فيها نادرة (يمكن أن تظهر في حدود شخص واحد من أصل 1000): • اضطرابات الدم التي تخفف الحاض عند خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية. • قد تسبب هذه الآثار ضعف في المناعة. • كمحات أو تسهيلات حدوث العدوى.

• الحساسية. وقد تكون أحيانا شديدة جدا، ما في ذلك انتفاخ الشفتين واللسان والحلق والخصى والصفير. • انخفاض مستويات الصوديوم في الدم. وقد يؤدي ذلك إلى ارتداء المشجبات.

• انخفاض مستويات الصوديوم في الدم. وقد يؤدي ذلك إلى ارتداء المشجبات.

• إذا كان لديك بخر أسود (ملون بالدم). • إذا كانت تعاني من الإسهال الحاد أو المستمر، لأن الأمبرازول قد يربط بارتفاع طفيف في الإسهال العصبي. • إذا كانت لديك مشاكل حادة. • إذا قممت بتطوير تفاعل الجلد بعد العلاج بدواء مشابه لأوديسس.

• بلل من مرض المعدة. • يجب إخراج اختبار دم محدد (Chromogranin) • إذا كنت تأخذ أوديسس 20 ملغ لمدة طويلة (أكثر من سنة) فستفقد بفعلم طبيكم عرافقتكم الإسهالية. يجب أن تقوم بصفة كل الأمراض والأحداث الحادة والإسهال الإسهالية عند زيارتك للطبيب.

أخذ مضطحات مضخة البروتون مثل أوديسس 20 ملغ. • خصوصا إذا تعدت عدم العلاج أكثر من سنة. قد يزيد هذا من خطر شعور الكوار والربيع أو العمود الفقري. أخبر طبيبك إذا كان لديك مرض شفاشة العظام أو إذا كنت تأخذ كورتكرويد (corticoides) (والتي يمكن أن تزيد من خطر شفاشة العظام).

• إذا تعرضت لطفح جلدي، حاص في المناطق المعرضة للشمس، أخبر طبيبك في أقرب وقت ممكن. • حيث قد تحتاج إلى التوقف عن تناول أوديسس 20 ملغ. • لا تنس أن تذكر أي آثار ضارة أخرى، مثل الألم في الفم.

• الفاضل: • الأطفال: • يحتاج بعض الأطفال المصابين بأمراض مزمنة إلى علاج طويل الأمد. على الرغم من عدم التوعية بذلك، لا تعطي هذا الدواء للأطفال من سنة 10 أو أقل من 10 كجم.

• الإشعاعات المتعلقة بالسرطان: • إذا كنت تأخذ أوديسس 20 ملغ، فستفقد بفعلم طبيكم عرافقتكم الإسهالية. يجب أن تقوم بصفة كل الأمراض والأحداث الحادة والإسهال الإسهالية عند زيارتك للطبيب.

• إذا لاحظت أحد هذه الآثار غير المرغوب فيها الفاترة ولكن الخطيرة، توقف عن تناول أوديسس 20 ملغ واستشر طبيبك الفيا الطبيب: • خال فمجان: للتفتيش الطبي على صغبر أو انتفاخ الشفتين والشفتين والفق والجم، أو طمع جلدي، أو فقدان الوعي أو صعوبات في البلع (تفاعلات حساسية خطيرة).

• احمرار الجلد طمع مع بقور أو قشور تلعو الجلد. في بعض الأحيان يمكن أن تكون البثور كبيرة ومصحوبة بتزف في الشفتين والعينين والفم والأف والأعضاء التناسلية. وقد يدل ذلك على وجود متلازمة ستيفنز جونسون أو الحلال الشرة التحري.

• قد تكون الصفرة والبثور والتهب أعراضا لمرض الكبد. • هناك آثار أخرى جانبية غير مرغوب فيها: • آثار جانبية غير مرغوب فيها شائعة (يمكن أن تظهر في حدود شخص واحد من أصل 10):

• الصداع. • زبائر على المعدة أو الأضلاع كالإسهال وآلم المعدة، والإسهال. • وانفاج البطن. • الغثيان أو القيء.

• الألام الحادة في المعدة. • الآثار الجانبية قليلة التردد (يمكن أن تظهر في حدود شخص واحد من أصل 100):

• تورم القدمين والكاحلين. • مشاكل الرؤية (الآرق). • دوخة. ندم ارتجاع وريغة في النوم. • دوار.


• تقريبات أو نتائج اختبارات الدم التي تضبط طريقة اشتغال الكبد. • طمع جلدي، وتورم الجلد والحكة. • شعور بالضعف العام ونقص الحيوية والنشاط.

• آثار غير مرغوب فيها نادرة (يمكن أن تظهر في حدود شخص واحد من أصل 1000): • اضطرابات الدم التي تخفف الحاض عند خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية. • قد تسبب هذه الآثار ضعف في المناعة. • كمحات أو تسهيلات حدوث العدوى.

• الحساسية. وقد تكون أحيانا شديدة جدا، ما في ذلك انتفاخ الشفتين واللسان والحلق والخصى والصفير. • انخفاض مستويات الصوديوم في الدم. وقد يؤدي ذلك إلى ارتداء المشجبات.

• انخفاض مستويات الصوديوم في الدم. وقد يؤدي ذلك إلى ارتداء المشجبات.

أوديسس 20 ملغ حبيبات صامدة للأعصاب العصبية في برشامات (أومبرازول)



3. أهمية هذه البشرة الدوائية كاملة قبل أن تتناولوا هذا الدواء. تتضمن معلومات هامة من أجل علاج الأمراض العصبية. إذا كانت لديك أسئلة، فاسأل طبيبك.

4. الاستعمالات العلاجية: يستخدم أوديسس 20 ملغ لعلاج الأمراض الآتية:

• الجذر الكيوي التريتي، يصعد حمض المعدة عبر المريء (الأنبوب الرابط بين الحلق والمعدة) ما يؤدي إلى آلام الانتفاخ والحرق. • فرجة الحلق الأعلى من المصراع (فرجة الأنفاسية) أو فرجة المعدة.

• الفرقة المتعنتة بجرثومة تسبب اللويحة البيضاء (الأموية) Helicobacter pylori. وفي هذه الحالة، قد يصف لك طبيبكم مضادات حيوية لعلاج التعفن وشفاء الفرقة.

• فرقة المعدة المرتبطة بتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. وقد يستعمل أوديسس أيضاً للوقاية من هذه الفرقة إذا كنت تتناول هذه المضادات الالتهابية غير الستيرويدية.

• فربط الحوض في المعدة بسبب تضخم البانكرياس (ملازمة زولنجر-إليسون).

5. عند الأطفال: الأطفال الذين يتجاوز عمرهم سنة واحدة والذين يكون وزنهم يساوي أو أكثر من 10 كلغ.

• الجذر الكيوي التريتي، يصعد حمض المعدة عبر المريء (الأنبوب الرابط بين الحلق والمعدة) ما يؤدي إلى آلام الانتفاخ والحرق. • قد تشمل الأعراض عند الأطفال صعود محتوي المعدة إلى الفم (التقيؤ) والتقيؤ وانزعاج محدود في الوزن.

الأطفال الذين يبلغون من العمر أكثر من 4 سنوات والمرافقين • الفرقة المتعنتة بجرثومة تسبب اللويحة البيضاء Helicobacter pylori. وفي هذه الحالة، قد يصف لك طبيبكم مضادات حيوية لعلاج شفاء الفرقة.

5. الجرعة ونظام أو طريقة تناول. تناولوا الدواء، وحضر تلقاً على تناول هذا الدواء وفقاً للجرعة التي وصفها لك الطبيب الخاص بك أو الصيدلي، استشر طبيبكم أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

يجد لك طبيبكم عدة إرشادات التي تتناولونها وفترة الاستعمال حسب حالتكم الصحية وسنكم.

كيف تتصرف إذا وجدت أنت أو طفلك صعوبة في بلع البرشامات: • فتح البرشامة وبلع محتواها مباشرة مع نصف كأس من الماء أو صنع الحنوي في ماء غير غازي. أو عصر فواكه يحتوي على كمية قليلة من الحوض (عصير البرتقال أو التفاح أو الأناناس) أو مربى التفاح.

• حرك الحليط دائما قبل شربه (لا يكون الحليط متجانسا) مباشرة بعد التحريك أو قبل انقضاء 30 دقيقة. • لتأكد من شرب الدواء كاملا اشطف فم الكأس بالماء واشربه. • إذا يجب مضغ القطع الصلبة أو قضمها لأنها تحتوي على الدواء.

6. موانع استعمال: • لا يجوز أبدا تناول أوديسس 20 ملغ: • إذا كانت لديك حساسية لأومبرازول أو لأي مكونات أخرى يحتوي عليها أوديسس 20 ملغ.

• إذا كانت لديك حساسية لأي مكونات أخرى من مضغطات مضخة البروتين (مثل بانتوبرازول، لانزوبرازول، رابرابازول إيسومبرازول).

• إذا كنت تأخذ دواء يحتوي على نيفيننافير (الذي يستخدم في حالة الإصابة بغيروس نقص المناعة المكتسبة).

إذا كنت في الحالة التالية: • لا تأخذ أوديسس 20 ملغ إذا كانت لديك شكوك، استشر طبيبكم أو الصيدلي قبل تناول أوديسس 20 ملغ.

7. الأعراض الجانبية: تشمل حالات الأذى من احتمال أن يكون لهذا الدواء تأثيرات غير مرغوب فيها رغم أن ذلك لا يخص جميع الأشخاص.

• إذا لاحظت أحد هذه الآثار غير المرغوب فيها الفورية والتادة ولكن الخطيرة، توقف عن تناول أوديسس 20 ملغ واستشر طبيبك الفيا الطبيب: • خال فمجان: للتفتيش الطبي على صغبر أو انتفاخ الشفتين والشفا والقلق أو الجسد، أو طمع جلدي أو فقدان الوعي أو صعوبات في البلع (تفاعلات حساسية خطيرة).

• احمرار الجلد طمع مع بقور أو قشور تلعو الجلد. في بعض الأحيان يمكن أن تكون البثور كبيرة ومصحوبة بتدريز في الشفتين والعينين والفم والأف وأعضاء التناسلية. وقد يدل ذلك على وجود متلازمة ستيفنز جونسون أو انحلال البشرة التخرني.

• قد تكون الصفرة والبثور والتهب أعراضا لمرض الكبد. وهناك آثار أخرى جانبية غير مرغوب فيها: • آثار جانبية غير مرغوب فيها شائعة (يمكن أن تظهر في حدود شخص واحد من أصل 10):

• الصداع. • زبائر على المعدة أو الأضلاع كالإسهال وآلام المعدة، والإسهال. • وانفاج البطن.

• الغثيان أو القيء. • الألام الحادة في المعدة. • الآثار الجانبية قليلة التردد (يمكن أن تظهر في حدود شخص واحد من أصل 100):

• مشاكل الهميم والكاحلين. • تورم الشفاه (الوذم). • دوخة. تدمل ارتجاع وريغة في النوم. • دوار.

• تقريبات أو نتائج اختبارات الدم التي تضبط طريقة اشتغال الكبد. • طمع جلدي، ووزم الجلد والحكة. • شعور بالضعف العام ونقص الحيوية والنشاط.

• آثار غير مرغوب فيها تادرة (يمكن أن تظهر في حدود شخص واحد من أصل 1000): • اضطرابات الدم التي تخفف الحاض عند خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية. • قد تسبب هذه الآثار ضعف في المناعة. • كمحات أو تسهيلات حدوث العدوى.

• الحساسية. وقد تكون أحيانا شديدة جدا، ما في ذلك انتفاخ الشفتين واللسان والحلق والخصي والصفير. • انخفاض مستويات الصوديوم في الدم. وقد يؤدي ذلك إلى ارتداء ملابس.

• إذا كان البرشام يخرج أسود (ملون بالدم). • إذا كانت تعاني من الإسهال الحاد أو المستمر، لأن الأمبرازول قد يربط بارتفاع طفيف في الإسهال الحاد. • إذا كانت لديك مشاكل حادة.

• إذا قممت بتطوير تفاعل الجلد بعد العلاج بدواء مشابه لأوديسس قبل من خمس السعة. • يجب إخبار طبيبك عن استخدامك (Chromogranin) (Chromogranin).

إذا كنت تأخذ أوديسس 20 ملغ لمدة طويلة (أكثر من سنة) فستفقد بفعلم طبيكم عرافقتكم الإسهالية. يجب أن تقوم بصفة كل الأمراض والأحداث الحادة والإسهال الإسهالية عند تناولك للدواء.

أخذ مضغطات مضخة البروتين من أوديسس 20 ملغ. • خصوصا إذا تعدت عدم العلاج أكثر من سنة. قد يزيد هذا من خطر شعور الكواك والربيع أو العود القفري. أخبر طبيبك إذا كان لديك شعور مشابهة للطفح أو إذا كنت تأخذ كورتكرويد (corticoides) (والتي يمكن أن تزيد من خطر مشابهة العظام).

إذا تعرضت لطفح جلدي، حاص في المناطق المعرضة للشمس، أخبر طبيبك في أقرب وقت ممكن. • حيث قد تحتاج إلى التوقف عن تناول أوديسس 20 ملغ. • لا تنس أن تذكر أي آثار ضارة أخرى، مثل آثار في الفم.

الأطفال: • يحتاج بعض الأطفال المصابين بأمراض مزمنة إلى علاج طويل الأمد. على الرغم من عدم التوعية بذلك، لا تعطي هذا الدواء للأطفال من سن سنة أو أقل من 10 كجم.

• الإشعاعات المتعلقة بالسرطان ذات تأثيرات على الأعرف: • نظرا لاحتواء هذا الدواء على السكرين فإنه لا ينبغي استخدامه في حالات حساسية ضد الفركتوز أو متلازمة سوء امتصاص الغلوكوز أو الحلاكة أو نقص في أديم السكر / إيزومالتاز (مرض وراثي نادرة). • التفاعل مع الأدوية وغيرها من التفاعلات: • تناول أوديسس 20 ملغ مع:

• أدوية تتناول أو تناولوا مؤخرا دواء آخر ما في ذلك دواء من وصف طبيكم. أخبر طبيبك بذلك أو الصيدلي. قد تنتج عن تناول أوديسس 20 ملغ تأثيرات على أدوية أخرى. كما أن بعض الأدوية قد يكون لها تأثير على تناول أوديسس 20 ملغ.

• لا يجب أن تتناول أوديسس 20 ملغ عند تناول دواء يحتوي على نيفيننافير (المستخدم لعلاج ما قبل فقدان المناعة المكتسبة). عليك أن تخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أحد الأدوية الآتية: • الكيتوكونازول، الإتراكونازول، الفلوكونازول، والفوركونازول (أدوية تستخدم لعلاج الإصابات الفطرية).

• الديموكسين (المستخدم لعلاج أمراض القلب). • الديانينام (المستخدم في علاج اللق والصرع أو كسماع على ارتجاع الصفات).

• الفينيتوين (المستخدم في الصرع). إذا كنت تتناول الفينيتوين فمن الضروري الخضوع لبراسة الطبيب عند البدء في تناول أوديسس 20 ملغ وعند التوقف عن تناوله.

• مضادات حرق الدم التي تعجل الدم أكثر سهولة مثل الوارفارين أو غيرها من فيتامين ك، ومن الضروري في هذه الحالة الخضوع لبراسة الطبيب عند البدء في استعمال أوديسس 20 ملغ عند التوقف عن تناوله.

• ريفاميسين (المستخدم في علاج داء السل). • أنترايفير (المستخدم في علاج داء فقدان المناعة المكتسبة). • الكاينولاميس (في حالة نزف الأضواء).

• ميلبريتون (مبيد حشري بروتينومي) (المستخدم في علاج الاكتئاب). • ميلسيتالون (المستخدم في علاج النطق). • ساكوبينافير (المستخدم في علاج ما قبل فقدان المناعة المكتسبة). • كلوبيديغريل (المستخدم للوقاية من حصات الدم (الغث).

• Erlotinib (المستخدم في علاج السرطان). • الميتوكتريكس (دواء تستخدم بجرعة عالية في العلاج الكيميائي لعلاج السرطان). • إذا كنت تأخذ دواء جامة من إيزومالكتس، فاجعل.

• إذا كنت تأخذ دواء جامة من إيزومالكتس، فاجعل.

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

DIURIMAT® 2,5 mg, Boîte de 30 comprimés pelliculés
Indapamide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Indapamide (DCI) 2,50 mg
Excipients : Amidon de maïs, lactose monohydraté, sodium laurylsulfate, povidone, talc, stéarate de magnésium, méthylhydroxypropylcellulose, dioxyde de titane, glycérol, polyéthylène glycol 6000, eau purifiée.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose

3. CLASSE PHARMACO THERAPEUTIQUE :

ANTIHYPERTENSEUR DIURETIQUE

(C: système cardio-vasculaire)

4. INDICATIONS

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle.

5. POSOLOGIE :

Posologie

Un comprimé par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION DE VOTRE MEDECIN.

Mode d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

Une seule administration par 24 heures de préférence le matin compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes.

Durée de traitement

SE CONFORMER A LA PRESCRIPTION MEDICALE

5200

hypokaliémie confirmée par le laboratoire, baisse anormale du taux de potassium dans le sang).
Sauf avis contraire de votre médecin, ce médicament ne doit pas être prescrit en association avec le lithium, avec certains médicaments pouvant entraîner des troubles du rythme cardiaque (astémizole, bépripil, érythroncine IV, halofantrine, pentamidine, sultopride, terfenadine, vincamine).

7. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, DIURIMAT® 2,5 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

· Sensation de fatigue (asthénie) surtout en début de traitement.

· Plus rarement nausées, sécheresse de bouche, constipation, maux de tête, anomalie de la perception des sensations du toucher.

· Manifestations de type allergique, rares cas d'éruption cutanée chez les sujets prédisposés aux manifestations allergiques et asthmatiques.

· Sensation de vertige aux changements de position.

· Risque de déshydratation majorée chez les personnes âgées et chez les insuffisants cardiaques.

· Il est possible de constater des variations des paramètres sanguins, notamment une perte excessive de potassium, de sodium, plus particulièrement chez les sujets âgés ou dénutris, une élévation du taux de l'acide urique, du sucre, du calcium ou des modifications de la formule sanguine.

· Votre médecin peut demander de faire pratiquer des examens de laboratoire afin de contrôler ces paramètres. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

CALCINIB® 5 & 10 mg, 14 & 28 comprimés

Bésylate d'Amlodipine



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même s'il présente les mêmes symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet inhabituel, arrêtez de prendre ce médicament et consultez votre médecin ou votre pharmacien.

LOT : 094
PER : NOV 2024
PPV : 49 DE 40

1. Composition du médicament:

CALCINIB® 5 mg :

Bésylate d'Amlodipine Équivalent à 5 mg d'Amlodipine.

Excipients : Cellulose microcristalline, Phosphate de calcium dibasique, Silice colloïdale (Aerosil-200), Amidon glycollate de sodium, Stéarate de magnésium.

CALCINIB® 10 mg :

Bésylate d'Amlodipine Équivalent à 10 mg d'Amlodipine

Excipients : Cellulose microcristalline, Phosphate de calcium dibasique, Silice colloïdale (Aerosil-200), Amidon glycollate de sodium, Stéarate de magnésium.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

L'Amlodipine est un inhibiteur calcique.

3 Indications thérapeutiques :

- Hypertension.
- Angor chronique stable.
- Angor vasospastique (syndrome de Prinzmetal).

4. Posologie :

Voie orale.

Ce médicament est à prendre en une seule prise par jour.

Adulte : Pour l'hypertension et l'angor, la posologie initiale habituelle est de 5 mg de CALCINIB® une fois par jour, qui peut être augmentée jusqu'à une posologie maximale de 10 mg en fonction de la réponse individuelle du patient.

Enfants et adolescents hypertendus de 6 ans à 17 ans : La posologie antihypertensive orale recommandée chez les enfants âgés de 6 à 17 ans est de 2,5 mg une fois par jour comme dose initiale, qui peut être augmentée jusqu'à 5 mg une fois par jour si la pression artérielle souhaitée n'est pas atteinte après quatre semaines.

Populations particulières :

Sujet âgé : CALCINIB® utilisé à des doses similaires montre une bonne tolérance équivalente chez les patients âgés et les patients plus jeunes.

Insuffisance hépatique :

L'amlodipine doit être débutée à la dose la plus faible et augmentée lentement chez les patients atteints d'insuffisance hépatique sévère.

Insuffisance rénale : Les changements des concentrations plasmatiques d'amlodipine ne sont pas corrélés avec le degré d'insuffisance rénale, une posologie usuelle est donc recommandée. L'amlodipine n'est pas dialysable.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION DE VOTRE MEDECIN.

5. Contre indications :

Ne pas prendre CALCINIB® en cas de :

- Hypersensibilité aux dérivés de la dihydropyridine, à l'amlodipine ou à l'un des excipients.
- Hypotension sévère.



Comprimé
Voie orale

CARBOSORB®

Charbon végétal activé, chondrus et huiles essentielles de fenouil

FORME ET PRESENTATION :

Comprimé, boîte de 30 comprimés

COMPOSITION (par comprimé) :

Charbon végétal, chondrus (chondrus crispus) en poudre, argile alimentaire, fructo-oligosaccharide, dioxyde de silice, sucrose, phosphate de calcium; cellulose, amidon, fenouil (foeniculum vulgare) huile essentielle, polyvinyle, magnésium stéarate, carboxyméthylcellulose.

PROPRIETES :

CARBOSORB® est un produit naturel à base de :

- Charbon végétal activé à grande capacité d'absorption des toxines ce qui permet de soulager les patients ballonnés et de faciliter la digestion.
- Chondrus (algue rouge); Argile alimentaire; FOS (Fructo-Oligo-Saccharides); Huiles essentielles de fenouil qui agissent en synergie pour renforcer l'action du



Lot: 220001
À consommer de préférence avant le: 02/2027
PPC: 79,50 DH