

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Matricule : 7044 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : SAKRI Mohamed

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0660591749 Total des frais engagés : 427,80 Dhs

Cachet du médecin :



Date de consultation : 02/07/2022

Nom et prénom du malade : SAKRI Mohamed Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : DPV - + vertige

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 04 AOUT 2022 Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/12/2021	2		Juste	 Dr. Béatrice Léonard

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <i>Pharmacie A. EL JAI</i> <i>Docteur en Pharmacie</i> <i>Rue Attahni Bloc 3, ONCF, No</i> <i>H.M. Casablanca - Tel: 05 22 63 07</i>	02/07/2022	427,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel Thérapeutique nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

CABINET MÉDICAL D'OPHTALMOLOGIE

الدكتورة مبارش لحلو صباح

Dr MBARECHE LAHLOU Sabah

Maladies et Chirurgie des Yeux

Diplômée du CES d'Ophtalmologie

Université de Montpellier France

Ancien Médecin Spécialiste au C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca

Chirurgie Oculaire

Lentilles de Contact

Laser - Angiographie

INP : 091098152



001625125000060

طب العيون



Casablanca, le 2/7/2022

الدكتور لحلونور اليقين

Dr LAHLOU Nourelyakine

Maladies et Chirurgie des Yeux

Diplômé du CES d'Ophtalmologie

Université de Montpellier France

Ancien Médecin Spécialiste au C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca

Ancien Médecin Chef et Chef de Service à l'Hôpital Omar Idrissi Fés

Chirurgie des Paupières et annexes

Chirurgie des Voies lacrymales

INP : 091032979



001626216000091

لا تغير تاريخ الفحص

On ne change pas la Date d'Examen

n° - 5442020 Nour El YAKINE



71 30x6

427,80

TANAKAN 2:

19/07/2022

Pharmacie AL WILAYA
Sofia EL JAI
Docteur en Pharmacie
Rue Attahni, Bloc 3, ONCF, No.
H.M. Casablanca, Tél. 05 22 44 28 94

Dr. Lahou Nour EL YAKINE
Médecin Ophtalmologiste
124, Bd Rahal El Meskini - CASA
Tél. 05 22 44 28 94

124, Bd Rahal el Meskini, 5ème étage, Quartier benjdia Casablanca, CP : 20120

entre MARJANE Liberté, L'OREAL et la Maisons VOLVO

Tél. : 05 22 44 20 64 / 05 22 45 20 64 - Tél. fax : 05 22 44 28 94 - E-mail : lahlu.nourlyakine@gmail.com

en cas d'urgences appelez 0665 07 33 13

obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire :
lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Posologie

3 comprimés par jour, à répartir dans la journée.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre d'eau au moment des repas.

Durée du traitement

Se conformer à l'avis de votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé est susceptible d'effets indésirables, bien que tout le temps sujet : rarement troubles digestifs, cutanés, maux de tête.

Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés dans cette notice, ou si ces effets indésirables deviennent graves, veuillez le faire savoir à votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

La substance active est :

Ginkgo (Ginkgo biloba L.) (extrait quantifié de) titré à 24 % d'hétérosides de ginkgo et 6 % de Ginkgolides-bilobalide 40,00 mg

Pour un comprimé enrobé.

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, talc, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 400, macrogol 6000, dioxyde de titane, oxyde de

71,30

TANAKAN 40 mg, comprimé de l'emballage extérieur ?
Présente sous forme de Boîte de 30.

à quelle cette notice a été mise à jour en 2013.



Imp. AUDIR 40000287-01 07/20 240g

 **IPSEN**
maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Aïn Sebaâ
Casablanca - Maroc

obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire :
lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Posologie

3 comprimés par jour, à répartir dans la journée.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre d'eau au moment des repas.

Durée du traitement

Se conformer à l'avis de votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé est susceptible d'effets indésirables, bien que tout le temps sujet : rarement troubles digestifs, cutanés, maux de tête.

Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés dans cette notice, ou si ces effets indésirables deviennent graves, veuillez le faire savoir à votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

La substance active est :

Ginkgo (Ginkgo biloba L.) (extrait quantifié de) titré à 24 % d'hétérosides de ginkgo et 6 % de Ginkgolides-bilobalide 40,00 mg

Pour un comprimé enrobé.

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, talc, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 400, macrogol 6000, dioxyde de titane, oxyde de

71,30

TANAKAN 40 mg, comprimé de l'emballage extérieur ?
Présente sous forme de Boîte de 30.

à quelle cette notice a été mise à jour en 2013.



Imp. AUDIR 40000287-01 07/20 240g

 **IPSEN**
maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Aïn Sebaâ
Casablanca - Maroc

obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire :
lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Posologie

3 comprimés par jour, à répartir dans la journée.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre d'eau au moment des repas.

Durée du traitement

Se conformer à l'avis de votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé est susceptible d'effets indésirables, bien que tout le temps sujet : rarement troubles digestifs, cutanés, maux de tête.

Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés dans cette notice, ou si ces effets indésirables deviennent graves, veuillez le faire savoir à votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

La substance active est :

Ginkgo (Ginkgo biloba L.) (extrait quantifié de) titré à 24 % d'hétérosides de ginkgo et 6 % de Ginkgolides-bilobalide 40,00 mg

Pour un comprimé enrobé.

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, talc, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 400, macrogol 6000, dioxyde de titane, oxyde de

71,30

TANAKAN 40 mg, comprimé de l'emballage extérieur ?
Présente sous forme de Boîte de 30.

à quelle cette notice a été mise à jour en 2013.



Imp. AUDIR 40000287-01 07/20 240g

 **IPSEN**
maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Aïn Sebaâ
Casablanca - Maroc

obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire :
lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Posologie

3 comprimés par jour, à répartir dans la journée.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre d'eau au moment des repas.

Durée du traitement

Se conformer à l'avis de votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé est susceptible d'effets indésirables, bien que tout le temps sujet : rarement troubles digestifs, cutanés, maux de tête.

Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés dans cette notice, ou si ces effets indésirables deviennent graves, veuillez le faire savoir à votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

La substance active est :

Ginkgo (Ginkgo biloba L.) (extrait quantifié de) titré à 24 % d'hétérosides de ginkgo et 6 % de Ginkgolides-bilobalide 40,00 mg

Pour un comprimé enrobé.

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, talc, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 400, macrogol 6000, dioxyde de titane, oxyde de

71,30

TANAKAN 40 mg, comprimé de l'emballage extérieur ?
Présente sous forme de Boîte de 30.

à quelle cette notice a été mise à jour en 2013.



Imp. AUDIR 40000287-01 07/20 240g

 **IPSEN**
maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Aïn Sebaâ
Casablanca - Maroc

obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire :

lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Posologie

3 comprimés par jour, à répartir dans la journée.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre d'eau au moment des repas.

Durée du traitement

Se conformer à l'avis de votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé est susceptible d'effets indésirables, bien que tout le temps sujet : rarement troubles digestifs, cutanés, maux de tête.

Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés dans cette notice, ou si ces effets indésirables deviennent graves, veuillez le faire savoir à votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

La substance active est :

Ginkgo (Ginkgo biloba L.) (extrait quantifié de) titré à 24 % d'hétérosides de ginkgo et 6 % de Ginkgolides-bilobalide 40,00 mg

Pour un comprimé enrobé.

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, talc, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 400, macrogol 6000, dioxyde de titane, oxyde de

71,30

TANAKAN 40 mg, comprimé de l'emballage extérieur ?
Présente sous forme de Boîte de 30.

à quelle cette notice a été mise à jour en 2013.



Imp. AUDIR 40000287-01 07/20 240g

 **IPSEN**
maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Aïn Sebaâ
Casablanca - Maroc

obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire :
lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Posologie

3 comprimés par jour, à répartir dans la journée.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre d'eau au moment des repas.

Durée du traitement

Se conformer à l'avis de votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé est susceptible d'effets indésirables, bien que tout le temps sujet : rarement troubles digestifs, cutanés, maux de tête.

Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés dans cette notice, ou si ces effets indésirables deviennent graves, veuillez le faire savoir à votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

La substance active est :

Ginkgo (Ginkgo biloba L.) (extrait quantifié de) titré à 24 % d'hétérosides de ginkgo et 6 % de Ginkgolides-bilobalide 40,00 mg

Pour un comprimé enrobé.

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, talc, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 400, macrogol 6000, dioxyde de titane, oxyde de

71,30

TANAKAN 40 mg, comprimé de l'emballage extérieur ?
Présente sous forme de Boîte de 30.

à quelle cette notice a été mise à jour en 2013.



Imp. AUDIR 40000287-01 07/20 240g

 **IPSEN**
maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Aïn Sebaâ
Casablanca - Maroc