

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

N° P19- 0046412

185 AB

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3579

Société : ROYAL AIR MAROC

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : TAIBI MOHAMED

Date de naissance : 1950

Adresse : 18 Rue 25 SENHAJA HAY EL HAYA

CASABLANCA

Tél. : 06.75.15.0.177 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : TAIBI MOHAMED Age : 1950

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affutus dur sy

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 05/08/2022

Signature de l'adhérent(e) :

TAIBI MOHAMED

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/7/92	GS		Gmt	
8/6/92	GS		Gmt	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE EL J. Dr. JAOUI Bouchra Rue 22 N° 35 Hay El Mana Casablanca	22/05/2022	2223,00
PHARMACIE EL J. Dr. JAOUI Bouchra Rue 22 N° 35 Hay El Mana Casablanca	22/05/2022	2223,00
PHARMACIE EL J. Dr. JAOUI Bouchra Rue 22 N° 35 Hay El Mana Casablanca	22/05/2022	2223,00

ANALYSES & BIBLIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	08/06/2029	Pet Scan au 18-FDG	8000,00 Dhs

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adionction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Keppra

Keppra 250 mg comprimé pelliculé
Keppra 500 mg comprimé pelliculé

Lévétiracétam

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes

ID:649148
GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 561,00 DH
6 118001 142606

ID:649148
GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 561,00 DH
6 118001 142606

5. Comment conserver Keppra

ID:649148
GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 561,00 DH
6 118001 142606

us pourriez avoir besoin de la relire. Veuillez, interrogez votre médecin ou

été personnellement prescrit. Ne le personnes. Il pourrait leur être nocif, e leur maladie sont identiques aux

liconque effet indésirable, parlez-en votre pharmacien. Ceci s'applique rable qui ne serait pas mentionné ction 4.

dans quel cas est-il utilisé ions à connaître avant de prendre

ra
ésirables éventuels

e et autres informations

et dans quel cas est-il utilisé

icamente antiépileptique (médicament : d'épilepsie).

l'adolescent à partir de 16 ans présentant une certaine forme d'épilepsie nouvellement diagnostiquée. L'épilepsie est une maladie où les patients ont des crises répétées (convulsions). Le lévétiracétam est utilisé pour la forme d'épilepsie où les crises n'affectent initialement qu'un seul côté du cerveau, mais qui par la suite

Keppra avec d
Vous pouvez
Par précautio
otre traitem

Grossesse et
Si vous êtes
enceinte ou
médecin ave
attentive, vo
nécessaire, a
grossesse.

Vous ne deve
avec votre m
Un risque d'
être complé
L'allaitement

Conduite de
Keppra peut
outil ou une
est plus fréq
de la dose.

Vous ne dev
pas été éta
pas affectée

3. Comme

Veillez à tou
les indicatio
de votre mé
Prenez le no
Keppra doit
fois le soir, a

Monothérapie

Posologie d
Posologie u
Quand vous
médecin vo
recommande
dose usuelle
Par exempl
débuterez p
250 mg le m

FLUOXET® 20 mg, gélules fluoxétine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit par un professionnel de la santé. Il pourra leur être nocif, même si les signes sont très faibles. Il pourra leur être nocif, même si les signes sont très faibles.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUOXET 20 mg, gélules et dans
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament ?
 3. Comment prendre FLUOXET 20 mg, gélules ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver FLUOXET 20 mg, gélules ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE FLUOXET 20 mg, gélules ET DANS QUELS CAS UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: N06AB03

FLUOXET 20 mg, gélules, contient une substance active, la fluoxétine, et fait partie d'un groupe de médicaments appelés antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la sérotonine (ISRS).

Ce médicament vous a été prescrit pour traiter :

Chez l'adulte :

- soit un épisode dépressif,
 - soit des troubles obsessionnels compulsifs,
 - soit la boulimie : **FLUOXET** est utilisé en complément d'une psychothérapie, diminution de la fréquence des crises de boulimie, des vomissements ou de laxatifs.

Chez l'enfant âgé de 8 ans et plus et l'adolescent :

- Un épisode dépressif modéré à sévère qui ne répond pas à une prise en psychothérapie après 4 à 6 séances. Chez les enfants et adolescents présentant un épisode dépressif modéré à sévère, FLUOXET ne devrait être proposé en association avec une prise en charge psychothérapeutique.

Comment FLUOXET fonctionne

Tout le monde possède dans son cerveau une substance appelée sérotonine. Certaines personnes qui sont déprimées, qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs ou de boulimie ont des taux moins élevés de sérotonine que les autres. Le fonctionnement de FLUOXET et des autres ISRS n'est pas totalement expliqué mais ils pourraient aider à augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. Traiter ces maladies est important pour vous aider à vous sentir mieux. Si elle n'est pas traitée, votre maladie peut ne pas disparaître, peut s'aggraver et être plus difficile à soigner.

Il est possible qu'il soit nécessaire que vous suiviez votre traitement pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois afin de vous assurer que les symptômes disparaissent.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLUOXET 20 mg, gélules ?

Ne prenez jamais FLUOXET 20 mg, gélules :

- Si vous êtes allergique à la fluoxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6. Si vous développez une éruption cutanée ou d'autres réactions allergiques (telles que démangeaisons, un gonflement des lèvres ou du visage, ou un essoufflement), arrêtez tout de suite les gélules et contactez votre médecin immédiatement.

- Si vous prenez d'autres médicaments appartenant à la classe des inhibiteurs non sélectifs et irréversibles de la monoamine oxydase (IMAOs) en raison de la survenue possible de réactions graves voire fatales (par exemple l'iproniazide utilisé pour traiter des dépressions).

Le traitement par FLUOXET ne doit être commencé que 2 semaines après l'arrêt de l'IMAO non sélectif et irréversible.
Ne prenez aucun IMAO non sélectif et irréversible pendant au minimum 5 semaines après l'arrêt de votre traitement par FLUOXET. Si FLUOXET vous a été prescrit pendant une longue durée et/ou à des doses élevées, votre médecin devra envisager un intervalle de temps plus long.

- Si vous prenez du métoprolol (pour l'augmentation du risque que votre cœur Faites attention avec FLU~~OXET~~ : Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien, gélules dans les situations suivantes :
 - Problèmes cardiaques

- Début de fièvre, spasme musculaire mental tels que confusion, irritabilité syndrome appelé « syndrome séotonin

ra
né

21499 3
05 2025
180.00

F 2 1 3 4 2 7 1
P 1 2 2 0 2 4
V 1 8 0 0 0

180,00

LOT 212795
EXP 11 2024
PV 180.00

En cas de survenue d'idées suicidaires, n'oubliez pas de parler à votre médecin ou allez directement à l'hopital. Vous pouvez vous faire aider par un ami ou une personne proche qui sait que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'anxiété. Vous pouvez lui demander de vous accompagner si vos symptômes de dépression ou votre anxiété s'aggravent, ou si vous avez des idées suicidaires.

Enfants et adolescents

Enfants et adolescents de 8 à 18 ans :

Les patients de moins de 18 ans présentent que tentative de suicide, pensées suicidaires, agressivité, comportement d'opposition et de médicaments. FLUOXET ne doit être utilisé qu'à 18 ans que dans le cadre du traitement (association à une psychothérapie) et ne doit pas être utilisé dans l'adolescence. Les données de sécurité d'emploi à long terme de la puberté, le développement psychique et social des patients de cette tranche d'âge sont limitées. À 18 ans il est possible que votre médecin souffre d'épisodes dépressifs modérés. Si il/elle décide que c'est le cas, FLUOXET à un patient de moins de 18 ans, adressez-vous à lui. Vous devez informer votre médecin si de ce fait apparaît ou si élimine

énumérées ci-dessus apparaît ou s'aggrave.

Cabinet de Neurologie

Dr Adil ARAQI-HOUSSAINI

Neurologue

Electro-encéphalogramme (EEG)

Vidéo EEG

Electro-Neuro-Myogramme (EMG)

اقامة الالتفات - زاوية براهيم الروداني والتحاس النحوي - الطابق الثاني فوق البنك العقاري والسياحي - المعاريف - الدار البيضاء

Résidence Infitah - Angle Brahim Roudani et Nahass Nahoui (Ex Pelvoux) 2^{ème} étage- Maarif- Casablanca

Tel/Fax : 0522 25 02 02 / 05 222 555 66 - Whatsapp : 06 23 819 721

Email : adilaraqi@hotmail.com Site web : www.neurologue.ma



عيادة أمراض الدماغ والأعصاب

د. عادل العراقي الحسيني

أخصائي في أمراض الدماغ والأعصاب

التحفيظ الظاهري بالدماغ (الشبكية)

التحفيظ الظاهري بالللاعصاب والاعصاب

اقامة الالتفات - زاوية براهيم الروداني والتحاس النحوي -

Résidence Infitah - Angle Brahim Roudani et Nahass Nahoui (Ex Pelvoux) 2^{ème} étage- Maarif- Casablanca



casablanca le : 08/06/2022

TAIBI MOHAMMED

72 ANS

LESION TEMPORAL GAUCHE ENCEPHALIQUE

AC ANTI APHYSISINE POSITIFS

PARANEO? LESION SECONDAIRE?

PET SCAN

Dr. ADIL ARAQI-HOUSSAINI
Neurologue EEG ENG EMG
Résidence Infitah - Angle Brahim Roudani et
Nahass Nahoui 2^{ème} étage, Maarif- Casablanca
Tel: 0522 25 02 02 / 05 222 555 66
GSM: 06 23 819 721

Dr. ADIL ARAQI-HOUSSAINI
Neurologue EEG ENG
Résidence Infitah - Angle Brahim Roudani et
Nahass Nahoui 2^{ème} étage, Maarif- Casablanca
Tel: 0522 25 02 02 / 05 222 555 66
GSM: 06 23 819 721

Dr. BENDAOUD Hamza
Médecin Nucléaire
200, Bd Ben Youcef 09178
Té: 0522 25 02 02 / 05 222 555 66
GSM: 06 23 819 721
9 Rue Tamesn-
07 00 10 10 2



Cabinet Dr. BENDAOUD
Médecine Nucléaire

PETSCAN · SCINTIGRAPHIE · IRATHERAPIE

Petscan
Scintigraphie : Osseuse · Thyroïdienne · Parathyroïdienne · Rénale · Pulmonaire · Myocardique · à la MIBG
Lymphoscintigraphie · Détection de ganglion sentinelle · Fraction d'éjection isotopique · ostéoscan
Irathérapie : Hospitalisation pour cancers thyroïdiens · Ambulatoire pour hyperthyroïdies

DUPLICATA

Casablanca, le 08/06/2022

Nom et Prénom Mr. TAIBI MOHAMED

Médecin Traitant Dr. IRAQUI ADIL

PETSCAN AU ^{18}F -FDG

Contexte clinique :

Patient âgé de 72 ans, présentant une lésion cérébrale temporaire gauche → Bilan d'extension.

Technique :

Examen réalisé avec une machine PETSCAN GE « **DISCOVERY IQ** » mise en marche en Juillet 2020. Acquisition d'un balayage corps entier, 100 minutes après injection intraveineuse d'une activité de 180MBq de ^{18}F -FDG couplé à un scanner pour correction de l'atténuation et repérage anatomique.

Poids : 75 Kg / Glycémie à jeûn : 0.87 g/l / DLP : 1397.72mGy / CTDI : 7.67mGy

Résultats :

A l'étage cérébral :

- Parenchyme cérébral de captation hétérogène, avec discret rehaussement focal temporal gauche (SUVmax à 6.27).
- L'IRM reste l'examen de référence pour l'exploration de cet étage.

A l'étage cervico-thoracique :

- Absence d'hypermétabolisme suspect de malignité au niveau des muqueuses ORL et des parenchymes pulmonaires.
- Absence d'hypermétabolisme suspect au niveau des aires ganglionnaires cervicales, médiastinales et axillaires.

A l'étage abdomino-pelvien :

- Bruit de fond hépatique de référence : SUVmax à 1.72
- Captation hépatique homogène.
- Hypermétabolisme colique diffus et homogène, sans rehaussement focal, d'allure fonctionnelle.
- Absence d'hypermétabolisme abdomino-pelvien, viscéral ou ganglionnaire, suspect de malignité.

Sur le plan ostéo-médullaire :

- Absence d'hypermétabolisme ostéo-médullaire suspect de malignité sur l'ensemble du volume exploré.

Conclusion :

L'examen de ce jour met en évidence :

1. **Un parenchyme cérébral de captation hétérogène, avec discret rehaussement focal temporal gauche, à confronter aux données de l'imagerie dédiée. L'IRM reste l'examen de référence pour l'exploration de cet étage.**
2. **L'absence d'anomalie de captation du FDG sur le reste du volume exploré**

Sensible à votre confiance

Dr. BENDAOUD

200

Bd Ibnou Sina

CASA

Tél: 0522 94 91 59

99

Tamesna

100

09 18 56 00 00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00



Cabinet Dr. BENDAOUD
Médecine Nucléaire

PETSCAN - SCINTIGRAPHIE - IRATHERAPIE

Petscan
Scintigraphie : Osseuse - Thyroïdienne - Parathyroïdienne - Rénale - Pulmonaire - Myocardique - à la MIBG
Lymphoscintigraphie - Détection de ganglion sentinelle - Fraction d'éjection isotopique - ostréoscan
Irathérapie : Hospitalisation pour cancers thyroïdiens - Ambulatoire pour hyperthyroïdiens

Date: 01/08/2022

FACTURE

NO. 00546/2022

FACTURÉ A

Mr. TAIBI MOHAMMED

DÉTAIL DE PAIEMENT

Mode de règlement: CHEQUE

Organisme: MUPRAS

Montant: HUIT MILLES DIRHAMS

DATE DE L'EXAMEN: 08-06-2022

DESCRIPTION	MONTANT
PET SCAN AU 18-FDG	8000,00 DHS
TOTAL	8000,00 DHS

Dr. BENDAOUD
Médecin Nucléaire
200, Bd Ibnou Sina, Angle rue Tamesna
CASA - Tél: 0522 94 00 09 Rue Tamesna
0911656577