

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

M22- 0007717

125412

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule : 3105	Société : RAM		
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : HOUARI mohamed			
Date de naissance : 01.01.1951			
Adresse : cité Djalma, Jamiia 1 Rue 2 N° 3 Casablanca			
Tél. : 06 69 06 11 40 Total des frais engagés :Dhs			

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :			
Date de consultation : 05.08.2019			
Nom et prénom du malade : HOUARI khadija Age:			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie :			
Affection longue durée ou chronique : <input type="checkbox"/> ALD <input type="checkbox"/> ALC Pathologie :			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/08/22	Chirurgie	300,-		Docteur ENNIS SALVADOR Spécialiste orthopédique et Traumatologique de la main et du membre supérieur Membre de l'Ordre des Médecins de l'Ordre des Médecins de la République du Congo
	Plâtre	1200,-		

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
HARMACIE BISMILLAH Dr. LAHLOU KHALDI ILHAM Sous le Roi Mohamed VI - Casablanca Tél: 0522 29 19 98	05/08/2022	1490,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
<i>RADIOLOGIE 64, Rue Charles de Gaulle Casablanca Tél : 05 22 27 02 75</i>	05.08.22	Rx	600,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Practicien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
OCAVME MEDICAL MATERIEL MEDICAL Vente en Gros et à la Grosse 7, Rue Lakcez Arjoun-Casablanca 0522 86 37 17/0522 86 39 89 0522 86 39 89	25/08/22			-		110,28

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000



[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

clinique
mers
sultan



مصحة
مرس
السلطان

RTIERSI KHADISSE

110,28 ₦

(1)

cheville

sample de

LOCAMED SERVICE
MATERIEL MEDICAL

Vente en Magasin
7 Rue Lahzen Ariouet-Casablanca
Tél: 0522 86 37 17 / 0522 86 16 39
Sous Tél: 0522 86 39 89

98.00 ₦

(2)

HFO R

rigide (rigide)

13.20 ₦

(3)

PHARMACIE BI-MITALLAH
Dr. JAHLOUKA ZI TUHAM
1552, Bd. Mohamed V Casablanca
Tél: 05 22 21 22 22

Algik
gen + 3

LOT 21D051
EXP 11/24
PP 13DH20

(4)

02 beginns

T=1490,70 ₦

URGENCES 24H/24H

64. شارع عمر ادريسي (قرب حدائق مروخ) - الدار البيضاء - الفاكس 05 22 26 79 42

64, Bd Omar El Idrissi (en face du jardin Murdoch) - Casablanca - Fax : 05 22 26 79 42

Tél.: 05 22 27 72 72 (L.G) - 05 22 46 72 00/01/02/03 - 05 22 46 72 09 - 05 22 46 72 05

E-mail : cliniquemersultan@gmail.com - cms@cliniquemersultan.com

www.cliniquemersultan.com / ICE : 001728360000010

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér-

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.

LOT N°
EXP.
PPV.

21207A
11/2023
98-50 DH

dans des seringues

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér-

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.

LOT N°
EXP.
PPV.

21207A
11/2023
98-50 DH

dans des seringues

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.



Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér-

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.

LOT N°
EXP.
PPV.

21207A
11/2023
98-50 DH

dans des seringues

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér-

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.

LOT N°
EXP.
PPV.

21207A
11/2023
98-50 DH

dans des seringues

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér-

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.

LOT N°
EXP.
PPV.

21207A
11/2023
98-50 DH

dans des seringues

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér-

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.

LOT N°
EXP.
PPV.

21207A
11/2023
98-50 DH

dans des seringues

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér-

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.

LOT N°
EXP.
PPV.

21207A
11/2023
98-50 DH

dans des seringues

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér-

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.

LOT N°
EXP.
PPV.

21207A
11/2023
98-50 DH

dans des seringues

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér-

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.

LOT N°
EXP.
PPV.

21207A
11/2023
98-50 DH

dans des seringues

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér-

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.

LOT N°
EXP.
PPV.

21207A
11/2023
98-50 DH

dans des seringues

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér-

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.

LOT N°
EXP.
PPV.

21207A
11/2023
98-50 DH

dans des seringues

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér-

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.

LOT N°
EXP.
PPV.

21207A
11/2023
98-50 DH

dans des seringues

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér-

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.

LOT N°
EXP.
PPV.

21207A
11/2023
98-50 DH

dans des seringues

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

HIBOR® 3.500 U.I. Anti-Xa 0,2 ml

Bemiparine sodique

Le principe actif est la bémiparine sodique. Il se présente sous forme de seringues pré-remplies. Chaque seringue de 0,2 ml contient 3500 UI anti-Xa de bér-

Les excipients sont : Eau pour injectables quantité suffisante pour 0,2 ml.

Nom et adresse de l'exploitant :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI -Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC

Nom et adresse du fabricant :

LABORATOIRE ROVI CONTRACT MANUFACTURING, S.L.

Julián Camarillo, 35

28037 MADRID ESPAGNE

1. QU'EST CE QUE HIBOR 3500 UI ET DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

HIBOR 3500 UI se présente en étuis de 2,10 et 30 seringues pré-remplies de 0,2 ml de solution injectable. La bémiparine sodique appartient au groupe de médicaments dénommé anti-thrombotiques. Ces médicaments sont utilisés pour la prévention et l'apparition de caillots sanguins (thrombus).

Sous prescription médicale, ce médicament est indiqué :

- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients soumis à une chirurgie orthopédique.
- En prévention des accidents thromboemboliques chez les patients non soumis à une chirurgie, présentant un risque élevé.
- En prévention secondaire de la récurrence du thromboembolisme veineux chez les patients souffrant d'une thrombose veineuse profonde avec facteurs de risque transitoires.
- En prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

2. AVANT D'UTILISER HIBOR 3500 UI

Lire attentivement les instructions du paragraphe 3, (« Comment utiliser HIBOR 3500 UI »)

Ne pas utiliser HIBOR 3500 UI

- Si vous êtes allergique à la bémiparine sodique, ou l'héparine.
- Si vous soupçonnez ou vous présentez des antécédents de diminution des plaquettes (thrombopénie) induite par l'héparine.
- Si vous souffrez d'une maladie ou d'une situation qui présente un risque d'hémorragie, par exemple des troubles importants de la coagulation sanguine.

LOT N°
EXP.
PPV.

21207A
11/2023
98-50 DH

dans des seringues

clinique
mers
sultan



مصحة
مرس
السلطان

N°
N° TSC si
Chot. jé
Nest 108/22

Réf. de la clinique

de E

TELE/0522267942
Casablanca - Maroc
Rue de La Latine et Traumatologique
Quartier des Héros, 2ème Etage
Tél.: 05 22 86 29 11 / Urgence: 06 61 21 03 88

URGENCES 24H/24H

64. شارع عمر الادريسي (قرب حديقة مردوخ) - الدار البيضاء - الفاكس 05 22 26 79 42
64, Bd Omar El Idrissi (en face du jardin Murdoch) - Casablanca - Fax : 05 22 26 79 42
الهاتف : 05 22 27 72 72 (L.G) - 05 22 46 72 00/01/02/03 - 05 22 46 72 09 - 05 22 46 72 05
E-mail : cliniquemersultan@gmail.com - cms@cliniquemersultan.com
www.cliniquemersultan.com / ICE : 001728360000010

clinique
mers
sultan



مصحة
مرس
السلطان

le 05/08/22

Mrs MARSI Khadija

Présente fracture de
bras sur ENFANT Sarah
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
13 Rue de La Lande Angle Bd Amivot
Quartier des Hôpitaux 2ème étage
Tél.: 05 22 86 28 11 / Urgence: 05 22 03 88

qui nécessite un plâtre.

Dr. C. C. T.
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
13 Rue de La Lande Angle Bd Amivot
Quartier des Hôpitaux 2ème étage
Tél.: 05 22 86 28 11 / Urgence: 05 22 03 88

URGENCES 24H/24H

64، شارع عمر الادريسي (قرب حدائق مروخ) - الدار البيضاء - الفاكس 42

64, Bd Omar El Idrissi (en face du jardin Murdoch) - Casablanca - Fax : 05 22 26 79 42

Tél.: 05 22 27 72 72 (L.G) - 05 22 46 72 00/01/02/03 - 05 22 46 72 09 - 05 22 46 72 05

E-mail : cliniquemersultan@gmail.com - cms@cliniquemerssultan.com

www.cliniquemersultan.com / ICE : 001728360000010

clinique
mers
sultan



مصحة
مرس
السلطان

605108122

M TAC SSI Khadija

Rx 2 pills

A

RADIOLOGIE MERS SULTAN
64, Rue Omar El Idrissi
Tél : 05 22 27 01 79

F+

P

PHARMACIE NINA SALAH
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Oncologie Pédiatrique - Radiologie - 05 22 27 01 79

URGENCES 24H/24H

64 شارع عمر الادريسي (قرب حديقة مروخ) - الدار البيضاء - الفاكس 05 22 26 79 42
64, Bd Omar El Idrissi (en face du jardin Murdoch) - Casablanca - Fax : 05 22 26 79 42
الهاتف : 05 22 27 72 72 (L.G) - 05 22 46 72 00/01/02/03 - 05 22 46 72 09 - 05 22 46 72 05
E-mail : cliniquemersultan@gmail.com - cms@cliniquemersultan.com
www.cliniquemersultan.com / ICE : 001728360000010

**clinique
mers
sultan**



مصحة
مرس
السلطان

Le 05/08/22

Mme MTAISI Khadija

Reg - le semm - de 300,- DH

(main cert abn)

Ren - consultation + 100,- DH

Couille Des Cert abn)

Ren dentre .



URGENCES 24H/24H

64. شارع عمر الادريسي (قرب حدائقة مرسوخ) - الدار البيضاء - الفاكس 05 22 26 79 42

64, Bd Omar El Idrissi (en face du jardin Murdoch) - Casablanca - Fax : 05 22 26 79 42
الهاتف : 05 22 27 72 72 (L.G) - 05 22 46 72 00/01/02/03 - 05 22 46 72 09 - 05 22 46 72 05

E-mail : cliniquemersultan@gmail.com - cms@cliniquemersultan.com

www.cliniquemersultan.com / ICE : 001728360000010



F A C T U R E

N° **8 247** / 2022 du **05/08/2022**

Nom patient	MTALSI KHADIJA	Entrée 05/08/2022	Sortie 05/08/2022
Prise en charge	PAYANT		

	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
<i>PRESTATIONS INTERNES</i>				
RX DES DEUX PIEDS (F+P)	1,00		600,00 Sous-Total	600,00 600,00
Total Frais Clinique				600,00

<i>Arrêtée la présente facture à la somme de :</i> SIX CENTS DIRHAMS	Total général	600,00
--	----------------------	---------------

Encaissements	Espèces 600,00	Total encaissé 600,00	Solde 0,00

RADIOLOGIE MERS SULTAN
 64, Rue Omar El Idrissi
 Casablanca
 Tél : 05 22 27 72 72



Locamed

Santé & Confort

Facture: FN22-133187

MATÉRIEL MÉDICAL

CASABLANCA Le, 05/08/2022

DEPOT CASA PV

Agent commercial : NAIMA.56

Mode de règlement :

ESPECE : 110.28

ICE CLIENT :

INP CLIENT :

N° CLIENT : C22-0066402

MME MTALSI KHADIJA

CASA
0656080426

Code Article	Code TVA	Désignation	Qté	P.U.TTC	Remise %	P.U. Net .TTC	Montant TTC
333M	20	CHEVILLERE RAYEE SPORT TM	1	110.00	0	110.00	110.00

Code	Base	Taux	Montant
20	91.67	20	18.33
Total	91.67		18.33

Arrêtée la présente Facture à la somme de
TTC:

**CENT DIX DIRHAMS VINGT-HUIT
CENTIMES.**

Total HT 91.67

Total TVA 18.33

Droit timbre 0.28

Total TTC 110.28

LOCAMED SERVICE
MATERIEL MEDICAL
Vente en Magasin
7,Rue Lahcen Arjoun-Casablanca
Tel: 0522 86 37 17/0522 86 16 83
0522 86 39 89

Call Center 05 37 63 27 28 / 05 22 86 22 22 - info@locamed.ma - www.locamed.ma

LOCAMED SERVICE S.A.R.L AU CAPITAL 17.800.000 DHS - C.N.S.S : 2445642 - R.C. : 30269 - Patente : 25103476 - I.F. : 3315150

Siège Social : 11, rue Mamounia (ex CTM) - Rabat Siège Administratif : Angle Av. Med VI et Av. El Haouz - Rabat - Maroc

Tél. : 05 37 63 08 07 / 05 37 63 26 00 - Fax : 05 37 63 00 86 - ICE : 001526686000016 - info@locamed.ma - www.locamed.ma

CASABLANCA

Arjoun: 7, rue Lahcen Arjoun [face hôpital 20 Août], quartier des Hôpitaux.

Tél: 05 22 86 39 89/05 22 86 16 83/05 22 86 37 17

Ghandi: 60, Boulevard Ghandi, quartier Essalam Tél : 05 22 94 20 43/05 22 86 22 22

Goulmima: 627, rue Goulmima Casa-Anfa [à proximité hôpital My Youssef] Tél : 05 22 20 20 98/05 22 20 21 04

Hôpitaux: 46, rue des hôpitaux.Tél : 05 22 47 63 70/05 22 47 48 30

RABAT

Arrabit Center : Av. Nations-Unies, Al Abtal, Inaoui et Omar Ibn Al Khattab, Agdal. Tél: 05 37 68 13 12

Zaer : Angle Av. Mohammed VI et Av El Haouz. Tél : 05 37 63 27 28 / 05 37 63 26 05

Mamoudzou : 50,56 900, Impression Avenue, Mamoudzou Tél : 06 77 00 00 00

MOHAMMEDIA Magasin N°4 immeuble B, place Mohammed V, résidence du Centre. Mohammedia Tél : 05 23 31 71 84

MARRAKECH Avenue, Yaacoub el Mansour N°:2 Résidence Ahlam Guéliz [près de centre Américain] Tél : 05 24 43 15 00 / 05 24 43 14 30

AGADIR Marjane Agadir, Avenue Mohammed V, Founty, Agadir Tél : 05 28 38 67 49

KÉNITRA Angle Avenue Ahmed Diori et Avenue Moulay Abderrahmane Tél : 05 37 36 74 28/05 37 37 74 75

FÈS Angle Av. des FAR et rue Ahmed Chibli [en face de central banque chaabi] Tél : 05 35 62 51 62/05 35 62 51 61

MEKNÈS 16, Avenue Amir Moulay Abdellah Manzeh , Meknes [à côté de Polyclinique Alaoui] Tél : 05 35 52 83 13

TANGER 6, résidence Saghinia 2, Av. Sidi Mohamed Ben Abdellah Quartier Iberia , Tanger Tél : 05 39 33 55 40/05 39 37 23 67



Casablanca, le 05/08/2022

► I.R.M 1,5T

► Scanner 16 Barretes

- 3D Corps Entier

- Angio Scanner
Corps Entier

► Echographie

- 2D / 3D / 4D

- Echo doppler couleur

- Echo guidée

► Biopsie

- Sconnoguidée

- Echo guidée

► Radiologie

Interventionnelle

► Radiologie Standard

Numérisée

PATIENTE : MTALSI KHADIJA

Examen : RADIO DES DEUX PIEDS F+P

RESULTAT :

- Trame osseuse déminéralisée.
- Calcification en projection de la pointe de la malléole interne gauche.
- Epine calcanéenne gauche.
- Parties molles de morphologie normale

En vous remerciant de votre confiance

Dr DOUMA HANANE

Dr. DOUMA Hanane
Médecin Radiologue
Clinique Mers Sultan
64, Bd. Omar El Idrissi Casablanca
Tél : 05 22 46 72 00

URGENCES 24H/24H

شارع عمر الادريسي (قرب حديقة مردوخ) - الدار البيضاء - الفاكس 05 22 26 79 42

64, Bd Omar El Idrissi (en face du jardin Murdoch) - Casablanca - Fax : 05 22 26 79 42

Tél.: 05 22 27 72 72 (L.G) - 05 22 46 72 00/01/02/03 - 05 22 46 72 09 - 05 22 46 72 05

E-mail : cliniquemersultan@gmail.com - cms@cliniquemersultan.com / www.cliniquemersultan.ma / ICE : 001728360000010

MCE 3105

MTALSP KHADJAT

Objet : causes et
circonstances

Je vous informe que suite à une chute
d'escaliers de La maison , j'ai eu
une fracture , qui nécessite une
consultation en urgence .

Mme.

