

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

ROYAL AIR MAROC

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 09372

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

CHOUAL ABDELGHANI

Date de naissance :

11/11/1965

Adresse :

17 DS CHABAB EL AUA

Tél. :

662 04 8528 Total des frais engagés : 1265,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr HA BELHADJ BENSAM

Endocrinologue Diabétologue

Rue SAFI, Imm. E MAIL 1 Etg

Appt 4 Mohammedia

Tel : 05 23 31 47 47

Date de consultation :

10/03/2022

Nom et prénom du malade : CHOUAL Abdelghani Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Hypertension artérielle

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Mohammedia

Le : 10/03/2022

Signature de l'adhérent(e) :



## VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie Nº M21-80208

Remplissez ce volet, découpez-le et conservez-le.  
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : .....

Nom de l'adhérent(e) : .....

Total des frais engagés : .....

Date de dépôt : .....

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/03/2022	Cs + 300du	Dr. Leila BEI HADI BEN SAM		
11/03/2022	Contrôle + ODF	Endocrinologue Diabétologue Bne SAFI, Bne ISMAIL 1 Etg Dr. Leila BEI HADI BEN SAM Endocrinologue Appt 41 Mohammédia Tél : 05 23 31 47 47		

### EXECUTION DES ORDONNANCES ISMAIL 1 Etg

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE ET OPTIQUE MEDA Dr. KHATTOU Abdellatif 33, Bd Mounaïd Derb Abat Mohammédia - Tel / fax : 05 23 30 96 36	11/03/2022	350,40

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE ALMA Mohamed Alami BIOCHIMISTE 1 Bd Nasser Mohammédia Tél : 05 23 30 40 30	11/03/22	Bt 1/0	674,600

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### VOLET ADHERENT


\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				

### O.D.F PROTHESES DENTAIRES



### DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	00000000
G	35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

**Docteur Leïla BELHADI BENSAMI**

Diplômée de la faculté de médecine de Casablanca

**Spécialiste en Endocrinologie - Diabétologie**

**Nutrition et Maladies Métaboliques**

(Diabète , Cholestérol , Hormones , Thyroïde , Hypophyse , Surrénales

Troubles de Croissance et de puberté, Stérilité, Obésité ...)



**الدكتورة ليلى بلهادي بنسامي**

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

**أخصائية في أمراض الغدد ، السكري والتغذية**

(السكري ، الكوليسترون ، الهرمونات ، الغدة الدرقية ،

الغدة النخامية ، أمراض النمو والبلوغ، العقم ، السمنة ...)

11 mars 2022

Mohammedia, le

**Mr. CHOUAL ABDELGHANI**



116,80 x 3

350,40  
LIPANTHYL 160  
0-0-1 PDT 3 MOIS

Dr. Leïla BELHADI BENSAMI  
Endocrinologue Diabétologue  
Rue SAFI, Imm ISMAIL 1 Etg  
Appt 4 - Mohammedia  
Tél: 05 23 31 47 47

PHARMACIE ET ORTHOPEDIE  
IBN NAFIS  
Dr. KHATTOU Abdelkarim  
33, Bd Mounastir Derb Rbat  
Mohammedia - Tél/Fax : 05 23 30 36 36

Rue Safi, Imm. Ismaïl, 1er étage Appat 4 - Mohammedia

Tél : 05.23.31.47.47 - Urgence : 06.61.93.20.28

E-mail : leilabelhadi3@gmail.com



# LIPANTHYL® 160 mg, comprimé pelliculé

Fenofibrate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.
- QU'EST-CE QUE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

## Classe pharmacothérapeutique :

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments, appelés fibrates. Ces médicaments sont utilisés pour diminuer les taux de graisses (lipides) dans le sang, comme par exemple les graisses appelées les triglycérides.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé est utilisé en complément d'un régime alimentaire pauvre en graisses et d'autres traitements non médicamenteux tels que l'exercice physique et la perte de poids afin de faire baisser les taux de graisses dans le sang.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé peut être utilisé en association avec d'autres médicaments [statines] dans le cas où le niveau de graisses dans le sang n'est pas contrôlé avec l'utilisation d'une statine en monothérapie.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?

### Ne prenez jamais LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé si :

- Vous avez une allergie connue au fenofibrate, ou à l'un des excipients de ce médicament (mentionnés en rubrique 6 « Autres informations »).
- Vous êtes allergique à la cacahuète, à l'huile d'arachide, à la lécithine de soja ou tout produit apparenté.
- Vous avez déjà eu des réactions allergiques ou des lésions cutanées lors d'une exposition au soleil ou à la lumière artificielle ou un traitement médicamenteux (incluant fibrates et un anti-inflammatoire, appelé le kétoprofène).
- Vous avez de graves problèmes de foie, des reins ou de bilaire.

- Vous avez une pancréatite conduire à des douleurs abdominales due à un niveau élevé de cholestérol dans le sang.

Ne prenez pas LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé dans les cas mentionnés ci-dessus vous pouvez consulter votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé.

- Vous avez des problèmes hépatiques.
- Vous avez une inflammation chronique de la peau avec une coloration jaune de la peau et une élévation des enzymes du foie.
- Vous avez des maux de ventre ou des déchirures.
- Vous avez une glande thyroïde fonctionnant trop activement.

Si l'un des cas mentionnés ci-dessous, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé.

## Effets sur les muscles :

Arrêtez de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé immédiatement votre médecin ou pharmacien si :

- de crampes musculaires nocturnes.
- de douleurs de sensibilité dans les muscles.

Ce médicament peut provoquer des effets secondaires peuvent être graves. Ces effets peuvent inclure une inflammation et une dégradation des muscles, des problèmes rénaux graves et éventuellement mortels. Votre médecin réalisera un examen physique et une analyse musculaire avant et après initier ce médicament. Le risque de problèmes musculaires chez certains patients. Prévenez votre médecin si :

- Vous avez plus de 70 ans,
- Vous avez des problèmes rénaux,
- Vous avez des problèmes thyroïdiens,
- Vous ou un membre proche avez des problèmes musculaires qui sont familiaux,
- Vous consommez de grandes quantités d'alcool,
- Vous prenez des médicaments pour le cholestérol appelés « statines » (comme la pravastatine, rosuvastatine ou simvastatine),
- Vous avez déjà eu des problèmes de muscle avec les statines ou fibrates, tels que la gemfibrozil.

Si l'un des cas mentionnés ci-dessous, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

maphar O

ZI Zenata Ain Sébâa, Casablanca, Maroc

LIPANTHYL® 160 mg CP PEL B30

P.P.V. : 116,80 DH

6 08070A

6 118001 181636



# LIPANTHYL® 160 mg, comprimé pelliculé

Fenofibrate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.
- QU'EST-CE QUE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

## Classe pharmacothérapeutique :

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments, appelés fibrates. Ces médicaments sont utilisés pour diminuer les taux de graisses (lipides) dans le sang, comme par exemple les graisses appelées les triglycérides.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé est utilisé en complément d'un régime alimentaire pauvre en graisses et d'autres traitements non médicamenteux tels que l'exercice physique et la perte de poids afin de faire baisser les taux de graisses dans le sang.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé peut être utilisé en association avec d'autres médicaments [statines] dans le cas où le niveau de graisses dans le sang n'est pas contrôlé avec l'utilisation d'une statine en monothérapie.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?

### Ne prenez jamais LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé si :

- Vous avez une allergie connue au fenofibrate, ou à l'un des excipients de ce médicament (mentionnés en rubrique 6 « Autres informations »).
- Vous êtes allergique à la cacahuète, à l'huile d'arachide, à la lécithine de soja ou tout produit apparenté.
- Vous avez déjà eu des réactions allergiques ou des lésions cutanées lors d'une exposition au soleil ou à la lumière artificielle ou un traitement médicamenteux (incluant fibrates et un anti-inflammatoire, appelé le kétoprofène).
- Vous avez de graves problèmes de foie, des reins ou de bilaire.

- Vous avez une pancréatite conduire à des douleurs abdominales due à un niveau élevé de cholestérol dans le sang.

Ne prenez pas LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé dans les cas mentionnés ci-dessus vous pouvez consulter votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé.

- Vous avez des problèmes hépatiques (douleur dans l'abdomen droit).
- Vous avez une inflammation de la peau (urticaire, éruption cutanée), une coloration jaune de la peau ou une élévation des enzymes du foie.
- Vous avez des maux de ventre ou des déchirures dans l'abdomen.
- Vous avez une glande thyroïde grosse (goitre).

Si l'un des cas mentionnés ci-dessous, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé.

## Effets sur les muscles :

Arrêtez de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé immédiatement et consultez votre médecin si :

- de crampes musculaires nocturnes.
- de douleurs de sensibilité dans les jambes ou la hanche.

Ce médicament peut provoquer des effets secondaires peuvent être graves. Ces effets peuvent inclure une inflammation et une dégradation des muscles, des problèmes rénaux graves et éventuellement mortels. Votre médecin réalisera un examen physique et une analyse musculaire avant et après initier ce médicament. Le risque de problèmes musculaires est plus élevé chez les patients. Prévenez votre médecin si :

- Vous avez plus de 70 ans, vous avez des problèmes rénaux.
- Vous avez des problèmes thyroïdiens.
- Vous ou un membre proche avez des problèmes musculaires qui sont familiaux.
- Vous consommez de grandes quantités d'alcool.
- Vous prenez des médicaments qui augmentent le cholestérol appelés « statines », comme la pravastatine, rosuvastatine ou simvastatine.
- Vous avez déjà eu des problèmes de foie causés par statines ou fibrates, tels que la gemfibrozil.

Si l'un des cas mentionnés ci-dessous, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

maphar O

ZI Zenata Ain Sébâa, Casablanca, Maroc

LIPANTHYL® 160 mg CP PEL B30

P.P.V. : 116,80 DH

6 08070A

6 118001 181636



# LIPANTHYL® 160 mg, comprimé pelliculé

Fenofibrate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.
- QU'EST-CE QUE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

## Classe pharmacothérapeutique :

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments, appelés fibrates. Ces médicaments sont utilisés pour diminuer les taux de graisses (lipides) dans le sang, comme par exemple les graisses appelées les triglycérides.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé est utilisé en complément d'un régime alimentaire pauvre en graisses et d'autres traitements non médicamenteux tels que l'exercice physique et la perte de poids afin de faire baisser les taux de graisses dans le sang.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé peut être utilisé en association avec d'autres médicaments [statines] dans le cas où le niveau de graisses dans le sang n'est pas contrôlé avec l'utilisation d'une statine en monothérapie.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?

### Ne prenez jamais LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé si :

- Vous avez une allergie connue au fenofibrate, ou à l'un des excipients de ce médicament (mentionnés en rubrique 6 « Autres informations »).
- Vous êtes allergique à la cacahuète, à l'huile d'arachide, à la lécithine de soja ou tout produit apparenté.
- Vous avez déjà eu des réactions allergiques ou des lésions cutanées lors d'une exposition au soleil ou à la lumière artificielle ou un traitement médicamenteux (incluant fibrates et un anti-inflammatoire, appelé le kétoprofène).
- Vous avez de graves problèmes de foie, des reins ou de bilaire.

- Vous avez une pancréatite conduire à des douleurs abdominales due à un niveau élevé de cholestérol dans le sang.

Ne prenez pas LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé dans les cas mentionnés ci-dessus vous pouvez consulter votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé.

- Vous avez des problèmes hépatiques (douleur dans l'abdomen droit).
- Vous avez une inflammation de la peau (urticaire, éruption cutanée), une coloration jaune de la peau ou une élévation des enzymes du foie.
- Vous avez des maux de ventre ou des déchirures dans l'abdomen.
- Vous avez une glande thyroïde grosse (goitre).

Si l'un des cas mentionnés ci-dessous, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé.

## Effets sur les muscles :

Arrêtez de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé immédiatement et consultez votre médecin si :

- de crampes musculaires nocturnes.
- de douleurs de sensibilité dans les jambes ou la hanche.

Ce médicament peut provoquer des effets secondaires peuvent être graves. Ces effets peuvent inclure une inflammation et une dégradation des muscles, des problèmes rénaux graves et éventuellement mortels. Votre médecin réalisera un examen physique et une analyse musculaire avant et après initier ce médicament. Le risque de problèmes musculaires est plus élevé chez les patients. Prévenez votre médecin si :

- Vous avez plus de 70 ans, vous avez des problèmes rénaux.
- Vous avez des problèmes thyroïdiens.
- Vous ou un membre proche avez des problèmes musculaires qui sont familiaux.
- Vous consommez de grandes quantités d'alcool.
- Vous prenez des médicaments qui augmentent le cholestérol appelés « statines », comme la pravastatine, rosuvastatine ou simvastatine.
- Vous avez déjà eu des problèmes de foie causés par statines ou fibrates, tels que la gemfibrozil.

Si l'un des cas mentionnés ci-dessous, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

maphar O

ZI Zenata Ain Sébâa, Casablanca, Maroc

LIPANTHYL® 160 mg CP PEL B30

P.P.V. : 116,80 DH

6 08070A

6 118001 181636

**LABORATOIRE AMARA D'ANALYSES MEDICALES**

Dr. M. AMARA

3,Bd Mohammed V - Tél.: 0523.30.40.30 - Fax: 0523.30.43.20

Référence:

**20311938**

Analyses effectuées le: 11/03/2022

Pour.....: **Mr. CHOUAL ABDELGHANI**

Sur prescription du: Dr BELHADI LEILA

Code.....: 00060896



Organisme.....:

**Bilan:**

GLY HBA1C CHO HDL LDL TRIGL TGO TGP AUR

Cotation : (B 440 )

**Montant Net :** 614.60 **Dhs**

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :


**SIX CENT QUATORZE Dhs 60 Cts**

LABORATOIRE AMARA  
Dr. M. AMARA  
3, Bd. Mohammed V - Mohammedia  
Tél . 05 23 30 40 30

# مركز الحمدية للتحاليل الطبية

## Centre de Biologie de Mohammedia

HEMATOLOGIE - BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - MYCOLOGIE - PARASITOLOGIE



**Dr Halty Jamal**

Ancien Pharmacien Biologiste

à l'hôpital Militaire HMIMV - Rabat

Diplôme Universitaire en Management

de la Qualité à L'Université

de Bordeaux - France

Date du prélèvement : 09-03-2022 à 08:04

Code patient : 2012080233

Né(e) le : 11-11-1965 (56 ans)



**Mr CHOUAL Abdelghani**

Dossier N° : 2203090011

Prescripteur :

## HEMATOLOGIE

### HEMOGRAMME

#### Numération Globulaire

Hématies	5.16	M/ml	(4.20–5.70)
Hémoglobine	13.7	g/dl	(13.0–17.5)
Hématocrite	42.9	$\mu^3$	(40.0–52.0)
VGM	83	%	(80–95)
TCMH	27	pg	(28–32)
CCMH	32	%	(30–35)

#### Formule leucocytaire

Leucocytes	6 920	/mm <sup>3</sup>	(4 000–10 000)
Neutrophiles	3 467	/mm <sup>3</sup>	(2 000–7 500)
Eosinophiles	76	/mm <sup>3</sup>	(100–400)
Basophiles	42	/mm <sup>3</sup>	(0–150)
Monocytes	471	/mm <sup>3</sup>	(200–800)
Lymphocytes	2 865	/mm <sup>3</sup>	(1 500–4 000)


#### Numération plaquettaire

Plaquettes	237 000	/mm <sup>3</sup>	(150 000–350 000)
------------	---------	------------------	-------------------

### VITESSE DE SEDIMENTATION

1ère heure

2ème heure




(<10)

(<20)

# مركز الحمدية للتحاليل الطبية

## 'Centre de Biologie de Mohammedia'

HEMATOLOGIE - BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - MYCOLOGIE - PARASITOLOGIE



Dr Halty Jamal

Ancien Pharmacien Biologiste

à l'hôpital Militaire HMIMV - Rabat

Diplôme Universitaire en Management

de la Qualité à L'Université

de Bordeaux France

Page 27 3

Du 09-03-2022

Dossier : 2203090011 - Mr Abdelghani CHOUAL

### BIOCHIMIE SANGUINE

Glycémie à jeun

0.95 g/l  
5.3 mmol/l

(0.74-1.10)  
(4.1-6.1)

Hémoglobine glyquée (HbA1c)  
(TOSOH HLC-723 GX)

11.0 %

(4.0-6.0)

Indications thérapeutiques :

- < 6% : Objectif optimal.
- < 8 % sur deux contrôles successifs : Equilibre acceptable.
- > 8 % sur deux contrôles successifs : Mauvais équilibre glycémique, modifications de traitement recommandées.

Transaminases GOT (ASAT)

12.8 UI/l

(0.0-35.0)

Transaminases GPT (ALAT)

11.1 UI/l

(0.0-45.0)

Gamma GT

16.5 UI/l

(10.0-45.0)

Acide urique (RC)

74.26 mg/l  
442 µmol/l

(36.00-70.00)  
(214-417)

\* Vins de rosé  
+ Sardines  
+ Fruits de mer

Créatinine

8.0 mg/l  
70.7 µmol/l

(7.0-12.0)  
(61.9-106.1)

Urée

0.39 g/l  
6.50 mmol/l

(<0.50)  
(<8.33)

Cholestérol total

2.94 g/l

Interprétation :

Souhaitable	< 2.00	g/l
Limite de risque	2.00-2.40	g/l
Risque élevé	> 2.40	g/l

Triglycérides

4.04 g/l

Interprétation :

Désirable	< 2.00	g/l
Limite de risque	2.00-4.00	g/l
Elevée	> 4.00	g/l

Cholestérol - HDL

0.51 g/l  
1.32 mmol/l

(0.35-0.80)  
(0.90-2.06)

# مركز المحمدية للتحاليل الطبية

## Centre de Biologie de Mohammedia

HEMATOLOGIE - BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - MYCOLOGIE - PARASITOLOGIE



Dr Halty Jamal

Ancien Pharmacien Biologiste

à l'hôpital Militaire HMIMY - Rabat

Diplôme Universitaire en Management

de la Qualité à L'Université

de Bordeaux - France

Page 3 / 3

Dossier : 2203090011 - Mr Abdelghani CHOUAL

Du 09-03-2022

### MARQUEURS TUMORAUX

PSA total  
(Architect-ABBOTT) 1.178 ng/ml

Interprétation :

< 40 ans	< 1.4	ng/ml
40 à 49	< 2.0	ng/ml
50 à 59	< 3.1	ng/ml
60 à 69	< 4.1	ng/ml
> 69	< 4.4	ng/ml

### IMMUNO-SEROLOGIE

Protéine C-réactive (CRP) 5.45 mg/l (<5.00)

(RC) : Résultat Contrôlé

Dr Halty Jamal  
Centre de biologie de mohammedia  
Pharmacien biologiste  
Tél: 05 23 28 04 05  
Valide par DR HALTY JAMAL  
05 23 28 04 05