

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire, en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 500 82

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MIKHANITA R. FATNA

ND  
M 5976

Date de naissance :

Adresse : RESIDEL Romane Imm I APP 30000 MARRAKESH

Tél. : ..... Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 25/07/22

Nom et prénom du malade : MIKHANITA R. FATNA Age : .....

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Diabète + HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 08/08/2022

Signature de l'adhérent(e) : M

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/07/22			250,00	DR BOUAFI EL HASSAN Dentiste - Prostéthologue - Endocrinologue - Nutritionniste
02/08/22			60	DR BOUAFI EL HASSAN Dentiste - Prostéthologue - Endocrinologue - Nutritionniste

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE D'ALMAIT CASA Inara 1, Casablanca - Tel. 0522 52 73 99 N°21, Casablanca - Tel. 0522 52 73 99	21/07/22	1339,80

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
INPE : 4500545	25/07/22	B300	358,70 DMT

### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				
				
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	25533412 00000000 35533411	G	21433552 00000000 11433553
	D	00000000	B	00000000
		35533411		11433553
MONTANTS DES SOINS	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
DATE DU DEVIS				
DATE DE L'EXECUTION				

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Bouchra ALAOUI EL HASSANI

Endocrinologue - Diabétologue  
Nutritionniste

الدكتورة بشرى العلوي الحسني

أخصائية في أمراض الغدد والسكري والتغذية

Casablanca, le :

09/08/92

Mme M Khenter  
Fetne  
(X) Amarel 2mg



9

1 - 1

20/08/92  
(X) Pdt 3mois  
Cotaseg 160/25

1339,88

PHARMACIE ANNAJAT CASA  
Résidence Arraizi  
Immeuble 2, étage 3ème  
en face de Maroc Telecom, Annasii

Bd. Mohamed Zefzaf  
Résidence Arraiane 2, Imm. 2, 3ème Etage, N°49  
(en face de Maroc Telecom, Annasii)

Fixe : 05 22 74 76 28 - 05 22 74 73 00

GSM: 07 67 56 03 95

Dr Bouchra Alaoeu - Endocrinologue  
Diabétologue - Nutritionniste

الدار البيضاء، أهل ل glam، شارع محمد الرفراش، إقامة الريان 2

الطابق 3، رقم 49 (أمام وكالة إتصالات المغرب، أناسي)

الهاتف : 05 22 74 73 00 - 05 22 74 76 28

المحمول : 07 67 56 03 95



6 118001 030132

COTAREG 110/25 mg

28 comprimés pelliculés

RPV : 205.00 DH



6 118001 030132

COTAREG 160/25 mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 205.00 DH



6 118001 030132

COTAREG 160/25 mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 205.00 DH









médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, inhibiteurs de la MAO); médicamenteux pour traiter les élèves de cholestérol (fibates);

laxatifs; laxatives; inhibiteurs de l'enzyme de tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de la renin).

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

#### Alimentation

AMAREL comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Ondule de véhicules et utilisation de machines

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

**Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé**

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si votre médecin vous a dit que vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Prise du médicament**

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### 3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. Si vous prenez le premier repas de la journée (généralement le petit déjeuner), Si vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous devez prendre le médicament au moment où vous prendez le petit déjeuner. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL.

• Avalez les comprimés entiers avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou casser les comprimés.

**Résultats :**

• La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

• Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin. La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

• Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

• La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

• Un traitement associant glicopiride et metformine ou glicopiride et insulinine peut être initial. Dans ce cas, les doses respectives de glicopiride, de metformine ou d'insuline dont vous vous servez sont déterminées par votre médecin.

• En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

• Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop faible, n'en modifier pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'en avez pris, vous risquez de faire une surdose.**

• Pour empêcher l'absorption de l'hypoglycémie, voir « Tâches attention ».

Prenez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou thé sucré) et informez aussi votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

avec  
chui  
avai  
fai

0  
060031  
060031  
AMAREL 2MG  
CP 830  
P.P.V : 60D/40  
P.EF : 10 2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, inhibiteurs de la MAO); médicamenteux pour traiter les élèves de cholestérol (fibates);

laxatifs; laxatives; inhibiteurs de l'enzyme de tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de la renin).

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

#### Alimentation

AMAREL comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Ondule de véhicules et utilisation de machines

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

#### Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si votre médecin vous a dit que vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### 3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Prise du médicament

\* Prendre ce médicament par voie orale, juste avant ou pendant le premier repas principal de la journée (généralement le petit déjeuner). Si vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous devez prendre le médicament au moment où vous faites votre déjeuner. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL.

\* Avalez les comprimés entiers avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou casser les comprimés.

Résultats:

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas plus de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

\* La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glicopiride et metformine ou glicopiride et insulinine peut être initial. Dans ce cas, les doses respectives de glicopiride, de metformine ou d'insuline dont vous vous servez sont déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop variable, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**S'IL VOUS AVEZ PRIS PLUS D'AMAREL, COMPRIMÉ QUE VOUZ N'AVIEZ DOU :**

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une crise d'hypoglycémie (pour les symptômes, voir « Tâches attention »). Prenez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou thé sucré) et informez aussi votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

avec  
chut  
avant  
si

0  
060031  
060031  
AMAREL 2MG  
CP 830  
P.P.V : 60D/40  
P.EF : 10 2024

goutte (Allopurinol, probénécide, sulfapyrazone);

(cyclothosphamide, lösostamide, tolosamide); autre de poés (tentacal);

alergies nasales telles que le rhume des foins (vernotolylamine);

hypotenseurs pour traiter l'hypertension artérielle, illes bronchiques,

diminution du taux de sucre dans le sang) peut être suivant. Cela peut entraîner un risque du taux de sucre dans le sang;

troubles sexuels féminins (estrogènes),

medicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques);

medicaments utilisés pour simuler la glande thyroïde (telle que la levothyroxine);

medicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes);

medicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et autres dérivés de la phénothiazine);

medicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, medicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adrénaïline et sympathomimétiques);

medicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique);

medicaments pour traiter la constipation (oxyliquits) sont utilisés au long cours (laxatifs);

medicaments pour traiter l'arthrose (phénylephrine);

medicaments pour traiter l'anxiété et les troubles du sommeil (barbituriques);

medicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine);

medicaments pour traiter les hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque (beta-bloquants, la fomidine, la guanethidine, la réserpine, une attention particulière est nécessaire lorsque vous prenez ces médicaments car ils peuvent aussi masquer les signes d'hypoglycémie);

AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants:

\* medicaments empêchant la coagulation du sang (antivitamine K de type dérivés canaux cellulaires telle que la warfarine).

#### Aliments et boissons

La prise d'aliments peut augmenter ou diminuer le taux de sucre dans le sang, réduire l'action d'AMAREL, comprimé de manière imprévisible.

#### Grossesse et allaitement

Grossesse

médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, inhibiteurs de la MAO); médicamenteux pour traiter les élèves de cholestérol (fibates);

laxatifs; laxatives; inhibiteurs de l'enzyme de tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de la renin).

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

#### Alimentation

AMAREL comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Ondule de véhicules et utilisation de machines

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

#### Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si votre médecin vous a dit que vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Prénez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### 3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin.

Prise du médicament

\* Prendre ce médicament par voie orale, juste avant ou pendant le premier repas principal de la journée (généralement le petit déjeuner). Si vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous devez prendre le médicament au moment où vous faites votre déjeuner. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL.

\* Avalez les comprimés entiers avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou casser les comprimés.

Résultats:

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin. La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glicopiride et metformine ou glicopiride et insulinine peut être initial. Dans ce cas, les doses respectives de glicopiride, de metformine ou d'insuline dont vous vous servez sont déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop visible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**S'IL VOUS AVEZ PRIS PLUS D'AMAREL, COMPRIMÉ QUE VOUZ N'AVIEZ DOU :**  
Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une crise d'hypoglycémie (pour les symptômes, voir « Tâches attention »). Prenez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du Sucre) et informez aussi votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

avec  
chui  
avai  
fai

0  
060031  
AMAREL 2MG  
CP 830  
P.P.V : 60D/40  
P.EF : 10 2024

goutte (Allopurinol, probénécide, sulfapyrazone);  
(cyclothosphamide, lösostamide, tolosamide);  
l'erte de poés (tenatropine);  
effluer la circulation, en cas d'administration  
vernotropine);  
alleges nasales telle que le rhume des fous  
horbitaires pour traiter l'hypertension artérielle,  
ihles bronchiques,

minution du taux de sucre dans le sang) peut être  
avant. Cela peut entraîner un risque  
du taux de sucre dans le sang).

umores sexuels féminines (estrogènes),

medicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques);

medicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la

levothyroxine);

medicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes);

medicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et autres dérivés de la phénothiazine);

medicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, medicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adrénaïne et sympathomimétiques);

medicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique);

medicaments pour traiter la constipation (oxyliquits) sont utilisés au long cours (laxatifs);

medicaments pour traiter l'arthrose (phénylbutazone);

medicaments pour traiter l'anovulose et les troubles du sommeil (barbituriques);

medicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine);

medicaments pour traiter les hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque (beta-bloquants, la fomidine, la guanethidine, la réserpine, une

attention particulière est nécessaire lorsque vous prenez ces medicaments car ils peuvent aussi masquer les signes d'hypoglycémie;

AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des medicaments suivants:

\* medicaments empêchant la coagulation du sang (antivitamine K de type dérivés canaux cellulaires telle que la warfarine).

**Aliments et boissons**  
la prise d'alcool peut augmenter ou diminuer le taux de sucre dans le sang, réduire l'action d'AMAREL, comprimé de manière imprévisible.

**Grossesse et Allaitement**  
grossesse



médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, inhibiteurs de la MAO); médicamenteux pour traiter les élèves de cholestérol (fibates);

toux (cyclothosphamide, lisinamide, tosandomide);

laxatif (alopurinol, probénécide, sulfapyrazone);

lente de poésie (tenatropine);

effleuré la circulation, en cas d'administration vénitoxymine);

alergies nasales telles que le rhume des foins (alergies nasales telles que le rhume des foins horfiques pour traiter l'hypertension artérielle, illes bronchiques,

minution du taux de sucre dans le sang) peut être

avant cela peut entraîner un risque du taux de sucre dans le sang);

utomnes sexuelles féminines (estrogènes),

progestatifs);

medicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques);

medicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la levothyroxine);

medicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes);

medicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et autres dérivés de la phénothiazine);

medicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, medicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adréphénine et sympathomimétiques);

medicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique);

medicaments pour traiter la constipation (oxyklys) sont utilisés au long cours (laxatifs);

medicaments pour traiter l'épilepsie (phénytoïne);

medicaments pour traiter la nervosité et les troubles du sommeil (barbituriques);

medicaments pour traiter une pression élevée dans les yeux (acétazolamide);

medicaments pour traiter l'hypertension artérielle; ou la diminution du taux de sucre dans le sang (diabète);

medicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine);

medicaments pour traiter les hypoglycémies sévères (glucagon);

l'effet de diminution du taux de sucre dans le sang d'AMAREL, comprimé peut être diminué ou augmenté par les médicaments suivants:

\* medicaments pour traiter les ulcères de l'estomac (appelés anti-H<sub>2</sub>);

\* medicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque tels que les bêta-bloquants, la fomidine, la guanethidine, la réserpine, une attention particulière est nécessaire lorsque vous prenez ces médicaments car ils peuvent aussi masquer les signes d'hypoglycémie.

AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants:

\* medicaments empêchant la coagulation du sang (antivitamine K de type dérivés canaux cellulaires telle que la warfarine).

**Aliments et boissons**

la prise d'aliments peut augmenter ou diminuer le taux de sucre dans le sang, réduire l'action d'AMAREL, comprimé de manière imprévisible.

**Grossesse et Allaitement**

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

**AMAREL** comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout ondine de véhicules et utilisation de machines**

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

**Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé**

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si vous réagissez négativement au lactose, présentez une molétrie à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Prise du médicament**

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?**

Prise avec du sucre.

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. Si vous ne prenez pas de principale de la journée (généralement le petit déjeuner). Si vous ne prenez pas de principale de la journée (généralement le petit déjeuner), vous devez prendre le médicament au moment indiqué par votre médecin. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL, comprimé.

\* Avalez les comprimés entiers, avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou couper les comprimés.

**Répondez :**

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

\* La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glibenclamide et metformine ou glipizide et insulinine ou peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glibenclamide, de metformine ou d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.**

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.

Preniez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du sucre) et informez aussitôt votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

**AMAREL** comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout**

**ondine de véhicules et utilisation de machines**

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

**Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé**

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si vous réagissez négativement au lactose, présentez une molétrie à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Prise du médicament**

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?**

Prise avec du sucre.

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. Si vous ne prenez pas de principale de la journée (généralement le petit déjeuner), vous devez prendre le médicament au moment indiqué par votre médecin. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL, comprimé.

\* Avalez les comprimés entiers, avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou couper les comprimés.

**Répondez :**

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

\* La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glibenclamide et metformine ou glipizide et insulinine ou peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glibenclamide, de metformine ou d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.**

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.

Preniez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du sucre) et informez aussitôt votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

**AMAREL** comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout**

**ondine de véhicules et utilisation de machines**

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

**Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé**

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si vous réagissez négativement au lactose, présentez une molétrie à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Prise du médicament**

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?**

Prise avec du sucre.

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. Si vous ne prenez pas de principale de la journée (généralement le petit déjeuner), vous devez prendre le médicament au moment indiqué par votre médecin. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL, comprimé.

\* Avalez les comprimés entiers, avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou couper les comprimés.

**Répondez :**

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

\* La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glibenclamide et metformine ou glipizide et insulinine ou peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glibenclamide, de metformine ou d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.**

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.

Preniez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du sucre) et informez aussitôt votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

**AMAREL** comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout**

**ondine de véhicules et utilisation de machines**

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

**Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé**

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si vous réagissez négativement au lactose, présentez une molétrie à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Prise du médicament**

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?**

Prise avec du sucre.

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. Si vous ne prenez pas de principale de la journée (généralement le petit déjeuner), vous devez prendre le médicament au moment indiqué par votre médecin. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL, comprimé.

\* Avalez les comprimés entiers, avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou couper les comprimés.

**Répondez :**

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

\* La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glibenclamide et metformine ou glipizide et insulinine ou peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glibenclamide, de metformine ou d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.**

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.

Preniez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du sucre) et informez aussitôt votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

**AMAREL** comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout**

**ondine de véhicules et utilisation de machines**

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

**Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé**

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si vous réagissez négativement au lactose, présentez une molétrie à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Prise du médicament**

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?**

Prise avec du sucre.

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. Si vous ne prenez pas de principale de la journée (généralement le petit déjeuner), vous devez prendre le médicament au moment indiqué par votre médecin. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL, comprimé.

\* Avalez les comprimés entiers, avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou couper les comprimés.

**Répondez :**

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

\* La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glibenclamide et metformine ou glipizide et insulinine ou peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glibenclamide, de metformine ou d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.**

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.

Preniez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du sucre) et informez aussitôt votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

**AMAREL** comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout**

**ondine de véhicules et utilisation de machines**

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

**Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé**

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si vous réagissez négativement au lactose, présentez une molétrie à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Prise du médicament**

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?**

Prise avec du sucre.

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. Si vous ne prenez pas de principale de la journée (généralement le petit déjeuner), vous devez prendre le médicament au moment indiqué par votre médecin. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL, comprimé.

\* Avalez les comprimés entiers, avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou couper les comprimés.

**Répondez :**

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

\* La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glibenclamide et metformine ou glipizide et insulinine ou peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glibenclamide, de metformine ou d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.**

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.

Preniez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du sucre) et informez aussitôt votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle

médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, inhibiteurs de la MAO); médicamenteux pour traiter les élèves de cholestérol (fibates);

toux (cyclothosphamide, lisinamide, tosandomide);

laxatif (alopurinol, probénécide, sulfapyrazone);

lente de poésie (tenatropine);

effleuré la circulation, en cas d'administration vénitoxymine);

alergies nasales telles que le rhume des foins (alergies nasales telles que le rhume des foins horfiques pour traiter l'hypertension artérielle, illes bronchiques,

minution du taux de sucre dans le sang) peut être

avant cela peut entraîner un risque du taux de sucre dans le sang);

utomnes sexuelles féminines (estrogènes),

progestatifs);

medicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques);

medicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la levothyroxine);

medicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes);

medicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et autres dérivés de la phénothiazine);

medicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, medicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adréphénine et sympathomimétiques);

medicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique);

medicaments pour traiter la constipation (oxyklys) sont utilisés au long cours (laxatifs);

medicaments pour traiter l'épilepsie (phénytoïne);

medicaments pour traiter la nervosité et les troubles du sommeil (barbituriques);

medicaments pour traiter une pression élevée dans les yeux (acétazolamide);

medicaments pour traiter l'hypertension artérielle; ou la diminution du taux de sucre dans le sang (diabète);

medicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine);

medicaments pour traiter les hypoglycémies sévères (glucagon);

l'effet de diminution du taux de sucre dans le sang d'AMAREL, comprimé peut être diminué ou augmenté par les médicaments suivants:

\* medicaments pour traiter les ulcères de l'estomac (appelés anti-H<sub>2</sub>);

\* medicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque tels que les bêta-bloquants, la fomidine, la guanethidine, la réserpine, une attention particulière est nécessaire lorsque vous prenez ces médicaments car ils peuvent aussi masquer les signes d'hypoglycémie.

AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants:

\* medicaments empêchant la coagulation du sang (antivitamine K de type dérivés canaux cellulaires telle que la warfarine).

**Aliments et boissons**

la prise d'aliments peut augmenter ou diminuer le taux de sucre dans le sang, réduire l'action d'AMAREL, comprimé de manière imprévisible.

**Grossesse et Allaitement**

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

**AMAREL** comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout ondine de véhicules et utilisation de machines**

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

**Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé**

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si vous réagissez négativement au lactose, présentez une molétrie à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Prise du médicament**

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?**

Prise avec du sucre.

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. Si vous ne prenez pas de principale de la journée (généralement le petit déjeuner). Si vous ne prenez pas de principale de la journée (généralement le petit déjeuner), vous devez prendre le médicament au moment indiqué par votre médecin. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL, comprimé.

\* Avalez les comprimés entiers, avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou couper les comprimés.

**Répondez :**

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

\* La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glibenclamide et metformine ou glipizide et insulinine ou peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glibenclamide, de metformine ou d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.**

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.

Preniez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du sucre) et informez aussitôt votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

**AMAREL** comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout**

**ondine de véhicules et utilisation de machines**

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

**Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé**

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si vous réagissez négativement au lactose, présentez une molétrie à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Prise du médicament**

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?**

Prise avec du sucre.

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. Si vous ne prenez pas de principale de la journée (généralement le petit déjeuner), vous devez prendre le médicament au moment indiqué par votre médecin. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL, comprimé.

\* Avalez les comprimés entiers, avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou couper les comprimés.

**Répondez :**

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

\* La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glibenclamide et metformine ou glipizide et insulinine ou peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glibenclamide, de metformine ou d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.**

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.

Preniez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du sucre) et informez aussitôt votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

**AMAREL** comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout**

**ondine de véhicules et utilisation de machines**

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

**Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé**

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si vous réagissez négativement au lactose, présentez une molétrie à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Prise du médicament**

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?**

Prise avec du sucre.

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. Si vous ne prenez pas de principale de la journée (généralement le petit déjeuner), vous devez prendre le médicament au moment indiqué par votre médecin. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL, comprimé.

\* Avalez les comprimés entiers, avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou couper les comprimés.

**Répondez :**

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

\* La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glibenclamide et metformine ou glipizide et insulinine ou peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glibenclamide, de metformine ou d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.**

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.

Preniez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du sucre) et informez aussitôt votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

**AMAREL** comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout**

**ondine de véhicules et utilisation de machines**

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

**Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé**

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si vous réagissez négativement au lactose, présentez une molétrie à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Prise du médicament**

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?**

Prise avec du sucre.

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. Si vous ne prenez pas de principale de la journée (généralement le petit déjeuner), vous devez prendre le médicament au moment indiqué par votre médecin. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL, comprimé.

\* Avalez les comprimés entiers, avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou couper les comprimés.

**Répondez :**

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

\* La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glibenclamide et metformine ou glipizide et insulinine ou peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glibenclamide, de metformine ou d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.**

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.

Preniez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du sucre) et informez aussitôt votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

**AMAREL** comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout**

**ondine de véhicules et utilisation de machines**

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

**Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé**

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si vous réagissez négativement au lactose, présentez une molétrie à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Prise du médicament**

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?**

Prise avec du sucre.

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. Si vous ne prenez pas de principale de la journée (généralement le petit déjeuner), vous devez prendre le médicament au moment indiqué par votre médecin. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL, comprimé.

\* Avalez les comprimés entiers, avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou couper les comprimés.

**Répondez :**

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

\* La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glibenclamide et metformine ou glipizide et insulinine ou peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glibenclamide, de metformine ou d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.**

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.

Preniez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du sucre) et informez aussitôt votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

**AMAREL** comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout**

**ondine de véhicules et utilisation de machines**

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

**Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé**

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si vous réagissez négativement au lactose, présentez une molétrie à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Prise du médicament**

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?**

Prise avec du sucre.

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. Si vous ne prenez pas de principale de la journée (généralement le petit déjeuner), vous devez prendre le médicament au moment indiqué par votre médecin. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL, comprimé.

\* Avalez les comprimés entiers, avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou couper les comprimés.

**Répondez :**

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

\* La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glibenclamide et metformine ou glipizide et insulinine ou peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glibenclamide, de metformine ou d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.**

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une surdosage.

Preniez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du sucre) et informez aussitôt votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle

médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, inhibiteurs de la MAO); médicamenteux pour traiter les élèves de cholestérol (fibates);

laxatifs; laxatives; inhibiteurs de l'enzyme de tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de la renin).

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

#### Alimentation

AMAREL comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Ondule de véhicules et utilisation de machines

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

#### Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si votre médecin vous a dit que vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Prénez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### 3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin.

Prise du médicament

\* Prendre ce médicament par voie orale, juste avant ou pendant le premier repas principal de la journée (généralement le petit déjeuner). Si vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous devez prendre le médicament au moment où vous faites votre déjeuner. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL.

\* Avalez les comprimés entiers avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou casser les comprimés.

Résultats:

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin. La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glicopiride et metformine ou glicopiride et insulinine peut être initial. Dans ce cas, les doses respectives de glicopiride, de metformine ou d'insuline dont vous vous servez sont déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop visible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**S'IL VOUS AVEZ PRIS PLUS D'AMAREL, COMPRIMÉ QUE VOUZ N'AVIEZ DOU :**  
Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une crise d'hypoglycémie (pour les symptômes, voir « Tâches attention »). Prenez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du Sucre) et informez aussi votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

avec  
chui  
avai  
fai

0  
060031  
AMAREL 2MG  
CP 830  
P.P.V : 60D/40  
P.EF : 10 2024

goutte (Allopurinol, probénécide, sulfapyrazone);  
(cyclothosphamide, lösostamide, tolosamide);  
l'erte de poés (tenatropine);  
effluer la circulation, en cas d'administration  
vernotropine);  
alleges nasales telle que le rhume des fous  
horbitaires pour traiter l'hypertension artérielle,  
ihles bronchiques,

minution du taux de sucre dans le sang) peut être  
avant. Cela peut entraîner un risque  
du taux de sucre dans le sang).

umores sexuels féminines (estrogènes),

medicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques);

medicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la

levothyroxine);

medicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes);

medicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et autres dérivés de la phénothiazine);

medicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, medicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adrénaïne et sympathomimétiques);

medicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique);

medicaments pour traiter la constipation (oxyliquits) sont utilisés au long cours (laxatifs);

medicaments pour traiter l'arthrose (phénylbutazone);

medicaments pour traiter l'anovulose et les troubles du sommeil (barbituriques);

medicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine);

medicaments pour traiter les hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque (beta-bloquants, la fomidine, la guanethidine, la réserpine, une

attention particulière est nécessaire lorsque vous prenez ces medicaments car ils peuvent aussi masquer les signes d'hypoglycémie;

AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des medicaments suivants:

\* medicaments empêchant la coagulation du sang (antivitamine K de type dérivés canaux cellulaires telle que la warfarine).

**Aliments et boissons**  
la prise d'alcool peut augmenter ou diminuer le taux de sucre dans le sang, réduire l'action d'AMAREL, comprimé de manière imprévisible.

**Grossesse et Allaitement**  
grossesse

médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, inhibiteurs de la MAO); médicamenteux pour traiter les élèves de cholestérol (fibates);

laxatifs; laxatives; inhibiteurs de l'enzyme de tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de la renin).

AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. En cas de grossesse, ou de désir de grossesse, consultez votre médecin.

#### Alimentation

AMAREL comprimé peut passer dans le lait maternel. AMAREL, comprimé ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Ondule de véhicules et utilisation de machines

En cas d'hypoglycémie ou d'hypoglycémie, votre capacité à vous contrôler ou à régler peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des troubles visuels dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même ou pour d'autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicule en particulier si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous présentez peu ou pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

#### Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL, comprimé

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si votre médecin vous a dit que vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Prénez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### 3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin.

Prise du médicament

\* Prendre ce médicament par voie orale, juste avant ou pendant le premier repas principal de la journée (généralement le petit déjeuner). Si vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous devez prendre le médicament au moment où vous faites votre déjeuner. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez AMAREL.

\* Avalez les comprimés entiers avec au moins un demi-verre d'eau. Ne pas écraser ou casser les comprimés.

Résultats:

\* La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est déterminée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguine et urinaire (taux de sucre).

\* Ne prenez pas de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin. La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, comprimé une fois par jour.

\* Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une à deux semaines de traitement.

\* La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

\* Un traitement associant glicopiride et metformine ou glicopiride et insulinine peut être initial. Dans ce cas, les doses respectives de glicopiride, de metformine ou d'insuline dont vous vous servez sont déterminées par votre médecin.

\* En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou si vous êtes en situation de Stress, une modification des doses d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez-en votre médecin.

\* Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop fort ou trop visible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement mais consultez votre médecin.

**S'IL VOUS AVEZ PRIS PLUS D'AMAREL, COMPRIMÉ QUE VOUZ N'AVIEZ DOU :**  
Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'en avez, vous risquez de faire une crise d'hypoglycémie (pour les symptômes, voir « Tâches attention »). Prenez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple des petits morceaux de sucre, biscuits sucrés, ou du Sucre) et informez aussi votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle sanguin de la quantité de sucre négative devra être effectué afin d'éviter une hypoglycémie qui peut

avec  
chui  
avai  
fai

0  
060031  
AMAREL 2MG  
CP 830  
P.P.V : 60D/40  
P.EF : 10 2024

goutte (Allopurinol, probénécide, sulfapyrazone);  
(cyclothosphamide, lösostamide, tolosamide);  
l'erte de poés (tenatropine);  
effluer la circulation, en cas d'administration  
vernotropine);  
alleges nasales telle que le rhume des fous  
horbitaires pour traiter l'hypertension artérielle,  
ihles bronchiques,

minution du taux de sucre dans le sang) peut être  
avant. Cela peut entraîner un risque  
du taux de sucre dans le sang).

umores sexuels féminines (estrogènes),

medicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques);

medicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la

levothyroxine);

medicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes);

medicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et autres dérivés de la phénothiazine);

medicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, medicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adrénaïne et sympathomimétiques);

medicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique);

medicaments pour traiter la constipation (oxyliquits) sont utilisés au long cours (laxatifs);

medicaments pour traiter l'arthrose (phénylbutazone);

medicaments pour traiter l'anovulose et les troubles du sommeil (barbituriques);

medicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine);

medicaments pour traiter les hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque (beta-bloquants, la fomidine, la guanethidine, la réserpine, une

attention particulière est nécessaire lorsque vous prenez ces medicaments car ils peuvent aussi masquer les signes d'hypoglycémie;

AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des medicaments suivants:

\* medicaments empêchant la coagulation du sang (antivitamine K de type dérivés canaux cellulaires telle que la warfarine).

**Aliments et boissons**  
la prise d'alcool peut augmenter ou diminuer le taux de sucre dans le sang, réduire l'action d'AMAREL, comprimé de manière imprévisible.

**Grossesse et Allaitement**  
grossesse

Dr Bouchra ALAOUI EL HASSANI

Endocrinologue - Diabétologue  
Nutritionniste

الدكتورة بشرى العلوي الحسني

أخصائية في أمراض الغدد والسكري والتغذية

Casablanca, le :

25/07/22

Q'me MKHANTER fatma

- Glycémie à jeun
- Glycémie Post-Prandiale (2 heures après le repas)
- Hémoglobine glyquée (Hb A 1C)
- Fructosamine
- Triglycerides
- Cholesterol total
- HDL  
LDL
- Urée
- Créatinine
- Microalbuminurie sur les urines de 24h
- ECBU
- TGO/TGP/GGT
- Sérologie Hépatite B et C
- NFS + Plaquettes
- Uricémie
- Calcémie
- PSA
- CRP
- VS
- FERRITINEMIE
- VIT D3
- TSH U-S
- T<sub>4</sub>L
- T<sub>3</sub>L
- Anticorps anti TPO
- Anticorps anti récepteurs TSH
- Cortisol libre Urinaire
- Cortisolémie - 8h .....
- Cortisolémie - 16h .....
- Prolactinémie à - 10h .....
- FSH                    LH
- IGF<sub>1</sub>
- Anticorps anti gliadine  
antiendomysium  
Anti Glutaminases
- Testostéroneémie
- 17 OH Progesterone
- Dérivés méthoxylés

RV. le :

Casablanca Ahl Loghem, Bd. Mohamed Zefzaf  
Résidence Arrayane 2, Imm.2, 3<sup>ème</sup> Etage, N°49  
(en face de Maroc Telecom, Annabi)  
Fixe : 05 22 74 76 28 - 05 22 74 73 00  
GSM: 07 67 56 03 95

الدار البيضاء، أهل ل glam، شارع محمد الزفزافي، إقامة الريان 2  
الطابق 3، رقم 49 ( أمام وكالة اتصالات المغرب، أناسي )  
الهاتف : 05 22 74 73 00 - 05 22 74 76 28  
المحمول : 07 67 56 03 95

Dr Bouchra ALAOUI EL HASSANI  
Diabétologue - Endocrinologue  
Nutritionniste  
Bd. Mohamed Zefzaf Résidence Arrayane 2

# Laboratoire BORJ EL BERNOUSSI d'Analyses Médicales

DOCTEUR Abdeladim TAKI IMRANI : Pharmacien Biogiste, Diplômé de l'Université libre de Bruxelles  
BACTERIOLOGIE - BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE -  
PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE - VIROLOGIE  
612, Bd Souhaib Aroumi - Sidi EL Bernoussi - Casablanca - Tél : 0522 73 32 49 - Fax : 0522 75 79 84  
ICE : 001626088000055 - R.C. CASA : 360178 - PATENTE : 316384432 - C.N.S.S : 2928309  
I.Fiscal : 36000150 - INPE : 097163075

**FACTURE N° : 220004929**

CASABLANCA le 25-07-2022

Mme M'KHANTAR Fatna


## Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E20	E
0100	Acide urique	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0216	Numération formule	B80	B
	Cholestérol total	B30	B
	Triglycérides	B60	B

Total des B : 300

TOTAL DOSSIER : 358.70 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de trois cent cinquante-huit dirham soixante-dix centimes.



Docteur A. TAKI IMRANI : Pharmacien Biologiste, Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles.  
 Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie.

**2207250048 – Mme Fatna M'KHANTAR**

**BIOCHIMIE SANGUINE**  
 KONELAB 20(THERMO)/ HLC-723 GX (Tosoh)


07-09-2021

8.0

**Hémoglobine glyquée (HbA1c)** 8.3 %  
 (HPLC -723 GX)

Interpretation:


- 4-6 Non diabétique
- 6-8 Métabolisme équilibré
- >8 Métabolisme non équilibré




07-09-2021

1.77

**Cholestérol total** 1.52 g/L (1.40-2.20)  
 (Technique enzymatique colorimétrique au CHOD) 3.92 mmol/L (3.61-5.68)



Validé par : Dr Abdeladim TAKI IMRANI



Docteur A. TAKI IMRANI : Pharmacien Biogiste, Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles.  
 Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie.

**2207250048 – Mme Fatna M'KHANTAR**

07-09-2021

0.90

**Triglycérides**


(Dosage enzymatique GPO)

0.90 g/L

1.03 mmol/L

(0.40–1.60)

(0.46–1.82)



07-09-2021

49.4

**Acide Urique**

(Dosage enzymatique à l'uricase)

55.4 mg/L

332.4 μmol/L

(26.0–60.0)

(156.0–360.0)

Validé par : Dr Abdeladim TAKI IMRANI



Docteur A. TAKI IMRANI : Pharmacien Biogiste, Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles.  
 Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie.

**Date du prélèvement :** 25-07-2022 à 10:51  
**Code patient :** 2109070135  
**Né(e) le :** 01-01-1944 (78 ans)  
**Édité le :** 25-07-2022



**Mme M'KHANTAR Fatna**

Dossier N° : **2207250048**

Prescripteur : Dr ALAOUI EL HASSANI Bouchra

## HEMATOCYTOLOGIE

(Yumizen H550 /Sysmex XS-1000i)

### NUMERATION FORMULE SANGUINE

<b>GLOBULES ROUGES (Erythrocytes)</b>	4.33	M/mm <sup>3</sup>	(4.20–5.55)
Hémoglobine	<b>11.6</b>	g/dL	(12.0–16.0)
Hématocrite	<b>33.4</b>	%	(35.0–50.0)
VGM (Volume globulaire moyen)	<b>77.1</b>	fL	(80.0–100.0)
TCMH	<b>26.8</b>	pg	(27.0–32.0)
CCMH	34.7	g/100ml	(30.0–35.0)
<b>GLOBULES BLANCS (Leucocytes)</b>	<b>12500</b> /mm <sup>3</sup>		(4 000–10 000)
Polynucléaires Neutrophiles	60.8%	Soit	<b>7600</b> /mm <sup>3</sup>
Polynucléaires Eosinophiles	<b>0.9%</b>	Soit	113/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires Basophiles	0.3%	Soit	38/mm <sup>3</sup>
Lymphocytes	30.3%	Soit	3 788/mm <sup>3</sup>
Monocytes	7.7%	Soit	<b>963</b> /mm <sup>3</sup>
<b>PLAQUETTES</b>	281 000	/mm <sup>3</sup>	(150 000–400 000)

Validé par : Dr Abdeladim TAKI IMRANI



Page 1 / 3