

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Laboratoire SEKKAT
de Maladie

MUPRAS
Mutuelle de Prévention et d'Actions Sociales

de Royal Air MELOUCH Mohamed

033-800
1-711634
ND 56  
125956

Autre

**Maladie**

**Dentaire**

**Optique**

**Cadre réservé à l'adhérent(e)**

**Matricule :**

**Société :**

**Actif**

**Pensionné(e)**

**Autre**

**Nom & Prénom :**

**Adresse :**

**Date de naissance :**

**Téléphone :**

**Total des frais engagés :**

**Dhs**

**Dr Omar HAJJI**

**Oncologue Médical**

**Salaj Bd. La Grande Ceinture Ain Diab**

**Casa-Anfa - Tél : 0520 66 68 90/91/92**

**Fax : 0522 64 81 52/0522 79 75 94**

**Date de consultation :**

**Nom et prénom du malade :**

**Lien de parenté :**

**Nature de la maladie :**

**En cas d'accident préciser les causes et circonstances :**

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 13/08/2022

Signature de l'adhérent(e) :

Aurémentation : AA-215/2019

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires   | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes  |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---|---|
| 26<br>et<br>22  | Ca                | 55                    |  | <b>Dr Omar HAJI</b><br>Oncologue Médical<br>Salab Bd. La Grande Ceinture Ain Diab<br>Casablanca - Tél : 0520 66 68 90/91/92<br>Fax : 0522 64 81 52 / 0522 79 75 94<br><br><b>091071043</b> |

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur   | Date                   | Montant de la Facture |
|--|------------------------|-----------------------|
| <p>PHARMACIE YASMINA<br/>77 RUE IBNOU NAFIS<br/>HAY Yasmina Berrechid<br/>Tél : 05 22 53 31 88</p> | <p>22/08<br/>2022.</p> | <p>1297,00</p>        |

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date     | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|----------|------------------------------|------------------------|
| ORAN D'Analyse Médicale<br>Ref : 12 Berechid        | 12/08/12 |                              | 800,00                 |

#### AUXILIAIRES MEDICAUX



| Cachet et signature<br>du Particulier | Date des<br>Soins | Nombre |     |     |     | Montant détaillé<br>des Honoraires |
|---------------------------------------|-------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------------------|
|                                       |                   | A M    | P C | I M | I V |                                    |
|                                       |                   |        |     |     |     |                                    |
|                                       |                   |        |     |     |     |                                    |
|                                       |                   |        |     |     |     |                                    |
|                                       |                   |        |     |     |     |                                    |
|                                       |                   |        |     |     |     |                                    |

#### **RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES**

**Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.**

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES  | Dents Traitées  | Nature des Soins | Coefficient | INP : <input type="text"/>                          |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
|--|---|------------------|-------------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|--|---|
|   |   |                  |             | <b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b> <input type="text"/> |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
|  |   |                  |             | <b>MONTANTS DES SOINS</b> <input type="text"/>      |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
|  |   |                  |             | <b>DEBUT D'EXECUTION</b> <input type="text"/>       |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
|  |   |                  |             | <b>FIN D'EXECUTION</b> <input type="text"/>         |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
| <b>O.D.F PROTHESES DENTAIRES</b>   | <b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b>  |                  |             |   |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
|  | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>H</b></td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>G</b></td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>B</b></td> </tr> </table> <p><b>(Création, remont, adjonction)</b><br/>Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p> |                  |             | <b>H</b>  |  | 25533412 | 21433552 | 00000000 | 00000000 | <b>G</b> |  | 00000000 | 00000000 | 35533411 | 11433553 | <b>B</b> |  | <b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b> <input type="text"/> |
| <b>H</b>   |   |                  |             |   |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
| 25533412   | 21433552  |                  |             |   |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
| 00000000   | 00000000  |                  |             |   |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
| <b>G</b>   |   |                  |             |   |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
| 00000000   | 00000000  |                  |             |   |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
| 35533411   | 11433553  |                  |             |   |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
| <b>B</b>   |   |                  |             |   |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
|  |   |                  |             | <b>MONTANTS DES SOINS</b> <input type="text"/>      |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
|  |   |                  |             | <b>DATE DU DEVIS</b> <input type="text"/>           |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
|  |   |                  |             | <b>DATE DE L'EXECUTION</b> <input type="text"/>     |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
| VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS                                       |   |                  |             |   |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |
| VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION                                    |   |                  |             |   |  |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |   |



# مصحة الساحل لأنكلووجيا CLINIQUE D'ONCOLOGIE LE LITTORAL

**LA SEMINA** N° 153 - Février 1988

090003906

RADIOOTHERAPIE CONFORMATIONNELLE ET DOSIMETRIE 3D • RADIOTHERAPIE PAR MODULATION D'INTENSITE : IMRT • RAPID-ARC • RADIO-CHIRURGIE STEREOTAXIQUE • CURIETHERAPIE HAUT DEBIT • MEDECINE NUCLEAIRE • ONCOLOGIE MEDICALE • ONCO. HEMATOLOGIE GREFFE DE MOELLE OSSEUSE • RADILOGIE • CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE • CHIRURGIE REPARATRICE ET ESTHETIQUE • SOINS INTENSIFS REANIMATION ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR • SOINS PALLIATIFS • RADIOFREQUENCE • DEPISTAGE ET DIAGNOSTIC DES TUMEURS

22) H 12

Brownish Roseate

133, 60

1

Bromatof

S.V

180

Lyrica® 75 mg - 56 gélules  
P.P.V : 307,00 DH

307104

Writing 3

347,02

- Xerophytes

30. waf re

Dolman

38' Haul

51

15

140,000

Nebel Galilie

⑥ Vifan

129

**Dr OMAR HAJJI**  
Oncologue Medical  
alaj3 Bd. La Grande Culture Ain Diab  
Anfa Tél : 0520 66 68 90/91/92  
2 64 81 52 / 0522 79 75 94

Salai 3, Bd la Grande Ceinture Ain Diab, 20180 Casablanca, Maroc

Pour accéder : Tram ligne 1, direction Ain Diab, station Le Littoral

 (+212) 5 20 66 68 90 / 91 / 92 •  (+212) 5 22 79 75 94 / (+212) 5 22 79 86 96 • [@contact@cliniquelelittoral.ma](mailto:@contact@cliniquelelittoral.ma)

[www.cliniquelelittoral.ma](http://www.cliniquelelittoral.ma)



# Xarelto® 10 mg



Xarelto® 10 mg / 10 cps  
Rivaroxaban

P.P.V. : 347,00 DH  
Bayer S.A.



6 118 001 090648

# DOLTRAM® 37,5 mg/325 mg

Tramadol/Paracétamol

Comprimé pelliculé, boîte de 20

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament:

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition :

Les substances actives sont:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Chlorhydrate de tramadol | 37,50 mg  |
| Paracétamol              | 325,00 mg |

Pour un comprimé pelliculé:

Noyau: cellulose en poudre, amidon prégalatinisé, carboxyméthylamidon sodique, amidon de maïs, stéarate de magnésium.

Pelliculage: Opadry jaune, Cire de carnauba.

Liste des excipients à effet notable : sans objet

## Indications thérapeutiques :

DOLTRAM® est une association de 2 antalgiques, le tramadol et le paracétamol, qui agissent ensemble pour soulager votre douleur.

DOLTRAM® est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin pense qu'une association de tramadol et de paracétamol est nécessaire.

DOLTRAM® est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

## Posologie :

Mode et voie d'administration.

Les comprimés sont destinés à la voie orale.

Les comprimés doivent être avalés tels quels avec une boisson en quantité suffisante. Ils ne doivent pas être fractionnés, ni mordus.

## Durée du traitement.

Prenez toujours DOLTRAM® en respectant strictement les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## Fréquence d'administration.

DOLTRAM® ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Sauf prescription contraire de votre médecin, la dose initiale recommandée chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans est de 2 comprimés.

Des doses supplémentaires peuvent être administrées en fonction des besoins; se conformer à la prescription médicale.

L'intervalle entre les prises doit être au minimum de 6 heures.

Ne pas prendre plus de 8 comprimés de DOLTRAM® par jour.

Votre médecin peut augmenter le délai entre les prises:

- si vous avez plus de 75 ans; une maladie du rein; une maladie du foie.

Il est conseillé de prendre DOLTRAM® pour une durée la plus courte possible.

## Contre-indications :

Ne prenez jamais DOLTRAM®, comprimé pelliculé:

- si vous avez eu une réaction allergique (par exemple: éruption cutanée, gonflement du visage, sifflement ou difficulté respiratoire) après avoir pris du tramadol ou du paracétamol ou tout autre composant de DOLTRAM®.
- en cas d'intoxication aiguë par l'alcool, par les somnifères, par d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions),
- si vous prenez en même temps des Inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression ou la maladie de Parkinson) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par DOLTRAM®.

• si vous avez une maladie grave du foie,

• si vous avez une épilepsie non contrôlée par un traitement.

## Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, DOLTRAM®, comprimé pelliculé peut provoquer des effets indésirables.

Très Fréquents (plus de 1 patient sur 10):

• nausées, sensation de vertige, somnolence.

Fréquents (moins de 1 patient sur 10, mais plus de 1 patient sur 100):

• vomissements, digestion difficile (constipation, ballonnements),

• démangeaisons, sueurs, maux de tête, tremblements,

• confusion, troubles du sommeil, modifications de l'humeur.

Peu Fréquents (moins de 1 patient sur 100, mais plus de 1 patient sur 1000):

• augmentation de la pression artérielle, troubles de la circulation sanguine (éruptions, urticaire par exemple), picotements,

membres, bourdonnements d'oreille, contractions musculaires, amnésie, difficultés à avaler, sang dans les selles, fissures buccales.

Rares (moins de 1 patient sur 1000, mais plus de 1 patient sur 10000):

• convulsions, difficulté à coordonner les mouvements, transitoire (syncope). Diminution du taux de sucre dans le sang.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés chez des patients traités par tramadol ou par paracétamol. Contactez votre médecin.

DOLTRAM®, comprimé pelliculé :

• sensation de faiblesse lorsque vous vous levez après être assis ou couché, modification de l'appétit, faiblesse musculaire, respiration ralente ou

l'activité, modification de la perception, aggravation d'un asthme existant.

• dans de rares cas, une éruption cutanée, signe de réaction allergique, peut se développer avec un gonflement soudain du visage et du cou, des difficultés respiratoires ou une diminution de la pression artérielle et un évanouissement. Si vous êtes concernés, arrêtez votre traitement et consultez immédiatement votre médecin. Vous ne devez pas continuer de prendre ce traitement.

30,00

F F V 3 L M D  
P E R 6 0 A Z Z  
L O T L 1 1 4 7



cardiaque,

modification de

# DOLTRAM® 37,5 mg/325 mg

Tramadol/Paracétamol

Comprimé pelliculé, boîte de 20

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament:

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition :

Les substances actives sont:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Chlorhydrate de tramadol | 37,50 mg  |
| Paracétamol              | 325,00 mg |

Pour un comprimé pelliculé:

Noyau: cellulose en poudre, amidon prégalatinisé, carboxyméthylamidon sodique, amidon de maïs, stéarate de magnésium.

Pelliculage: Opadry jaune, Cire de carnauba.

Liste des excipients à effet notable : sans objet

## Indications thérapeutiques :

DOLTRAM® est une association de 2 antalgiques, le tramadol et le paracétamol, qui agissent ensemble pour soulager votre douleur.

DOLTRAM® est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin pense qu'une association de tramadol et de paracétamol est nécessaire.

DOLTRAM® est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

## Posologie :

Mode et voie d'administration.

Les comprimés sont destinés à la voie orale.

Les comprimés doivent être avalés tels quels avec une boisson en quantité suffisante. Ils ne doivent pas être fractionnés, ni mordus.

## Durée du traitement.

Prenez toujours DOLTRAM® en respectant strictement les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## Fréquence d'administration.

DOLTRAM® ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Sauf prescription contraire de votre médecin, la dose initiale recommandée chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans est de 2 comprimés.

Des doses supplémentaires peuvent être administrées en fonction des besoins; se conformer à la prescription médicale.

L'intervalle entre les prises doit être au minimum de 6 heures.

Ne pas prendre plus de 8 comprimés de DOLTRAM® par jour.

Votre médecin peut augmenter le délai entre les prises:

- si vous avez plus de 75 ans; une maladie du rein; une maladie du foie.

Il est conseillé de prendre DOLTRAM® pour une durée la plus courte possible.

## Contre-indications :

Ne prenez jamais DOLTRAM®, comprimé pelliculé:

- si vous avez eu une réaction allergique (par exemple: éruption cutanée, gonflement du visage, sifflement ou difficulté respiratoire) après avoir pris du tramadol ou du paracétamol ou tout autre composant de DOLTRAM®.
- en cas d'intoxication aiguë par l'alcool, par les somnifères, par d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions),
- si vous prenez en même temps des Inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression ou la maladie de Parkinson) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par DOLTRAM®.

• si vous avez une maladie grave du foie,

• si vous avez une épilepsie non contrôlée par un traitement.

## Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, DOLTRAM®, comprimé pelliculé peut provoquer des effets indésirables.

Très Fréquents (plus de 1 patient sur 10):

• nausées, sensation de vertige, somnolence.

Fréquents (moins de 1 patient sur 10, mais plus de 1 patient sur 100):

• vomissements, digestion difficile (constipation, ballonnements),

• démangeaisons, sueurs, maux de tête, tremblements,

• confusion, troubles du sommeil, modifications de l'humeur.

Peu Fréquents (moins de 1 patient sur 100, mais plus de 1 patient sur 1000):

• augmentation de la pression artérielle, troubles de la circulation sanguine (éruptions, urticaire par exemple), picotements,

membres, bourdonnements d'oreille, contractions musculaires, amnésie, difficultés à avaler, sang dans les selles, fissures buccales.

Rares (moins de 1 patient sur 1000, mais plus de 1 patient sur 10000):

• convulsions, difficulté à coordonner les mouvements, transitoire (syncope). Diminution du taux de sucre dans le sang.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés chez des patients traités par DOLTRAM® ou par paracétamol. Contactez votre médecin.

DOLTRAM®, comprimé pelliculé :

• sensation de faiblesse lorsque vous vous levez après être assis ou couché, modification de l'appétit, faiblesse musculaire, respiration ralente ou

l'activité, modification de la perception, aggravation d'un asthme existant.

• dans de rares cas, une éruption cutanée, signe de réaction allergique, peut se développer avec un gonflement soudain du visage et du cou, des difficultés respiratoires ou une diminution de la pression artérielle et un évanouissement. Si vous êtes concernés, arrêtez votre traitement et consultez immédiatement votre médecin. Vous ne devez pas continuer de prendre ce traitement.

30,00

F F V 3 L M D  
P E R 6 0 A Z Z  
L O T L 1 1 4 7



cardiaque,  
modification de

sensibilité

des os,

ons, la

tre, la

ence

# DOLTRAM® 37,5 mg/325 mg

Tramadol/Paracétamol

Comprimé pelliculé, boîte de 20

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament:

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition :

Les substances actives sont:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Chlorhydrate de tramadol | 37,50 mg  |
| Paracétamol              | 325,00 mg |

Pour un comprimé pelliculé:

Noyau: cellulose en poudre, amidon prégalatinisé, carboxyméthylamidon sodique, amidon de maïs, stéarate de magnésium.

Pelliculage: Opadry jaune, Cire de carnauba.

Liste des excipients à effet notable : sans objet

## Indications thérapeutiques :

DOLTRAM® est une association de 2 antalgiques, le tramadol et le paracétamol, qui agissent ensemble pour soulager votre douleur.

DOLTRAM® est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin pense qu'une association de tramadol et de paracétamol est nécessaire.

DOLTRAM® est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

## Posologie :

Mode et voie d'administration.

Les comprimés sont destinés à la voie orale.

Les comprimés doivent être avalés tels quels avec une boisson en quantité suffisante. Ils ne doivent pas être fractionnés, ni mordus.

## Durée du traitement.

Prenez toujours DOLTRAM® en respectant strictement les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## Fréquence d'administration.

DOLTRAM® ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Sauf prescription contraire de votre médecin, la dose initiale recommandée chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans est de 2 comprimés.

Des doses supplémentaires peuvent être administrées en fonction des besoins; se conformer à la prescription médicale.

L'intervalle entre les prises doit être au minimum de 6 heures.

Ne pas prendre plus de 8 comprimés de DOLTRAM® par jour.

Votre médecin peut augmenter le délai entre les prises:

- si vous avez plus de 75 ans; une maladie du rein; une maladie du foie.

Il est conseillé de prendre DOLTRAM® pour une durée la plus courte possible.

## Contre-indications :

Ne prenez jamais DOLTRAM®, comprimé pelliculé:

- si vous avez eu une réaction allergique (par exemple: éruption cutanée, gonflement du visage, sifflement ou difficulté respiratoire) après avoir pris du tramadol ou du paracétamol ou tout autre composant de DOLTRAM®.
- en cas d'intoxication aiguë par l'alcool, par les somnifères, par d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions),
- si vous prenez en même temps des Inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression ou la maladie de Parkinson) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par DOLTRAM®.

• si vous avez une maladie grave du foie,

• si vous avez une épilepsie non contrôlée par un traitement.

## Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, DOLTRAM®, comprimé pelliculé peut provoquer des effets indésirables.

Très Fréquents (plus de 1 patient sur 10):

• nausées, sensation de vertige, somnolence.

Fréquents (moins de 1 patient sur 10, mais plus de 1 patient sur 100):

• vomissements, digestion difficile (constipation, ballonnements),

• démangeaisons, sueurs, maux de tête, tremblements,

• confusion, troubles du sommeil, modifications de l'humeur.

Peu Fréquents (moins de 1 patient sur 100, mais plus de 1 patient sur 1000):

• augmentation de la pression artérielle, troubles de la circulation sanguine (éruptions, urticaire par exemple), picotements,

membres, bourdonnements d'oreille, contractions musculaires, amnésie, difficultés à avaler, sang dans les selles, fissures buccales.

Rares (moins de 1 patient sur 1000, mais plus de 1 patient sur 10000):

• convulsions, difficulté à coordonner les mouvements, transitoire (syncope). Diminution du taux de sucre dans le sang.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés chez des patients traités par tramadol ou par paracétamol. Contactez votre médecin.

DOLTRAM®, comprimé pelliculé :

• sensation de faiblesse lorsque vous vous levez après être assis ou couché, modification de l'appétit, faiblesse musculaire, respiration ralente ou

l'activité, modification de la perception, aggravation d'un asthme existant.

• dans de rares cas, une éruption cutanée, signe de réaction allergique, peut se développer avec un gonflement soudain du visage et du cou, des difficultés respiratoires ou une diminution de la pression artérielle et un évanouissement. Si vous êtes concernés, arrêtez votre traitement et consultez immédiatement votre médecin. Vous ne devez pas continuer de prendre ce traitement.

30,00

F F V 3 L M D  
P E R 6 0 A Z Z  
L O T L 1 1 4 7



cardiaque,  
modification de

sensibilité

des os,

ons, la

tre, la

tre, la

Ras Al Khaimah, E.A.U  
Industries Pharmaceutiques du Golfe  
Sous licence des laboratoires Juphar



Distribué par les laboratoires Novopharma

app: 140,00 Dhs



\* Conserver au-dessous de 25°C.

La pomade MEBO se présente sous forme de tubes pliants de 15, 30 ou 75 grammes.

MEBO permet la conservation l'apparence physique de la pomade mais sans que cela puisse affecter l'efficacité du produit.

#### Présentation

MEBO est conçu pour les personnes qui souffrent de rhumatismes et d'arthrites, il aide à soulager les douleurs et à améliorer la mobilité.

#### Indication

MEBO est principalement utilisé pour traiter les rhumatismes et les maladies articulaires.

MEBO est également utilisé pour traiter les rhumatismes et les maladies articulaires.

MEBO est également utilisé pour traiter les rhumatismes et les maladies articulaires.

MEBO est également utilisé pour traiter les rhumatismes et les maladies articulaires.

MEBO est également utilisé pour traiter les rhumatismes et les maladies articulaires.

MEBO est également utilisé pour traiter les rhumatismes et les maladies articulaires.

MEBO est également utilisé pour traiter les rhumatismes et les maladies articulaires.

MEBO est également utilisé pour traiter les rhumatismes et les maladies articulaires.

- Absorbant la chaleur résiduelle dans les brûlures aigües.
- Activant l'épithérialisation dans un ordre exceptionnellement acceptable.
- Absorbant la chaleur résiduelle dans les brûlures aigües.
- MEBO a été utilisé avec succès dans le traitement des brûlures suivantes:
- Brûlures de premier degré, où le soulagement de la douleur et la cicatrisation sont remarquables, ex. coup de soleil.
- Les brûlures de second degré superficielles et profondes. Si elles sont profondes, une greffe de peau n'est pas nécessaire et la régénération aura lieu à partir des glandes et des follicules pilaires démyélisées et des tissus subcutanés.
- Les brûlures de troisième degré, pour isoler les plaies.
- La douleur et activer le cicatrisation (une moyenne de 7 jours a été rapportée).
- Le pied du diabète ainsi que les ulcères de jambe.
- La suite d'une séance de laser, d'un peeling chimique ou d'une abrasion dermique.
- Les plaies chroniques Y compris les plaies obstétriques.
- Les plaies chirurgicales Y comme les ulcères buccaux.
- Les crevasses des membranes muqueuses comme les ulcères buccaux.
- Les places des membranes muqueuses comme les ulcères buccaux.
- Brûlures de premier degré (brûlures superficielles) MEBO doit être appliquée aussitôt que possible. Une couche fine de pommade (à peu près 1 mm d'épaisseur) doit couvrir la région brûlée.
- Brûlures de premier degré (brûlures superficielles) MEBO doit être appliquée aussitôt que possible. Une couche fine de pommade (à peu près 1 mm d'épaisseur) doit couvrir la région brûlée.

Ras Al Khaimah, E.A.U  
Industries Pharmaceutiques du Golfe  
Sous licence des laboratoires Juphar



Distribué par les laboratoires Novopharma

app: 140,00 Dhs



\* Conserver au-dessous de 25°C.

La pomade MEBO se présente sous forme de tubes pliants de 15, 30 ou 75 grammes.

**Présentation**  
MEBO peut changer, spécialement durant les saisons chaudes mais sans que cela puisse affecter l'efficacité du produit.

Pendant la conservation l'apparence physique de la pomade MEBO est conservée grâce à l'application régulière de la pomade

MEBO est constitué principalement de plantes naturelles cosmétiques dues à l'huile de sésame.

**Mises en garde**  
MEBO n'est pas étonnant des effets secondaires à ce produit n'ont pas été rapportés, à l'exception de rares réactions allergiques dues à l'huile de sésame.

MEBO est constitué principalement de plantes naturelles cosmétiques dues à l'huile de sésame.

**Toxicité et effets secondaires**  
Puisque MEBO ne présente aucun danger pour le nouveau-né il peut être utilisé pendant l'allaitement.

Une couche fine de MEBO doit être appliquée sur le bout du sein sous un léger pression, et renouvelée 3 à 4 fois par jour.

Puisque MEBO ne présente aucun danger pour le nouveau-né il peut être utilisé pendant l'allaitement.

Les crèmes sous des bouteilles de sésame sont utilisées dans la chaleur résiduelle dans un ordre exceptionnellement acceptable.

Absorbant l'épithéialisation dans les brûlures aigües.

- Absorbant la chaleur résiduelle dans les brûlures aigües.
- Activant l'épithéialisation dans un ordre exceptionnellement acceptable.
- MEBO a été utilisé avec succès dans le traitement des brûlures suivantes:
- Brûlures de premier degré, où le soulagement de la douleur et la cicatrisation sont remarquables, ex. coup de soleil.
- Les brûlures de deuxième degré superficielles et profondes. Si il est appliquée proprement, une goutte de peau n'est pas nécessaire et la régénération aura lieu à partir des glandes et des follicules pilaires démyélisés et des tissus subcutanés.
- Les brûlures de troisième degré, pour isoler les plaies.
- La douleur et activer le cicatrisation (une moyenne de 7 jours a été et activée la cicatrisation (une moyenne de 7 jours a été rapportée).
- Les brûlures chroniques Y compris les plaies obstétriques.
- Les plaies chirurgicales Y compris les ulcères buccaux.
- Les plaies des membranes muqueuses comme les ulcères buccaux.
- Les crèmes des talons et des bouts de seins.
- Mode d'administration

Sous licence des laboratoires Juphar  
Industries Pharmaceutiques du Golfe  
Ras Al Khaimah, E.A.U.



Distribué par les laboratoires Novopharma

**PPV: 140,00 Dhs**

- Une couche fine de **MEBO** doit être appliquée sur le bout du sein sous un léger parfumement, et renouvelée 3 à 4 fois par jour. Les cravasses des bouts de seins peuvent être utilisées pendant l'allaitement.
- **MEBO** ne présente aucun danger pour le nouveau-né il suffit d'appliquer une couche fine de **MEBO** sur le bout du sein sous un léger parfumement, et renouvelée 3 à 4 fois par jour. Les cravasses des bouts de seins peuvent être utilisées pendant l'allaitement.
- **MEBO** est constitué principalement de plantes naturelles commestibles purées. Jusqu'à présent des effets secondaires à ce produit n'ont pas été rapportés, à l'exception de rares réactions allergiques dues à l'huile de sésame.
- Pendant la conservation l'apparence physique de la pommade **MEBO** peut changer, spécialement durant les saisons chaudes mais sans que cela puisse affecter l'efficacité du produit.
- La pommade **MEBO** se présente sous forme de tubes pliants de 15, 30 ou 75 grammes.
- Conserver au-dessous de 25°C.

## Indications

- Activité de l'épithérialisation dans les bûlures aiguës.
  - Absorbant la chaleur résiduelle dans les bûlures aiguës.
  - Accélérable.

SUBJETS

- MERGERS & ACQUISITIONS avec succès dans le traitement des brûlures

Les brûlures

- La catéchèse est une action d'accompagnement et de formation à la foi qui vise à faire croire au Christ et à l'enseigner.

10/10

- et la régulation offre une possibilité pas nécessaire d'apporter plus de gaine au paupier.

la douleur

- Les brûlures de troisième degré, pour isoler les plaies, redire

Digitized by srujanika@gmail.com

- meutounges dans le but de préparer les plaies à la greffe.

Les plaines

- rapportée). Les modifications dans la moyenne de 7 jours à être

A la suite de

- Le pied du diabète que ainsi que les ulcères de jambe.

Les Pâles C

- [Admission demande](#)

buccaux.

- Les plaies des membranes mucosées comme les ulcères

Mode d'admin

- Les crevasses des talons et des bouts de seins.

#### **Bridges**

- Bilingualism and the Brain** —

Page 11

- sur une application aussi solide. Une couche fine de

# **Biomartial Plus**

**Lipofer**  
microcapsules

**Vitamine C**

## **FORME ET PRÉSENTATION :**

Gélule, Boîte de 30.

## **COMPOSITION :**

Substance active: Lipofer (fer micronisé et microencapsulé), Agent de charge: Amidon de Maïs, Substance active: Vitamine C, Anti-agglomérant: Stéarate de magnésium, Lubrifiant: Talc, Capsule Végétale (HPMC).

## **PROPRIÉTÉS :**

**Biomartial Plus** est à base de fer et de vitamine C.

La vitamine C a un effet antioxydant qui protège les cellules contre les dommages infligés par les radicaux libres. Elle participe aussi à la formation des globules rouges et augmente l'absorption du fer.

Le fer est un oligoélément nécessaire à notre organisme. Il contribue notamment :

A la synthèse de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène,

Au fonctionnement normal du système immunitaire,

A réduire la fatigue,

Au développement normal des tissus.

## **CONSEILS D'UTILISATION :**

Selon la prescription médicale.

## **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Fabriqué par HEALTH INNOVATION

Promotion médicale : HEALTH INNOVATION

Food supplement, is not a medecine.

ONSSA N°: CAPV.59.217.19

N°Enregistrement au ministère de la santé:

DA20202007430DMP/20UCA/V1





090003906

RADIOOTHERAPIE CONFORMATIONNELLE ET DOSIMETRIE 3D • RADIOTHERAPIE PAR MODULATION D'INTENSITE : IMRT • RAPID-ARC •  
RADIO-CHIRURGIE STEREOTAXIQUE • CURIETHERAPIE HAUT DEBIT • MEDECINE NUCLEAIRE • ONCOLOGIE MEDICALE • ONCO. HEMATOLOGIE  
GREFFE DE MOELLE OSSEUSE • RADIOLoGIE • CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE • CHIRURGIE REPARATRICE ET ESTHETIQUE • SOINS INTENSIFS  
REANIMATION ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR • SOINS PALLIATIFS • RADIOFREQUENCE • DEPISTAGE ET DIAGNOSTIC DES TUMEURS

NOM & PRÉNOM :

Date :

22/7/2016

AGE :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

N° ADMISSION :

### BILANS BIOLOGIQUES

HEMOGRAMME : NFS + plq

BILAN D'HÉMOSTASE : TP  PDF  TCK  Fibrinogène  INR  D-dimères

### BILAN BIOCHIMIQUE :

Ionogramme Complet  Na+  Mg+  Protéines  Fer sérique  Glycémie à jeun   
 Reserve alcaline  K+  Ca++  Albumine  Ferritine  Cl-  Ph   
 EPP  Triglycerides  Cholest.total  HDL  LDL  Urée + creat   
 Clairance de la créatinine  Bilirub. totale  Bilirubine directe  ALAT  ASAT   
 Ph. alcalines  LDH  GammaGT  Hemoculture  ECBU   
 CRP  PCT  CPK  CPKmb  TROPONINE

### MARQUEURS TUMORAUX

ACE  CA19-9  CA15-3  CA125  AFP  Thyroglobuline   
 PSA  Calcitonine  NSE  B2 microglobuline  β-HCG

### AUTRES :

A reexamen le 12/8/2018



# Laboratoire Sekkat d'analyses médicales

**Docteur Mohamed Sekkat**  
Médecin Biologiste en analyses médicales

Adresse : N°12 Lot. El Youssef II, intersection rue Mohamed V et rue  
Moqawama, à coté de BMCE bank, Berrechid  
Tél. : 05 22 51 77 81 / Email : laboratoiresekkat@gmail.com  
Urgences : 06 25 63 42 71

Biochimie - Hématologie - Virologie - Bactériologie - Parasitologie - Mycologie -  
Immunologie - Hormonologie - Toxicologie - Biologie de la reproduction

## Facture

N° facture : 2022-07870

Patient : Mr BELOUCH Mohamed

Édité le : 12/08/2022

Date prélèvement : 12/08/2022

| Analyses  | Valeur en B | Montant |
|---|-------------|---------|
| NUMERATION FORMULE SANGUINE AVEC PLAQUETTES (NFS) | 80          | 80,00   |
| Glycémie à jeun                                   | 15          | 15,00   |
| Urée  | 30          | 30,00   |
| clairance créatinine DFG                          | 50          | 50,00   |
| ASAT ( Aspartate Aminotransférase )               | 50          | 50,00   |
| ALAT ( Alanine Aminotransférase )                 | 50          | 50,00   |
| Calcium   | 30          | 30,00   |
| Antigène spécifique de la prostate                | 300         | 300,00  |
| ACE : Antigène Carcino-Embryonnaire               | 250         | 250,00  |
| <b>Total B</b>                                    | 855         | 855,00  |
| <b>APB</b>  | 1,5         | 0,00    |
| <b>Total de Remise effectuée</b>                  |             | 55,00   |
| <b>Total</b>                                      |             | 800,00  |

Arrêtée la présente facture à la somme de : Huit cent dirhams\*\*\*

LABORATOIRE SEKKAT  
D'Analyses Médicales  
Rédaction  
Lot 1 El Youssef II N°12 Berrechid



# LABORATOIRE SEKKAT D'ANALYSES MEDICALES

## مختبر سقاط للتحاليل الطبية

▷: X+.Θ.+O ΘΕΕ.Ε ΙΣΤ+.Λ.ΙΣΗ.ΕΕΣΘΘΣΣ.

Biochimie - Hématologie - Virologie - Bactériologie - Parasitologie - Mycologie -  
Immunologie - Hormonologie - Toxicologie - Biologie de la reproduction

**Dr. Mohamed SEKKAT**  
Médecin Biologiste

### Médecin Biologiste

#### Wiedemann Biologische

Pvt du: 12/08/2022

**Mr BELOUCH Mohamed**

Edition du : 12/08/2022

Né(e) le :01/01/1955

**Dossier N° :** 10A07917033



C.I.N : W5619



Page : 1 / 4

## **HEMATOLOGIE (BC5380)**

|  |   | Valeurs Usuelles                               | Antériorité         |
|--|---|--|---------------------|
| <b>NUMERATION FORMULE SANGUINE AVEC PLAQUETTES</b> |   |  |                     |
| <b>HEMATIES</b>                                    | : | <b>3,00</b> M/mm <sup>3</sup>                  | ( 4,2 - 5,7 )       |
| Hémoglobine  | : | <b>7,9</b> g/dL                                | ( 14 - 17 )         |
| Hématocrite  | : | <b>25,9</b> %                                  | ( 40 - 52 )         |
| VGM  | : | <b>86</b> fL                                   | ( 80 - 100 )        |
| TCMH   | : | <b>26</b> pg                                   | ( 27 - 32 )         |
| CCMH   | : | <b>31</b> %                                    | ( 30 - 35 )         |
| <b>LEUCOCYTES</b>                                  | : | <b>5 670</b> /mm <sup>3</sup>                  | ( 4000 - 10000 )    |
| <b>FORMULE LEUCOCYTAIRE</b>                        |   |  |                     |
| Polynucléaires Neutrophiles                        | : | <b>65,0</b> % Soit <b>3686/mm<sup>3</sup></b>  | ( 2000 - 7500 )     |
| Lymphocytes  | : | <b>23,8</b> % Soit <b>1349/mm<sup>3</sup></b>  | ( 1500 - 4000 )     |
| Monocytes  | : | <b>8,2</b> % Soit <b>465/mm<sup>3</sup></b>    | ( 200 - 800 )       |
| Polynucléaires Eosinophiles                        | : | <b>2,6</b> % Soit <b>147,42/mm<sup>3</sup></b> | ( 100 - 400 )       |
| Polynucléaires Basophiles                          | : | <b>0,4</b> % Soit <b>22,68/mm<sup>3</sup></b>  | ( Inférieur à 150 ) |
| <b>PLAQUETTES</b>                                  | : | <b>330 000</b> /mm <sup>3</sup>                | ( 150000 - 400000 ) |
| VMP  | : | <b>8,80</b> fl                                 | ( 6,5 - 12 )        |

LABORATOIRE SEKKAL  
D'Analyses Médicales  
Dr. SEKKAL Med  
Lot 22 Youssef II N° 10  
Béchar - Algérie

N°12 Lot. El Yousser II, intersection rue Mohamed V et rue Mouqawama, à coté de BMCE bank, BERRCHID  
05.22.51.77.81 . E-mail : laboratoiresekkat@gmail.com



# LABORATOIRE SEKKAT D'ANALYSES MEDICALES



Dr. Mohamed SEKKAT  
Médecin Biologiste

## مختبر سقاط للتحاليل الطبية

لـ: X+θ.θ.θ ΘΖΖ.Ε ΙΣ+θ.λ.ΙΣΗ ΕΕΞΘΘΞ.

Biochimie - Hématologie - Virologie - Bactériologie - Parasitologie - Mycologie -  
Immunologie - Hormonologie - Toxicologie - Biologie de la reproduction

Pvt du: 12/08/2022  
Edition du : 12/08/2022  
Dossier N° : 10A07917033  
C.I.N : W5619

Mr BELOUCH Mohamed

Né(e) le :01/01/1955



Page : 3/4

### BIOCHIMIE (BECKMAN COULTER AU 480)

Calcium  
(Technique : Arsenazo )


:

88,0 mg/L  
2,2 mmol/L

Valeurs Usuelles

Antériorité

( 90 - 105 )  
( 2,3 - 2,6 )



LABORATOIRE SEKKAT  
D'Analyses Médicales  
Dr. SEKKAT Med  
Lot LE Yousser N°12 Berrechid

N°12 Lot. El Yousser II, intersection rue Mohamed V et rue Mouqawama, à coté de BMCE bank, BERRCHID

05.22.51.77.81 . E-mail : laboratoiresekkat@gmail.com

Urgences: 06.25.63.42.71



# LABORATOIRE SEKKAT D'ANALYSES MEDICALES

## مختبر سقاط للتحاليل الطبية

CEXTO.θ.Ο ΘΕΤΕ ΗΣΤΗ.Λ.ΗΝΙ.ΕΕΣΘΘΣ.

Biochimie - Hématologie - Virologie - Bactériologie - Parasitologie - Mycologie -  
Immunologie - Hormonologie - Toxicologie - Biologie de la reproduction

**Dr. Mohamed SEKKAT**  
Médecin Biologiste

Pvt du: 12/08/2022  
Edition du : 12/08/2022  
Dossier N° : 10A07917033  
C.I.N : W5619

Mr BELOUCH Mohamed  
Né(e) le :01/01/1955



Page : 4/4

### MARQUEURS TUMORAUX (ACCESS II )

Valeurs Usuelles

Antériorité

#### Antigène spécifique de la prostate

Technique : Chimiluminescence (ACCESS II)

|                   |   |             |                  |
|-------------------|---|-------------|------------------|
| <b>PSA totale</b> | : | 74,04 ng/ml | 30,65 (30/05/22) |
|-------------------|---|-------------|------------------|

Interprétation :

Age :

< 40 : < 1.4 ng/ml  
40 - 50 : < 2.0 ng/ml  
50 - 60 : < 3.1 ng/ml  
60 - 70 : < 4.1 ng/ml  
> 70 : < 4.4 ng/ml

**ACE : Antigène Carcino-Embryonnaire**

Technique:Chimiluminescence (ACCESS II)

- Interprétation :

Valeurs usuelles en ng/ml :

Sujets sains.....: Inférieur à 4.8 ng/ml

NB: 95% des sujets sains : Inférieur à 2.5 ng/ml

Fumeur.....: Inférieur à 5.5 ng/ml

245,36 ng/ml

61,76 (30/05/22)

ESR (3)

Valeurs Usuelles

Antériorité

LABORATOIRE SEKKAT  
JED'Analyses Médicales  
Centre SEKKAT Med  
Lot E Youssef II N° 12 Berrechid



N°12 Lot. El Yousser II, intersection rue Mohamed V et rue Mouqawama, à coté de BMCE bank, BERRCHID

05.22.51.77.81 . E-mail : laboratoiresekkat@gmail.com

Urgences: 06.25.63.42.71