

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-640815

126326

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11048 Société : RAM

☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : MARZOUKI Charifa

Date de naissance : 22-02-1975

Adresse : Habitué

Tél. : 0643146200 Total des frais engagés : 557,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : Dr. ARAZI - HIBA - HOSNA

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☒ Enfant

Nature de la maladie : Affection pédiatrique.

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 18.08.2022

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20/05/22	C		3000	Dr. MISSRI Mohamed Wahid Gynéc - Obstétricienne bd Ibn Tachine, Rés. Fatimazahra 7 Casablanca - G.S.N. 05 61 15 49 08

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie HAY KARAM Casa 98, Bis Av. C. Hay Karam Q.I. Sidi Bernoussi Tél : 05 22 35 93 82 INPE : 09 203 1046	22/05/22	166,90
Pharmacie HAY KARAM Casa 98, Bis Av. C. Hay Karam Q.I. Sidi Bernoussi Tél : 05 22 35 93 82 INPE : 09 203 1046	23/07/22	84,90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES																		
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																		
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.																		
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>														
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>														
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table> [Création, remont, adjonction] Fonctionnel. Thérapeutique. nécessaire à la profession			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
H																		
25533412	21433552																	
00000000	00000000																	
D	G																	
00000000	00000000																	
35533411	11433553																	
B																		
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>														
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>														
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS																		
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION																		

Mohamed Wahid

ALISTE
GIE OBSTETRIQUE
IOGRAPHIE

ecin du C.H.U. Ibn Rochd

chfine au dessus de la poste
nce Fatima EL ZAHRAA 07
Tél.: 05 22 60 60 09
05 22 61 19 68

Gsm: 06 61 15 49 08

الطبيب محمدي وحيد
اختصاصي

مراض النساء والتوليد
التصوير بالصدى

بيب سابقا بالمستشفى الجامعي ابن رشد

شارع ابن تاشفين عند البريد

إقامة فاطمة الزهراء 07

الهاتف : 05 22 60 60 09

05 22 61 19 68

المستعجلات : 06 61 15 49 08

om Casablanca, le 20 MAI 2022

* ROWI HIBA
HOSTA

M Sforzella
8200 1fois

21 Dmyhesh
8400 721

166,900
Pharmacie HAY KARAM CASA
98, Bis Av. C Hay Karam
Q.I. Sidi Belmoussi - Casa
Tél : 0522 35 93 82
INPE : 092031046

Dr. MISSRI Mohamed Wahid
Gynécologue - Obstétricienne
Bd Ibn Tachine Res. Fatima Zahra
Casablanca - GSM: 06 61 15 49 08

Cooper

COOPER PHARMA
PPC: 82,00 DH



3 401365 334248

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé

Dydrogesterone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

- Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant les dernières semaines de votre grossesse.

- Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

- **Grossesse** : Il peut y avoir un risque accru d'une anomalie congénitale du pénis impliquant l'ouverture urinaire (hypospadias) chez les enfants dont les mères ont pris certaines progestatifs. Cependant, ce risque accru n'a pas été clairement confirmé. Plus de 9 millions de femmes enceintes ont pris Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. À ce jour, aucune preuve n'indique que l'utilisation de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé pendant la grossesse a un effet nocif.

- **Allaitement** : Ne prenez pas Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé si vous allaitez. On ne sait pas si Duphaston passe dans le lait maternel et affecte l'enfant. Les études d'autres progestatifs montrent que de petites quantités passent dans le lait maternel.

- **Fertilité** : aucune preuve n'indique que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé diminue la fertilité, s'il est pris comme recommandé par votre médecin.

- **Conduite de véhicules et utilisation de machines** : Vous pouvez vous sentir un peu somnolente ou avoir des sensations vertigineuses après la prise de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. En particulier dans les premières heures après la prise. Si cela arrive, ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines. Attendez de voir comment vous affecte Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé, avant de conduire ou d'utiliser des machines.

- **Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé contient du lactose** : Si vous avez une intolérance à certains sucres, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament. Cela inclut les problèmes rares transmis dans les familles qui affectent la façon dont le corps utilise le lactose, comme un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose-galactose.

- **Comment prendre ce médicament ?** :
1. **Qu'est-ce que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?**
2. **Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament ?**
3. **Comment prendre ce médicament ?**
4. **Quels sont les effets indésirables éventuels ?**
5. **Comment conserver ce médicament ?**
6. **Contenu de l'emballage et autres informations.**

1. **Qu'est-ce que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?**

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé contient une substance active appelée dydrogesterone.

La dydrogesterone est une hormone progestagène féminine. Les hormones progestagènes ont le même effet que la progestérone naturelle. Elle régule avec les hormones œstrogènes le cycle menstruel.

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- **Pour les problèmes que vous pourriez avoir lorsque votre corps ne produit pas suffisamment de progestérone :**

- contrôler le cycle menstruel irrégulier ;

- croissance de la muqueuse utérine en dehors de l'utérus (endométriose) ;

- menstruations douloureuses ;

- infertilité due à un faible niveau de progestérone ;

- soutien de la phase lutéale dans le cadre des cycles induits lors d'un traitement de fécondation assistée.

- limiter le risque d'une menace de fausse couche ou si vous avez eu des fausses couches à répétition.

- **Thérapie hormonale de substitution (THS)**

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé est également utilisé en combinaison avec des œstrogènes :

- afin d'éviter des anomalies de la muqueuse de l'utérus lors du traitement de la ménopause.

- pour soulager les symptômes de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.

- pour prévenir les complications de la ménopause.



6

maphar

Km 10, route côtière 111, Quartier industriel,
Zenata, Ain Sabaa Casablanca - Maroc
DUPHASTON 10MG CP PEL B20 PPRV : 84DH90

écrit. Ne le donnez
cif, même si les signes

e, parlez-en à
que aussi à tout
s cette notice. Voir

Docteur MISSRI Mohamed Wahid

SPECIALISTE

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE

ECHOGRAPHIE

Ancien Médecin du C.H.U. Ibn Rochd

Bd Ibn Tachfine au dessus de la poste

Résidence Fatima EL ZAHRAA 07

Tél.: 05 22 60 60 09

05 22 61 19 68

Gsm: 06 61 15 49 08

Nom

A ROWI

الطبيب مصري محمد وحيد

اختصاصي

أمراض النساء والتوليد

التصوير بالصدى

طبيب سابقا بالمستشفى الجامعي ابن رشد

شارع ابن تاشفين عند البريد

إقامة فاطمة الزهراء 07

الهاتف: 05 22 60 60 09

05 22 61 19 68

المستعجلات: 06 61 15 49 08

Casablanca, le

A I B A H O S T M A

34,90



Dmyhshk

721

An 23/7/20

Pharmacie HAY KARAM CASA
98, Bis Av. C Hay Karam
Q.1. Sidi Bernoussi, Casa
Tél: 0522 35 93 82
INPE: 092031046

الطبيب مصري محمد وحيد
Dr. MISSRI Mohamed Wahid
Gynécologie Obstétrique
Bd Ibn Tachfine au dessus de la Poste
Résidence Fatima EL Zahraa 07
Gsm: 06 61 15 49 08

...medicament oestrogénique.
 précoce Il existe peu de données sur les risques du
 est utilisé pour traiter la ménopause. Il y a un
 de risque chez les plus jeunes femmes. Cela signifie
 des avantages et des risques pour les femmes
 HS pour la ménopause. L'heure que
 mes âgées.

édicaux. Avant
 t vous
 erson
 cliniq
 traite
 n exan
 is par
 es et ne
 par rapp
 ulièrement
 0 mg, comp
 pelliculé.



la muqueuse de l'utérus (cancer de l'endomètre)
 mmes dont l'utérus est intact, la prise prolongée
 l'oestrogène seul a un risque plus élevé de cancer et
 sement anormal de la muqueuse utérine. Ce risque
 aire peut être évité en combinant des comprimés de
 insi que des œstrogènes pendant au moins 12 jours.
 cer du sein Des données suggèrent que la prise de
 éstro-progestatif et probablement aussi la prise
 seuls peut augmenter le risque de cancer du sein.
 e dépend de la durée d'utilisation du THS et apparaît
 ues années. Cependant, il retourne au niveau normal
 ue années (au plus 5 ans) après l'arrêt du traitement

cin vous demandera de contrôler régulièrement vos
 informer en cas de certains changements.

er ovarien Le cancer de l'ovaire est rare - beaucoup plus
 cancer du sein. L'utilisation d'un THS par œstrogènes
 une combinaison d'œstrogènes et de progestatifs a été
 une légère augmentation du risque de cancer ovarien.
 cancer ovarien varie en fonction de l'âge. Par exemple,
 mes âgées entre 50 et 54 ans qui ne prennent pas de
 gnostic de cancer ovarien sera posé chez 2 femmes
 moyenne sur une période de 5 ans. Chez les femmes
 n THS pendant 5 ans, il y aura environ 3 cas sur 2000
 (soit environ un cas supplémentaire).

tout le monde.

Effets indésirables rapportés avec Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé seul :

Arrêtez de prendre Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et consultez un médecin immédiatement si vous notez un des effets indésirables suivants :

- troubles du foie : les signes peuvent inclure un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux (jaunisse), une sensation de faiblesse, un malaise ou une douleur abdominale (touche moins de 1 patiente sur 100),
- réactions allergiques : les signes peuvent inclure une difficulté à respirer ou des réactions telles qu'une sensation d'être malade, des vomissements, une diarrhée ou une pression artérielle faible (touche moins de 1 patiente sur 1000),
- gonflement de la peau autour du visage et de la gorge qui peut entraîner des difficultés à respirer (touche moins de 1 patiente sur 1000).

Arrêtez immédiatement de prendre Duphaston 10 et si vous remarquez un des effets indésirables mentionnés ci-dessus.

Autres effets indésirables rapportés avec Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé utilisé seul :

Très fréquent (touche plus de 1 personne sur 10)

- Saignement vaginal
- Fréquents (touche moins de 1 patiente sur 10) :**
- migraine, maux de tête
- nausées, vomissement, douleurs abdominales
- règles irrégulières, importantes ou douloureuses,
- absence de règles ou règles moins fréquentes que la normale.
- douleur/tension des seins

Peu fréquents (touche moins de 1 patiente sur 100) :

- humeur dépressive
- sensations vertigineuses
- vomissement
- Problèmes de foie (jaunissement de la peau ou des yeux, sensation de faiblesse, sensation générale de malaise ou mal de ventre)
- réactions allergiques cutanées : éruption, démangeaisons importantes ou urticaire.
- augmentation du poids

Rares (touche moins de 1 patiente sur 1000) :

- augmentation de la taille des tumeurs sensibles aux progestatifs qu'un méningiome)
- anémie due à une destruction des cellules rouges du sang (hémolytique)
- hypersensibilité