

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Nº M21- 070231

(128063)

Optique Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10366

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BENDOUILA

HASSAN -

Date de naissance : 22.11.1955

Adresse : LOT ILHAM, Rue 7 N° 57 H.H CASA

Tél. : 06 18 29 09 75 Total des frais engagés : 643,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 22/06/2012

Nom et prénom du malade : BENDOUILA CINAINAA Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 27/06/2012

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/06/22	C1	1	180011	INPE 137 KIAA Medecine Générale El N° 65 Rue Tél 05 22 06 22 El Wifak 3 RUE Casablanca Tél: 05 22 00 05 56

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE HAY EL WIFAK Lot 778 El Wifak 3 Rue El Oued Casablanca Tél: 05 22 00 05 56	27/06/22	493,20

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				<input type="text"/>
<img alt="Diagram of upper and lower dental arches with numbered teeth from 1 to 8. A coordinate				

Docteur Widad El Khadraj

Médecine Générale

ECHOGRAPHIE

ECG

Surveillance de Grossesse

Nutrition



الدكتورة وداد الخضر

الطب العام

الفحص بالصدى

تخطيط القلب

مراقبة الحمل

الحمية الطبية وتخفيض الوزن

Casablanca, le : 27/06/2022 الدار البيضاء في :

WID KHADRA BEN BOU LA CHAIBAA

116,300Z

11 - OROKEN 200mls

131,00

180mls 408

21 - Bacti loc gel

123,60

50g x 3 584

31 - Imexium 40

403,20

قطر الـ 10ml قرطاف

حي الوفاق 3 زنقة 65 رقم 59 الألفة الدار البيضاء (قرب صيدلية الوفاق)

Hay Wifak 3 Rue 65, N° 59 El Oulfa - Casablanca (Prés de pharmacie Al Wifak)

Tél.: 05 22 891 927

PHARMACIE HAY EL WIFAK
Lot 772 El Wifak 3 Rue 65
El Oulfa - Casablanca
Tél : 05 22 90 05 56

Al Wifak
GSP/SALE 16 05 22 89 1941
Tél. 05 22 06 70
GSP/SALE 16 05 22 89 1941
Tél. 05 22 06 70

S. COMMENT CONSERVER ORKENE

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

La substance active est : Oxytetracycline comprimé pellucide

Ce que contient Orkene 200 mg, comprimé pellucide

Et la substance active est : Oxytetracycline comprimé pellucide

Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-légoût ou avec les ordures ménagères.

Un utilisation mesurée à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous ne utilisez plus.

Les moments de prise : La dose à prendre :

Les moments de prise : La dose à prendre :

Les moments de prise : La dose à prendre :

Les moments de prise : La dose à prendre :

Les moments de prise : La dose à prendre :

Les moments de prise : La dose à prendre :

Les moments de prise : La dose à prendre :

Les moments de prise : La dose à prendre :

Les moments de prise : La dose à prendre :

Les moments de prise : La dose à prendre :

Les moments de prise : La dose à prendre :

Les moments de prise : La dose à prendre :

Les moments de prise : La dose à prendre :

Les moments de prise : La dose à prendre :

5. INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

meilleur résultat les effets indésirables, vous contactez à tout effet

4. CONSEILS D'EMPLOI

Orkene 200 mg, comprimé pellucide

1 - Utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée

sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour

de consistance des médicaments contenus dans un emballage.

La date de péremption indiquée sur l'emballage indique le délai auquel

les médicaments sont encore utilisables. La date de péremption indiquée

sur l'emballage indique le délai auquel les médicaments sont encore utilisables.

La date de péremption indiquée sur l'emballage indique le délai auquel

les médicaments sont encore utilisables.

La date de péremption indiquée sur l'emballage indique le délai auquel

les médicaments sont encore utilisables.

La date de péremption indiquée sur l'emballage indique le délai auquel

les médicaments sont encore utilisables.

La date de péremption indiquée sur l'emballage indique le délai auquel

les médicaments sont encore utilisables.

La date de péremption indiquée sur l'emballage indique le délai auquel

les médicaments sont encore utilisables.

La date de péremption indiquée sur l'emballage indique le délai auquel

les médicaments sont encore utilisables.

La date de péremption indiquée sur l'emballage indique le délai auquel

les médicaments sont encore utilisables.

La date de péremption indiquée sur l'emballage indique le délai auquel

les médicaments sont encore utilisables.

3. COMMENT PRENDRE ORKENE

Orkene 200 mg, comprimé pellucide

1 - Prenez une dose quotidienne de 100 mg.

2. COMMENT SE PROTEGER DES ANTIBIOTIQUES

Orkene 200 mg, comprimé pellucide

1 - Ne prenez pas d'antibiotiques pour guérir une infection.

1. COMMENT SE PROTÉGÉR DES ANTIBIOTIQUES

Orkene 200 mg, comprimé pellucide

1 - Ne prenez pas d'antibiotiques pour guérir une infection.

Déclaration des effets secondaires

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

octobre 2017/V1.

CONSÉLIS / EDUCATION SANITAIRES

QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?

aux bactéries. Ils ne soulèvent pas de allergies contre les infections dues aux

virüs. Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce

que certains patients présentent des réactions négatives aux antibiotiques.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré

la résistance à certains antibiotiques. Les bactéries peuvent alors se multiplier et donner

des infections plus graves. Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

Les bactéries peuvent également échapper à la thérapie médicale.

- Citalopram, de l'imipramine ou du clomipramine (utilisés dans le traitement de la dépression).
- Diazepam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, comme relaxant musculaire ou contre l'épilepsie).
- Phénytoïne (utilisée contre l'épilepsie). Si vous prenez de la phénytoïne, votre médecin devra vous contrôler lorsque vous commencez ou arrêtez de prendre INexium.
- Médicaments pris pour fluidifier le sang, tels que la warfarine. Votre médecin devra peut-être vous contrôler lorsque vous commencez ou arrêtez de prendre INexium.
- Cilostazol (utilisé pour traiter la claudication intermittente – une douleur dans les jambes quand vous marchez qui est due à un apport sanguin insuffisant).
- Cisapride (utilisée pour l'indigestion et les brûlures d'estomac).
- Digoxine (utilisée pour les problèmes cardiaques);
- Méthotrexate (médicament de chimiothérapie utilisé à forte dose pour traiter le cancer) – si vous prenez une forte dose de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par INexium.
- Tacrolimus (transplantation d'organes).
- Rifampicine (utilisée pour le traitement de la tuberculose).
- Millepertuis (*Hypericum perforatum*) (utilisé pour traiter la dépression).

Si votre médecin a prescrit des antibiotiques tels que l'amoxicilline et la clarithromycine ensemble avec INexium pour traiter les ulcères dus à une infection par *Helicobacter pylori*, il est très important de dire à votre médecin quels sont tous les autres médicaments que vous prenez.

INexium avec des aliments et boissons

Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou quand votre estomac est vide.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin évaluera si vous pouvez prendre INexium pendant cette période. On ne sait pas si INexium passe dans le lait maternel. Par conséquent, vous ne devriez pas prendre INexium si vous allaitez.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que INexium exerce une influence sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des outils ou des machines. Cependant, des effets indésirables tels que des étourdissements et des perturbations visuelles peuvent survenir peu fréquemment ou rarement (voir rubrique 4). Si vous êtes dans ce cas, vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines.

INexium contient du saccharose

INexium contient des sphères de sucre qui sont un type de sucre. Si votre médecin vous a dit que vous êtes intolérants au sucre, veuillez prendre contact avec votre médecin avant de prendre c

3. Comment prendre INexium

Veillez à toujours prendre ce médicament ou pharmacien. Vérifiez auprès de votr

- Si vous prenez ce médicament depuis (particulièrement si vous le prenez depuis un an).
- Si votre médecin vous a prescrit de prendre ce médicament quand vous en sentez le besoin, vous devez contacter votre médecin si les symptômes changent.

Quantité à prendre

- Votre médecin vous dira combien de comprimés vous devez prendre, et pour combien de temps. Ceci dépendra de votre état, de votre âge et de la manière dont fonctionne votre foie.
- Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

Utilisation chez les adultes âgés de 18 ans et plus

Traitement du brûlant causé par la maladie du reflux gastro-oesophagien (RGO) :

Bacilac forte

L. rhamnosus GG - Bb lactis

Intelicaps®

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament

Qu'est ce que BACILAC forte Intelicaps®?

■ **Bacilac forte Intelicaps®** est un complément alimentaire qui contient deux types de bactéries, des Lactobacilles et des Bifidobactéries.

■ Chaque gélule de **Bacilac forte Intelicaps®** contient 1 milliard de *Lactobacillus rhamnosus GG* et 5 milliards de *Bifidobacterium lactis* lyophilisées.

■ Au sein de chaque gélule de **Bacilac forte Intelicaps®**, les Lactobacilles et les Bifidobactéries sont protégées par une nouvelle technologie de microencapsulation qui assure une meilleure survie. Ce nouveau procédé d'Italia S.p.A. garantit la qualité du produit.

Quelles sont les propriétés nutritionnelles de BACILAC forte Intelicaps®?

■ **Bacilac forte Intelicaps®** est utilisé dans le cas où la flore intestinale a besoin d'aide : ballonnements, flatulence, selles molles, etc.

■ **Bacilac forte Intelicaps®** favorise une bonne digestion et stimule notre flore intestinale après une thérapie prolongée d'antibiotiques.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BACILAC forte Intelicaps®?

■ **Bacilac forte Intelicaps®** est sûr et aucun effet secondaire n'est connu à ce jour.

■ Il n'existe pas de contre-indication à la prise de **Bacilac forte Intelicaps®**.

Cependant les personnes souffrant de troubles importants de l'immunité doivent être suivies par leur médecin.

■ Ne pas utiliser **Bacilac forte Intelicaps®** en cas d'allergie ou d'hypersensibilité à un ou plusieurs excipients du produit.

Comment prendre BACILAC forte Intelicaps®?

■ **Bacilac forte Intelicaps®** peut être utilisé par les enfants à partir de l'âge de 6 ans et les adultes.

■ La dose recommandée est de 1 à 2 gélules par jour.

■ Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.

Comment conserver BACILAC forte Intelicaps®?

■ **Bacilac forte Intelicaps®** peut être conservé à température ambiante, dans un endroit sec.

■ La date d'expiration est mentionnée sur la face externe de l'emballage et fait référence au produit non ouvert et correctement conservé.

Quelle est la composition de BACILAC forte Intelicaps®?

■ Les gélules de **Bacilac forte Intelicaps®** sont d'origine 100% végétale.

ns 1 milliard de bactéries lyophilisées
5 GG

Cellulose microcristalline, Hypromellose,
oxyde de silicium,

VÉSA

CILAC forte Intelicaps®?

cez pas à demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien .

Distribué par :



bottu

82, Allée des Casuarinas - Ain Seba - Casablanca

