

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après-soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

## Déclaration de Maladie

N° W21-723008

428332



Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10565

Société : ROYAL AIR MAROC

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : LACHGUEN BRAHIM

Date de naissance : 1967 10 6 13

Adresse : 107 YAKSOUB Rue 19 N°10 HAY

HASSANI CASABLANCA

Tél. : 062 244 8214

Total des frais engagés :

616

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 19/10/2018

Nom et prénom du malade : JABER

Lien de parenté : Lui-même

Nature de la maladie : Constipation

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 19/10/2018



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
19/08/22	Cs	300 DH	300,00	INP : 08M77774
01/09/22	Contrôle	9+	81,00	DR. IBN CHALAL FATIMA AZZAHRA HOSPITAL - GASTROENTEROLOGUE 2619 82 72 50 12 E-mail : dr.azzahra@outlook.com GASTRO - GASTROENTEROLOGUE 01/09/22

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Formateur	Date	Montant de la Facture
cté PHARMACIE ASMAA SARL AU clement Nour Lot N°98 RDC charif Hay Hassani, Casab	19/08/22	142,00
PHARMACIE ASMAA SARL AU clement Nour Lot N°98 RDC charif Hay Hassani, Casab	01/09/22	183,80

### ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



### O.D.F PROTHESES DENTAIRES



### DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25523412	21433652
	00000000	00000000
D	00000000	00000000
	25523411	11433653
G		
B		

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel Thérapeutique nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DES TRAVAUX

MONTANTS  
DES SOINS

DEBUT  
D'EXECUTION

FIN  
D'EXECUTION

COEFFICIENT  
DES TRAVAUX

MONTANTS  
DES SOINS

DATE DU  
DEVIS

DATE DE  
L'EXECUTION



Spécialiste en hépato-gastro-  
entérologie et proctologie

- Hépatite virale, Estomac, Vésicule biliaire et intestins
- Proctologie médicale et Chirurgicale
- Certificat universitaire d'échographie
- Fibroscopie digestive et coloscopie
- Ancien Médecin au CHU Ibn Rochd

اختصاصية في أمراض الجهاز  
الهضمي الكبد وأمراض المخرج

- إلتهاب الكبد الفيروسي، المعدة، المريء والأمعاء
- أمراض المخرج وجراحة البواسير
- دبلوم الفحص بالصدى
- المنظار الداخلي
- طبيبة سابقة بالمركز الإستشفائي ابن رشد

Casablanca, Le :

01/09/2022

H-jabs l'm bna

89,80

1) leostyl gутte



Ste PHARMACIE ASMAA  
BART 200  
Loyer mensuel 1000000 RDC  
Sidi El Khadra 10 Hassan II Casab

Bo

gratte le su


2) cibolax  
15,50



Ste PHARMACIE ASMAA  
BART 200  
Loyer mensuel 1000000 RDC  
Sidi El Khadra 10 Hassan II Casab

15

123,90



05 22 28 61 57 [docteuribnghazala@gmail.com](mailto:docteuribnghazala@gmail.com)

548, Angle Bd. 2 Mars et Bd. modibokita, Res ASSOUNA Appt 13 (devant mosquée ASSOUNA)

548 ، ملتقى شارع 2 مارس وشارع موديبو كيتا ، إقامة السنة رقم 13 ( أمام مسجد السنة )



Spécialiste en hépato-gastro-  
entérologie et proctologie

- Hépatite virale, Estomac, Vésicule biliaire et intestins
- Proctologie médicale et Chirurgicale
- Certificat universitaire d'échographie
- Fibroscopie digestive et coloscopie
- Ancien Médecin au CHU Ibn Rochd

اختصاصية في أمراض الجهاز  
الهضمي الكبد وأمراض المخرج

- إلتهاب الكبد الفيروسي، المعدة، المرارة والأمعاء
- أمراض المخرج وجراحة البواسير
- دبلوم الفحص بالصدى
- المنظار الداخلي
- طبيبة سابقة بالمركز الإستشفائي ابن رشد

Casablanca, Le :

19/08/2022

Louisa Jaber

142,20

1) fortuna sach



1 sach/ 1 l d'eau

4 l à prendre  
la veille de la coloscopie.



05 22 28 61 57 docteuribnghazala@gmail.com

548, Angle Bd. 2 Mars et Bd.modibokita, Res ASSOUNA Appt 13 ( devant mosquée ASSOUNA)

548 ، ملتقي شارع 2 مارس وشارع موديبوكينا ، إقامة السنة رقم 13 ( أمام مسجد السنة)

لِبَرَلِي جِي پَلَسْ ۳

لِبَرَلِي جِي -  
لِبَرَلِي -

لِبَرَلِي -

لِبَرَلِي -

لِبَرَلِي لَونِجْ لَبَرَلِي -  
لِبَرَلِي -

~~لِبَرَلِي - لِبَرَلِي~~

maphar

Boulevard Aïchaïa n°6

Quartier industriel Sid Berroua Casablanca - Maroc

FORTRANS SAC B4

P.P.V. : 142,20 DH



6118001181209

LOT : W03071  
Exp : 01/2025

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ?
3. Comment prendre FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

#### 1. QU'EST-CE QUE FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Laxatif osmétique - code ATC : A06AD65 (A : appareil digestif et métabolisme).

Ce médicament permet le lavage colique assurant la préparation des patients ayant une exploration médicale ou une intervention chirurgicale.

FORTRANS appartient à un groupe de médicaments appelés laxatifs osmotiques contenant du macrogol (polyéthylène glycol ou PEG) à poids moléculaire élevé et des sels additionnels.

FORTRANS permet d'augmenter la quantité d'eau dans l'intestin, ce qui augmente la fréquence des selles dont le contenu devient de plus en plus liquide et, à terme, provoque un lavage de l'intestin.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ?

##### Ne prenez jamais FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet :

- Si vous êtes allergique au macrogol 4000 ou au sulfate de sodium anhydre ou au bicarbonate de sodium, ou au chlorure de sodium ou de potassium ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament et mentionnés en rubrique 6.
- Si vous présentez une altération grave de l'état général telle qu'une déshydratation sévère ou une atteinte cardiaque sévère (insuffisance cardiaque).
- Si vous présentez un des problèmes digestifs suivants :

• Un cas grave de stade avancé ou autre atteinte grave du colon entraînant une fragilité de la

Pour les médicaments à marge thérapeutique étroite ou à demi-vie courte, l'efficacité peut être particulièrement affectée.

##### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

**FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet contient du sodium.**

#### 3. COMMENT PRENDRE FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

FORTRANS doit être administré par voie orale et doit être utilisé chez l'adulte.

La dose recommandée est de 1 litre de solution pour 15 à 20 kg de poids corporel, ce qui représente une dose moyenne de 3 à 4 litres de solution reconstituée.

Chaque sachet doit être dissout dans 1 litre d'eau. Mélanger jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute.

Une fois la poudre dissoute, la solution doit être absorbée sans délai. Chaque litre de solution doit être ingéré en 1 heure. FORTRANS peut être ingéré soit en une prise (3 à 4 litres le soir précédent l'examen) soit en prise fractionnée (2 litres le soir avant l'examen, 1 à 2 litres le matin de l'examen ou bien 3 litres le soir et 1 litre le matin de l'examen).

Selon la prescription de votre médecin, vous devrez boire un verre de 250 ml de la solution toutes les 10 à 15 minutes.

Vous devez avoir fini d'ingérer la solution au moins 3 ou 4 heures avant le début de l'examen.

##### Si vous avez pris plus de FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet que vous n'auriez dû

Si vous pensez que vous avez pris plus de FORTRANS que vous n'auriez dû, informez votre médecin et buvez suffisamment d'eau ou de liquide pour éviter de vous déshydrater.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Après avoir pris ce médicament, vous aurez des envies fréquentes d'aller à la selle. Ceci est normal et montre que le médicament est en train d'agir. Restez à proximité de toilettes jusqu'à ce que les effets du médicament s'arrêtent.

Informez votre médecin immédiatement et arrêtez de prendre FORTRANS si vous ressentez les effets suivants :

- Une réaction allergique sévère se manifestant par un gonflement de la face, des lèvres, de la langue, ou de la gorge ou une difficulté à respirer ou par un malaise sévère avec chute de la pression artérielle (choc anaphylactique).
- Les effets indésirables incluent :
  - Très fréquent (chez plus d'1 patient sur 10) :
  - Nausées, douleurs abdominales et distension (gonflement) abdominale.
  - Fréquent (jusqu'à 1 patient sur 10) :
  - Vomissements.
  - Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) : Autres

# CIBALAX®

FOS - *Bifidobacterium lactis*

ctis

e 5g

PPC : 134 DH 00



5 420044 310395

alimentaire riche en fibres alimentaires et contient  
ration de bifidobactéries qui favorisent naturellement  
gulières et un bon transit intestinal

t 1 milliard  
sées.  
sont  
e nouvelle  
on qui leur  
nouveau  
méliore la

## Comment prendre CIBALAX®?

- Cibalax® peut être utilisé par les enfants à partir de l'âge de 5 ans et les adultes.
- La dose recommandée est de 1 stick par jour le matin ou le midi. Cette dose peut être augmentée si nécessaire à maximum 2 sticks par jour à prendre en 2 prises séparées.
- Dissoudre le stick dans un verre d'eau ou de jus de fruit ou encore dans les céréales du petit-déjeuner.

## Dans quels cas CIBALAX® est-il utilisé?

- Cibalax® favorise naturellement le bon fonctionnement intestinal et l'émission régulière des selles.
- Cibalax® est efficace dès les premiers jours d'utilisation.
- Cibalax® n'entraîne pas de prise de poids.
- Cibalax® peut être utilisé de manière prolongée.

Quelles sont les informations à connaître

## Quelques conseils supplémentaires d'hygiène de vie

- Démarrez votre journée par la prise d'un grand verre d'eau et veillez à boire 1,5 à 2 litres de liquides par jour.
- Prenez vos repas assis et à heure fixe en mangeant lentement et en mâchant bien les aliments.
- Favorisez les aliments riches en fibres.
- Maintenez une activité physique régulière.

# Laroxyl® 40 mg/ml

Solution buvable en gouttes  
Amitriptyline

# Laroxyl®

Amitriptyline

PPV: 39DH80  
PER: 05/25  
LOT: L1663

#### Renseignements généraux

##### buvable :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:

- allergie connue à l'amitriptyline
- risque de glaucome : fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
- difficultés pour uriner d'origine prostatique ou autre,
- infarctus du myocarde récent
- traitement par un autre antidépresseur (iproniazide, nialamide) ou par le sultopride.

Le médicament ne doit généralement pas être utilisé dans les cas suivants, sauf avis contraire de votre médecin:

- traitement par un autre antidépresseur (moclobémide, toloxatone) ou par des médicaments agissant sur le système cardiovasculaire (clonidine ou apparentés, etadrénaline, noradrénaline, dopamine par voie injectable).

##### Mises en garde spéciales

Ne pas interrompre brutalement le traitement.

De rares cas de syndrome de sevrage (céphalées, malaises, nausées, anxiété, troubles du sommeil) ayant été observés à l'arrêt du traitement, il est recommandé de réduire progressivement les doses et de surveiller tout particulièrement le patient durant cette période.

**La prise concomitante d'amitriptyline avec de l'alcool, de la clonidine, de la guanafacine, un IMAO-A sélectifs (moclobémide, toloxatone), du linézolide, ou un sympathomimétique alpha et bêta (voie parentérale) est déconseillée (voir Interactions).**

Comme pour tous les autres antidépresseurs, l'action de ce médicament ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours. Il est donc important de poursuivre le traitement régulièrement, même en l'absence d'amélioration immédiate, sauf avis contraire de votre médecin.

**Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux :**

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles

anxieux, vous pouvez parfois avoir des idées d'auto-agression (agression envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement. Vous êtes plus susceptible de présenter ce type de manifestations dans les cas suivants:

- si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression dans le passé.
  - si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré que le risque de comportement suicidaire était accru chez les adultes de moins de 25 ans présentant une maladie psychiatrique et traités par antidépresseur.
- Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, contactez immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital.

##### Précautions d'emploi

Insomnie ou nervosité en début de traitement peuvent justifier une diminution de la posologie ou un traitement transitoire symptomatique.

En cas de virage maniaque franc, le traitement par l'amitriptyline sera interrompu et, le plus souvent, un neuroleptique sédatif sera prescrit.

Chez les patients épileptiques ou ayant des antécédents d'épilepsie, il est prudent de renforcer la surveillance clinique et électrique, en raison de la possibilité d'abaissement du seuil épileptogène. La survenue de crises convulsives impose l'arrêt du traitement.

L'amitriptyline doit être utilisée avec prudence :

- chez le sujet âgé présentant :
- une plus grande sensibilité à l'hypotension orthostatique et à la sédation;
- une constipation chronique (risque d'iléus paralytique);
- une éventuelle hypertrophie prostatique;
- chez les sujets porteurs de certaines affections cardiovasculaires, en raison des effets quinidiniques, tachycardisants et hypotenseurs de cette classe de produits;
- chez les patients présentant des neuropathies avec troubles neurovégétatifs sévères, en raison de l'augmentation du risque d'hypotension orthostatique;
- dans les insuffisances hépatiques et rénales, en raison du risque de surdosage (voir Pharmacocinétique).

Ce médicament contient 2,5 mg d'alcool par goutte. Il est déconseillé chez les patients souffrant de maladie du foie, d'alcoolisme, d'épilepsie, de même que chez les femmes enceintes.

##### Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Vous ne devez pas prendre ce médicament en même temps que certains autres médicaments de la dépression (iproniazide, nialamide) ou le sultopride. Vous ne devez généralement pas prendre ce médicament, sauf avis contraire de votre médecin, en même temps que :

- certains médicaments de la dépression (moclobémide, toloxatone)
- certains médicaments agissant sur le système cardiovasculaire (clonidine et apparentés, et