

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou de celles peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

128469

Déclaration de Maladie : N° P19- 0007862

Maladie **Dentaire** **Optique** **Autres**

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule 1027

Société :

RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom JADOUAL MOHAMED Date de naissance :

Adresse :

Tél. 06 67 93 16 81 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 31/08/22

Nom et prénom du malade : JADOUAL Mohamed Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : la goutte

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : med

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
31/8/22	C2		300 DHT	Docteur SATTI Hicham RHUMATOLOGUE Bd Bouziane Résidence Farhatine 5 Appt.5 Sidi Othmane - Casablanca Tél.: 05 22 37 14 14
06/9/22	C		CV	Docteur SATTI Hicham RHUMATOLOGUE Bd Bouziane Résidence Farhatine 5 Appt.5 Sidi Othmane - Casablanca Tél.: 05 22 37 14 14

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
VSSA	31/8/22	3521,00 DHT
BLANCA	6/9/22	8650

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
DR BELAHDI	01/09/22	B200	= 220,00 Dhs

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

ODF PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
	00000000	00000000
G	00000000	00000000
	35533411	11433553
B		

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

SA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Hicham SATI

Spécialiste en Rhumatologie

Maladies Rhumatismales

Articulations - OS. et Colonne vertébrale

- Ancien Professeur Assistant des Hôpitaux de France
 - Diplôme Universitaire de la douleur
 - Membre International du Collège Americain de rhumatologie et de la Société Française de Rhumatologie
 - Diplôme en Rhumatologie Pédiatrique

Sur Rendez-vous - Horaire Continue



الدكتور هشام ساطع

إختصاصي أمراض المفاصل

والروماتزم والعظام والعمود الفقري

أستاذ مساعد بالمستشفيات

الفرنسية ساختا

عضو المعهد الأمريكي لأمراض الروماتيزم

والجمعية الفرنسية لأمراض الروماتيزم

- دليل حامض في علاج الألته

برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

سیده اشرفیه اسنادی

- دبیوم سی روما تیرم اه طفال

المؤعد - التهافت المستمر

بالموعد - التوقيت المستمر

الدار البيضاء، في : Casablanca, le :

35, 16

Dedur

30.00

Trace

979 6

Te zo zover

3521, 10

شارع يوزيان، إقامة فرحتين 5، الشقة 5 ،الطريق الثاني (قرب أسيما) - الدار البيضاء :الهاتف - الفاكس : 05 22 37 14 14

Bd. Bouziane, Résidence Farhatine 5 , Appt. 5, 2ème Etage, (A côté d'Acima) - Casablanca - Tél./Fax: 05 22 37 14 14

MEZOR® 20 mg et 40 mg

Boîtes de 7, 14 et 28 Gélules gastro-résistantes

Esomeprazole (DCI) magnésium dihydroné

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, même si leur nom, même si les signes de leur maladie sont différents des vôtres.

- Si un des effets indésirables décrits ci-dessous vous remplacez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. QUEST-CE QUE MEZOR 20 mg ET 40 mg, GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Médicaments pour les troubles liés à l'acidité, inhibiteurs de la pompe à protons

- Code ATC : A02BC05.

MEZOR contient une substance appelée esomeprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelés « inhibiteurs de la pompe à protons ». Il diminue la quantité d'acide produite par l'estomac.

indications thérapeutiques :

MEZOR est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

• MEZOR 20 mg:

- Réflux gastro-œsophagien :

- Traitement de l'œsophagite érosive par reflux ;

- Traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une œsophagite par reflux gastro-œsophagien ;

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

- En association à une antibiothérapie appropriée, éradication de Helicobacter pylori pour la récidive de l'ulcère duodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori et prévention de la récidive de l'ulcère gastroduodenal en cas d'infection par Helicobacter pylori.

• Patients chez lesquels un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) doit être poursuivi :

- Cicatrisation des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS ;

- Prévention des ulcères gastroduodenaux associés à la prise de la AINS, chez les patients à risque.

- Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents à partir de l'âge de 12 ans :

- Réflux gastro-œsophagien (RGO) ;

- Traitement de l'œsophagite érosive par reflux ;

- Traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une œsophagite par reflux gastro-œsophagien ;

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

- En association à des antibiotiques dans le traitement de l'ulcère duodénal dû à Helicobacter pylori.

• MEZOR 40 mg:

- Réflux gastro-œsophagien : Traitement de l'œsophagite érosive par reflux.

- Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

- Poursuite du traitement après prévention par voie intraveineuse de la récidive hémorragique d'un ulcère gastroduodenal.

2. QU'EST-CE QU'EST LA NOTICE D'INFORMATION À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MEZOR 20 mg ET 40 mg, GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous l'a indiquée, ou si une intolerance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais MEZOR 20 mg et 40 mg, gélules gastro-résistantes dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à l'esomeprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple : pantoprazole, lisoprazole, rabeprazole, oméprazole).

- Si vous prenez un médicament contenant du néfénflavir (utilisé dans le traitement de l'infection par le VIH).

Ne prenez jamais MEZO

ne vous avez des douleurs, pa

MEZOR.

Mises en garde spéciales

Adressez-vous à votre médecin si vous prenez une gélule gastro-résistante.

- Si vous avez des douleurs

- Si vous avez des prot

- Si vous avez été dia

carence en vitamine B1

- Si vous devez faire ur

- Si vous avez déjà re

- Si vous avez déjà re

- Si vous présentez une

au soleil, informez au f

votre traitement avec l

indésirable tel qu'une i

MEZOR peut masquer

dans une des deux po

prendre, parlez-en imm

- Vous perdez du poids sans raison et vous avez des problèmes pour avaler,

- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion,

- Vous vomissez de la nourriture ou du sang.

- Vous avez des selles noires teintées de sang.

En cas de prescription de MEZOR « à la demande », en fonction des besoins, vous devrez prendre une dose supplémentaire pendant ou se modifiant.

La période d'un inhibiteur de la pompe à protons tel que MEZOR, en particulier sur la hanche, du poignet et de la colonne vertébrale. Informez votre médecin si vous avez de l'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

Enfants

En l'absence de données, MEZOR n'est pas recommandé chez l'enfant de moins de 12 ans.

Interactions avec d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez avec récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Ceci s'applique également aux médicaments non soumis à prescription.

MEZOR peut interagir avec le fonctionnement d'autres médicaments et réciproquement. Ne prenez pas MEZOR si vous prenez un médicament contenant du néfénflavir (utilisé dans le traitement des infections par le VIH).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants : Azalazavir (utilisé dans le traitement des infections par le VIH), Clopidogrel (utilisé dans la prévention des caillots sanguins), Digoxine (utilisé pour déterminer la fonction cardiaque), Miléperidol (utilisé pour le traitement de la toux/cough), Millepertuis (Hypericum perforatum) (utilisé pour traiter la dépression), Kétoconazole, Itraconazole ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques), Etoriflunit (utilisé dans le traitement du cancer), Clonapam, Imipramine ou clomipramine (utilisées dans le traitement de la dépression), Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, du relâchement musculaire ou de l'épilepsie).

- Phénytoïne (utilisée dans le traitement de l'épilepsie) ; si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de ce médicament.

- Médicaments anticoagulants pour fluidifier le sang comme la warfarine : une surveillance par votre médecin peut être nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de ce médicament.

- Cilostazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente - douleur dans les jambes lorsque vous marchez qui est causée par un apport sanguin insuffisant), Cisapride (utilisé en cas d'indigestion ou de brûlures d'estomac), Méthotrexate (utilisé dans le traitement en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) ; vous prenez une fois de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par ce médicament.

- Tacrolimus (utilisé en cas de greffe d'organe).

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clarithromycine avec MEZOR pour le traitement d'une infection à Helicobacter pylori, vous pouvez prendre ces deux médicaments que vous prenez.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Vous pouvez prendre vos gélules avec de la nourriture ou à jeun.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité :

Si vous êtes enceinte, si vous prenez une彭ceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Votre médecin décidera si vous pouvez prendre MEZOR 20 mg et 40 mg, pendant cette période.

On ignore si MEZOR passe dans le lait maternel. En conséquence, vous ne devez pas utiliser MEZOR lorsque vous allaitez.

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

MEZOR n'est pas susceptible d'entrainer des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Toutefois, des effets indésirables tels que des étourdissements et une vision trouble peuvent survenir peu fréquemment ou rarement.

Si vous présentez ces effets indésirables, vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes intolérantes au fructose, un syndrome de malabsorption, un déficit en sucrase / iso-maltase (maladie héréditaire) ou malabsorption des sucres.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes intolérantes au fructose, un syndrome de malabsorption, un déficit en sucrase / iso-maltase (maladie héréditaire) ou malabsorption des sucres.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes intolérantes au fructose, un syndrome de malabsorption, un déficit en sucrase / iso-maltase (maladie héréditaire) ou malabsorption des sucres.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes intolérantes au fructose, un syndrome de malabsorption, un déficit en sucrase / iso-maltase (maladie héréditaire) ou malabsorption des sucres.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes intolérantes au fructose, un syndrome de malabsorption, un déficit en sucrase / iso-maltase (maladie héréditaire) ou malabsorption des sucres.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes intolérantes au fructose, un syndrome de malabsorption, un déficit en sucrase / iso-maltase (maladie héréditaire) ou malabsorption des sucres.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes intolérantes au fructose, un syndrome de malabsorption, un déficit en sucrase / iso-maltase (maladie héréditaire) ou malabsorption des sucres.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes intolérantes au fructose, un syndrome de malabsorption, un déficit en sucrase / iso-maltase (maladie héréditaire) ou malabsorption des sucres.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes intolérantes au fructose, un syndrome de malabsorption, un déficit en sucrase / iso-maltase (maladie héréditaire) ou malabsorption des sucres.

- Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation grave, il peut être nécessaire de prendre MEZOR 20 mg une fois par jour pendant une semaine. Votre médecin peut prescrire une dose maximale d'une gélule gastro-résistante de MEZOR 20 mg.

- Si vous souffrez d'une maladie grave du foie, votre médecin peut prescrire une dose plus faible.

Traitement et prévention des ulcères associés à l'acidité de l'estomac ou de l'œsophage : une gélule gastro-résistante de MEZOR 20 mg peut être nécessaire pendant une semaine.

Votre médecin vous demandera également de prendre de l'amoxicilline et de la clarithromycine.

Traitement des ulcères de l'estomac associés à d'autres maladies :

La dose recommandée est d'une gélule gastro-résistante de MEZOR 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

Prévention des ulcères de l'estomac associés à d'autres maladies non stéroïdiennes :

La dose recommandée est d'une gélule gastro-résistante de MEZOR 20 mg par jour.

Traitement de l'excès d'acide dans l'estomac ou pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison) :

La dose recommandée est d'une gélule gastro-résistante de MEZOR 20 mg par jour.

Votre médecin vous indiquera la dose et la durée de prise.

Adolescents âgés de 12 ans et plus :

Traitement des ulcères de l'estomac associés à l'acidité de l'estomac :

La dose recommandée est d'une gélule gastro-résistante de MEZOR 20 mg une fois par jour pendant une semaine.

Votre médecin vous demandera également de prendre de l'amoxicilline et de la clarithromycine.

MEZOR 40 mg :

Adolescents à partir de 16 ans :

Traitement des ulcères de l'estomac associés à l'acidité de l'estomac (NSAOI) :

Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'estomac ou de l'œsophage recommandée est d'une gélule gastro-résistante de MEZOR 20 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

Si votre médecin recommande une dose supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation n'est pas complète.

Si vous souffrez d'une maladie grave du foie, votre médecin peut prescrire une dose plus faible.

Traitement de l'excès d'acide dans l'estomac ou pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison) :

La dose recommandée est d'une gélule gastro-résistante de MEZOR 20 mg par jour.

Votre médecin vous indiquera la dose et la durée de prise.

Adolescents : La dose maximale est de 80 mg deux fois par jour.

Traitement prolongé après prévention de la récidive de l'œsophagite par voie intraveineuse :

La dose recommandée est d'une gélule gastro-résistante de MEZOR 20 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante :

MEZOR 20

MEZOR® 20 mg et 40 mg

Boîtes de 7, 14 et 28 Gélules gastro-résistantes

Esomeprazole (DCI) magnésium dihydroné

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, même si leur nom, même si les signes de leur maladie sont différents des vôtres.

- Si un des effets indésirables décrits ci-dessous vous remplacez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. QUEST-CE QUE MEZOR 20 mg ET 40 mg, GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Médicaments pour les troubles liés à l'acidité, inhibiteurs de la pompe à protons

- Code ATC : A02BC05.

MEZOR contient une substance appelée esomeprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelés « Inhibiteurs de la pompe à protons ». Il diminue la quantité d'acide produite par l'estomac.

indications thérapeutiques :

MEZOR est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

• MEZOR 20 mg:

- Réflux gastro-œsophagien :

- Traitement de l'œsophagite érosive par reflux ;

- Traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une œsophagite par reflux gastro-œsophagien ;

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

• En association à une antibiothérapie appropriée, éradication de Helicobacter pylori pour la récidive de l'ulcère duodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori et prévention de la récidive de l'ulcère gastroduodenal en cas d'infection par Helicobacter pylori.

• Patients chez lesquels un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) doit être poursuivi :

- Cicatrisation des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS ;

- Prévention des ulcères gastroduodenaux associés à la prise de la AINS, chez les patients à risque.

• Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents à partir de l'âge de 12 ans :

• Réflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Traitement de l'œsophagite érosive par reflux ;

- Traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une œsophagite par reflux gastro-œsophagien ;

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

• En association à des antibiotiques dans le traitement de l'ulcère duodénal dû à Helicobacter pylori.

• MEZOR 40 mg :

- Réflux gastro-œsophagien : Traitement de l'œsophagite érosive par reflux.

- Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

• Poursuite du traitement après prévention par voie intraveineuse de la récidive hémorragique d'un ulcère gastroduodenal.

2. QU'EST CE QU'ON SAIT DES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MEZOR 20 mg ET 40 mg, GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous l'a indiquée (ou d'une intolerance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais MEZOR 20 mg et 40 mg, gélules gastro-résistantes dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à l'esomeprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple : pantoprazole, lisoprazole, rabeprazole, oméprazole).

- Si vous prenez un médicament contenant du néfénatrav (utilisé dans le traitement de l'infection par le VIH).

Ne prenez jamais MEZO

ne vous avez des douleurs, pa

MEZOR.

Mises en garde spéciales

Adresssez-vous à votre m

me, gélule gastro-ré

- Si vous avez des pro

- Si vous avez des pro

- Si vous avez été dia

carence en vitamine B1

- Si vous devez faire ur

- Si vous avez déjà re

- Si vous avez déjà re

- Si vous présentez une

au soleil, informez au f

votre traitement avec l

indésirable tel qu'une t

MEZOR peut masquer

dans une des étapes de

prendre, parlez-en imm

à votre médecin.

- Vous perdez du poids sans raison et vous avez des problèmes pour avaler,

- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion,

- Vous vomissez de la nourriture ou du sang.

- Vous avez des selles noires teintées de sang.

En cas de prescription de MEZOR « à la demande », en fonction des besoins, vous devrez prendre une dose supplémentaire pendant ou se modifiant.

La période d'un inhibiteur de la pompe à protons tel que MEZOR, en particulier sur la hanche, du poignet et de la colonne vertébrale. Informez votre médecin si vous avez de l'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

Enfants

En l'absence de données, MEZOR n'est pas recommandé chez l'enfant de moins de 12

Interactions avec d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez avec récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Ceci s'applique également aux médicaments non soumis à prescription.

MEZOR peut interagir avec le fonctionnement d'autres médicaments et réciproquement. Ne prenez pas MEZOR si vous prenez un médicament contenant du néfénatrav (utilisé dans le traitement des infections par le VIH).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Alazanavir (utilisé dans le traitement des infections par le VIH),

- Clopidogrel (utilisé dans la prévention des caillots sanguins),

- Digoxine (utilisé pour des problèmes cardiaques),

- Dipropoxifène (utilisé pour le traitement de la toux/cough),

- Millepertuis (Hypericum perforatum) (utilisé pour traiter la dépression),

- Kétoconazole, itraconazole ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques),

- Etoréfolt (utilisé dans le traitement du cancer),

- Clorpromazine, imipramine ou clomipramine (utilisées dans le traitement de la dépression),

- Disulfiram (utilisé dans le traitement de l'alcoolisme, du relâchement musculaire ou de l'épilepsie).

- Phénytoïne (utilisée dans le traitement de l'épilepsie) ; si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de ce médicament.

- Médicaments anticoagulants pour fluidifier le sang comme la warfarine : une surveillance par votre médecin peut être nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de ce médicament.

- Cilostazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente - douleur dans les jambes lorsque vous marchez qui est causée par un apport sanguin insuffisant),

- Cisapride (utilisé en cas d'indigestion ou de brûlures d'estomac),

- Méthotrexate (utilisé dans la chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) ; vous prenez une fois de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par ce médicament.

- Tacrolimus (utilisé en cas de greffe d'organe).

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clarithromycine avec MEZOR pour le traitement d'une infection à Helicobacter pylori, vous pouvez prendre tous les autres médicaments que vous prenez.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Vous pouvez prendre vos gélules de la manière que vous souhaitez.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité :

Si vous êtes enceinte, si vous prenez une彭ceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin décidera si vous pouvez prendre MEZOR 20 mg et 40 mg, pendant cette période.

On ignore si MEZOR passe dans le lait maternel. En conséquence, vous ne devez pas utiliser MEZOR lorsque vous allaitez.

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

MEZOR n'est pas susceptible d'entrainer des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Toutefois, des effets indésirables tels que des étourdissements et une vision trouble peuvent survenir peu fréquemment ou rarement. Si vous présentez ces effets indésirables, vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes intolérantes au fructose, un syndrome de malabsorption qui peut entraîner des crampes, des diarrées et des douleurs abdominales. Un déficit en sucrase / iso-maltase (malabsorption du sucre) peut également entraîner des diarrées et des douleurs abdominales.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes intolérantes au fructose, un syndrome de malabsorption qui peut entraîner des crampes, des diarrées et des douleurs abdominales. Un déficit en sucrase / iso-maltase (malabsorption du sucre) peut également entraîner des diarrées et des douleurs abdominales.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes intolérantes au fructose, un syndrome de malabsorption qui peut entraîner des crampes, des diarrées et des douleurs abdominales. Un déficit en sucrase / iso-maltase (malabsorption du sucre) peut également entraîner des diarrées et des douleurs abdominales.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes intolérantes au fructose, un syndrome de malabsorption qui peut entraîner des crampes, des diarrées et des douleurs abdominales. Un déficit en sucrase / iso-maltase (malabsorption du sucre) peut également entraîner des diarrées et des douleurs abdominales.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-résistante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes intolérantes au fructose, un syndrome de malabsorption qui peut entraîner des crampes, des diarrées et des douleurs abdominales. Un déficit en sucrase / iso-maltase (malabsorption du sucre) peut également entraîner des diarrées et des douleurs abdominales.

- Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation grave, il peut être nécessaire de prendre MEZOR 20 mg une fois par jour pendant une semaine. Votre médecin peut prescrire une dose maximale d'une gélule gastro-résistante de MEZOR 20 mg une fois par jour pendant une semaine.

- Si vous souffrez d'une maladie grave du foie, votre médecin peut prescrire une dose plus faible.

Traitement et prévention des ulcères associés à l'acidité de l'estomac ou de l'œsophage : La dose recommandée est d'une gélule gastro-résistante de MEZOR 20 mg une fois par jour pendant une semaine.

Traitement des ulcères de l'estomac associés à d'autres maladies : La dose recommandée est d'une gélule gastro-résistante de MEZOR 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Prévention des ulcères de l'estomac associés à d'autres maladies (non stéroïdiens) : La dose recommandée est d'une gélule gastro-résistante de MEZOR 20 mg une fois par jour.

Traitement de l'excès d'acide dans l'estomac ou du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison) : La dose recommandée est d'une gélule gastro-résistante de MEZOR 20 mg une fois par jour.

Votre médecin vous indiquera la dose et la durée de traitement. La dose maximale est de 80 mg deux fois par jour.

Adolescents âgés de 12 ans et plus : Traitement des brûlures d'estomac associées à l'acidité : Si votre médecin diagnostique une inflammation grave, il peut être nécessaire de prendre MEZOR 40 mg une fois par jour pendant une semaine.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Si votre médecin recommande une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une dose quotidienne de MEZOR 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-



recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines, votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-

recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4

Médrol®

Comprimé sécable



1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION - MEDROL® 4mg - MEDROL® 16 mg

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

MEDROL® 4 mg

Méthylprednisolone 4 mg

Excipient : lactose, amidon de maïs, saccharose, stéarate de calcium.

MEDROL® 16 mg

Méthylprednisolone 16 mg

Excipient : lactose, saccharose, paraffine liquide, stéarate de calcium, amidon de maïs

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable

MEDROL® 4 mg (boîte de 30).

MEDROL® 16 mg (boîte de 20).

CLASSE PHARMACO - THERAPEUTIQUE

GLUCOCORTICOIDE- USAGE SYSTEMIQUE (H : Hormones non sexuelles)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires Pfizer S.A.

280, Bd Yacoub El Mansour

20200 Casablanca Maroc.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

(INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Ce médicament est un corticoïde.

Il est indiqué dans certaines maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

3. DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

(CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- la plupart des infections non contrôlées par un traitement spécifique
- certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, zona),
- certains troubles mentaux non traités,
- vaccination par des vaccins vivants,
- allergie à l'un des constitutifs.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISÉ, sauf avis contraire de votre médecin, en association avec des médicaments pouvant donner certains troubles du rythme cardiaque (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE SPECIALES : Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

• Avant le traitement :

Prévenir votre médecin en cas de vaccination récente, en cas d'ulcère digestif, de maladies du colon, d'intervention chirurgicale récente au niveau de l'intestin, de diabète, d'hypertension artérielle, d'infection (notamment antécédents de tuberculose), d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale, d'ostéoporose et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire).

Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les régions tropicales, subtropicales ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.

• Pendant le traitement :

éviter le contact avec les sujets atteints de varicelle ou de rougeole.

En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter brutalement le traitement mais suivez les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses. Sous traitement et au cours de l'année suivant l'arrêt du traitement, prévenir le médecin, en cas d'intervention chirurgicale ou de situation de

PRECAUTIONS D'EN

Pendant le traitement.

EN CAS DE DOUTE A

INTERACTIONS MED.

AFIN D'EVITER D'EVE

EN COURS A VOTRE

et notamment des méd. pentamidine, sparflaxac.

GROSSESSE - ALLAIT

• Grossesse

Ce médicament ne sera t.

Si vous découvrez que v.

• Allaitement

L'allaitement est à éviter pendant le traitement en raison de son passage dans le lait maternel.

Le seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

UT.AV. 0 0 23

P.P.V

LOT N°

FH6484 35190

09366140/3

ARMACIEN

LER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT

ill, érythromycine en injection intraveineuse, halofantrine,

Le seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

Le seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

الدكتور هشام ساطع

اختصاصي أمراض المفاصل
والروماتيزم والمعظم والعمود الفقري

- أستاذ مساعد بالمستشفيات
الفرنسية سابقاً

- عضو المعهد الأمريكي لأمراض الروماتيزم
والجمعية الفرنسية لأمراض الروماتيزم

- دبلوم جامعي في علاج الألم
شهادة الترويض الطبي

- دبلوم في روماتيزم الأطفال

بالموعد - التوقيت المستمر

PPV: 39DH80
PER: 05/25
LOT: L1663

Laroxyl® 40 mg/ml
Amitriptyline
Gouttes buvables 20 ml



- Ancien enseignant et conseiller des Hôpitaux de France
- Diplôme Universitaire de la douleur
- Membre International du Collège Americain de rhumatologie et de la Société Française de Rhumatologie
- Diplôme en Rhumatologie Pédiatrique

Sur Rendez-vous - Horaire Continue

Casablanca, le :

Dr Hicham Sati
RHUMATOLOGUE
الدار البيضاء - فارهاتين 5
Bd Bouziane, Résidence Farhatine 5
Appt. 5 Sidi Othmane - Casablanca
Tel.: 05 22 37 14 14

Hicham
Hicham

4670 3gloc 100g ff

3980lens + 10 ff Rue

8610

Pharmacie BENMOUSSA
26, Av. Cdt. Driss El Harti
Jamila 3 - Cité Djemaa
Tél. : 05 22 37 38 87 - CASABLANCA

05 22 37 38 87 A

شارع بوزيان، إقامة فرحتين 5 ، الشقة 5 ، الطابق الثاني (قرب أسيما) - الدار البيضاء : الهاتف - الفاكس : 05 22 37 14 14
d. Bouziane, Résidence Farhatine 5 , Appt. 5, 2ème Etage, (A côté d'Acima) - Casablanca - Tél./Fax: 05 22 37 14 14

Dr. Hicham SATI

Spécialiste en Rhumatologie

Maladies Rhumatismales

Articulations - OS. et Colonne vertébrale

- Ancien Professeur Assistant des Hôpitaux de France
- Diplôme Universitaire de la douleur
- Membre International du Collège Americain de rhumatologie et de la Société Française de Rhumatologie
- Diplôme en Rhumatologie Pédiatrique



الدكتور هشام ساطع

اختصاصي أمراض المفاصل

والروماتيزم والعظام والعمود الفقري

- أستاذ مساعد بالمستشفيات

الفرنسية سابقا

- عضو المعهد الأمريكي لأمراض الروماتيزم

والجمعية الفرنسية لأمراض الروماتيزم

- دبلوم جامعي في علاج الألم

- شهادة الترويض الطبي

- دبلوم في روماتيزم الأطفال

بالموعد - التوقيت المستمر

Sur Rendez-vous - Horaire Continue

Casablanca, le :

31/08/22
الدار البيضاء (في)

J. A. Sati M.D.

A cide mpr

ce J. m

Mee

H. Mee

LABORATOIRE AFRIQUIA
D'ANALYSE MEDICALES
Dr BELHAQ Jamal
97 Bd Driss El Hanafi Casablanca
Tél.: 05 22 56 73 44
INP (PP): 097158232
INP (Labo): 093001097

Tel : 05 22 37 24 14
Appt. 5, 5ème étage, Bd. Bouziane, résidence Farhatine 5, Casablanca
RHUMATOLOGUE
Dr HICHAM SATI
Document SATI Hicham

**LABORATOIRE AFRIQUIA D'ANALYSES
BIOLOGIQUES ET MEDICALES**

Dr. BELHAQ Jamal

Docteur en pharmacie biologiste

Diplômé de l'Université de Montpellier (France)



INP (P.P.) : **097158232**



INP (Laboratoire) : **093001097**

مختبر إفريقيا للتحاليل الطبية

الدكتور باحث جمال

صيدلي أخصائي في البيولوجيا الطبية

خريج جامعة مونبليي (فرنسا)

Facture n° 2IAI5211

Casablanca le : 01/09/2022

Analyses effectuées le: 01/09/2022

Pour.....: **Mr. JADOUAL MOHAMED**

Sur prescription du: Dr SATI HICHAM

Code.....: 1BJ2719



Organisme.....:

Bilan:

AU UREE CREAT HBA1C GLY

Cotation : (B 200)

Montant Net : 220.00 Dh

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

DEUX CENT VINGT Dhs 00 Cts

LABORATOIRE AFRIQUIA
D'ANALYSE MEDICALES
Dr BELHAQ Jamal
97 Bd Driss El Harti Casablanca
Tél.: 05 22 56 73 44
INP (P.P): 097158232
INP (Labo): 093001097



093001097

**LABORATOIRE AFRIQUIA D'ANALYSES
BIOLOGIQUES ET MEDICALES**

Dr. BELHAQ Jamal

Docteur en pharmacie biologiste

Diplômé de l'Université de Montpellier (France)



مختبر إفريقيا للتحاليل الطبية

الدكتور بلحق جمال

صيدلي أخصائي في البيولوجيا الطبية

خريج جامعة مونبليي (فرنسا)



INP (P.P.) : 097158232



INP (Laboratoire) : 093001097

Prélèvement du : 01/09/2022

Edition du : 01/09/2022

Référence : 20901195



Mr. JADOUAL MOHAMED

Code Patient 1BJ2719

Médecin: Dr. SATI HICHAM

EXAMENS DE SANG
BIOCHIMIE

Analyses	Résultats	Normes	Antécédents
Glycémie à jeun..... Soit	: 1,27 7.05	g/l mmol/l	(0.70 - 1.10) (3.8 - 6.1)
Hémoglobine Glycosylée..... (Methode rapide par la résine échangeuse d'ions)	: 6,52	%	4,30 - 6,50
{Métabolisme équilibré < 6,50) {Métabolisme non équilibré > 7,00			6,60 (15/
Urée..... Soit	: 0,42 6.97	g/l mmol/l	0,40 (28/ 6.64 (28/
Créatinine..... Soit.....	: 17,76 156.3	mg/l μmol/l	16,80 (28 147.8 (28
Acide Urique..... Soit.....	: 71,51 429.	mg/l μmol/l	63,95 (28 (150 - 416)

LABORATOIRE AFRIQUIA
D'ANALYSE MEDICALES
Dr BELHAQ Jamal
97 Bd Driss El Harti Casablanca
Tél.: 05 22 56 73 44
INP (P.P.): 097158232
INP (Lotto): 093001097



093001097