

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0010652

☐ Maladie

☐ Dentaire

☒ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5396 Société : R.A.M.
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre : 128675
 Nom & Prénom : ZAKARIA IMANE
 Date de naissance : 02/04/1961
 Adresse : 159, MANDARONA, SIDI-MAAROUF, CASA.
 Tél. : 0661627057 Total des frais engagés :Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. AZHARI Mustapha
OPHTALMOLOGUE
131, Boulevard Abdelmoumen
4ème Etage N° 15 CASA
Tél. 0522 27 60 61

Date de consultation : / /
 Nom et prénom du malade : ZAKARIA IMANE Age : 61 ANS
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Glaucome

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : / /
 Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02 AOUT 2022	9		300	

60-154-10000

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien	Date	Mention de l'ordonnance

nom du Fournisseur	Date	Montant de la Facture

de 02/08/2022 9000 m

[illegible]

007548
- TV
015150840 : 10

Cachet et signature du Leban Sira et du Radier	Date	Désignation des Coefficients	Montant des honoraires
---	------	---------------------------------	---------------------------

Laboratoire et du Radiologue Dr. S. M.	02/02/22	Coefficients	des Honoraires
---	----------	--------------	----------------

48, Sana	30/05/20	30/05/20
----------	----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

12/04/22	380,80
----------	--------

Cachet et Signature du Prestataire	Date des Frais	Nombre				Montant détaillé des honoraires
		AM	PC	IM	MM	

du Praticien	Soins	AM	PC	IM	IV	des Honoraires

[illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents	Nature des	Coefficient	
-----------------	-------	------------	-------------	--

SOINS DENTAIRES	Traitées	Soins	Coefficient

Page 10



O.D.F	DETERMINATION DU COEFFICIENT	
-------	------------------------------	--

PROTHESES DENTAIRES	MASTICATOIRE	COEFFICIENT
	H	

(Création, remont, adjonction)



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-15.

Dr. Mustapha AZHARI

*Spécialiste des Maladies
et de la Chirurgie des Yeux
Ancien Interne des hôpitaux
de Toulouse (France)*

*Laser Excimer - Strabisme
Contactologie*



الدكتور مصطفى أزهرى

**اختصاصي في أمراض
وجراحة العيون
طبيب سابقا بمستشفيات
تولوز - فرنسا**

**جراحة بالليزر - علاج الحول
العدسات اللاصقة**

02 août 2022

Casablanca, le

Mme ZAKARIA IMANE

103,00 x 3

TIMOCOMOD 0.5 % COLLYRE

1 goutte à 8 h du matin dans 2 yeux 06 mois

TOBRADEX COLLYRE

387,70

1 goutte x 3 par jour pendant 05 jours

1 goutte x 2 par jour pendant 05 jours, dans les deux yeux

THEALOSE COLLYRE

147,00 x 3

1 GOUTTE X 3 à 5 FOIS PAR JOUR, dans les deux yeux, pendant 4 Mois

GANFORT COLLYRE

227,00 x 8

1 GOUTTE LE SOIR, dans les deux yeux, pendant 6 Mois

PHYLARM UNIDOSES

099,00

lavage oculaire fréquent, dans les deux yeux, pendant 10 jours

TANAKAN CP

71,30 x 4

1 CP X 2/J, pendant 3 Mois

OEDS GELLULES

140,80 x 2

1 gélule 1/2 heure avant le petit-dejeuner, pendant 4 Mois

FUCIDINE CREME DERMIQUE

39,70

1 APPLICATION CUTANEE (PEAU) 2 FOIS PAR JOUR MATIN
ET SOIR, pendant 10 jours

Pharmacie AL ABE
Dr. Sana EL KRAIBI
48 Lot 13 Casablanca
Sidi Maarouf
Tel: 05 22 97 40 65

T = 3448,20

إقامة جوهرة عبدالمومن - الطابق 4 - الرقم 15 - الدار البيضاء

131, Bd. Abdelmoumen (Angle Rue Galien) Résidence Jawharat Abdelmoumen - Casablanca

Tél. / Fax: 05 22 27 60 61 - Tél. : 05 22 47 30 38 / E-mail : azamus2000@yahoo.fr

07/20

40000288-01

30 قرصا مغلفا

مستخلص جينكو بيلوبا

تانكان 40مغ

42x25x88

30 COMPRIMÉS ENROBÉS

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

tanakan® 40mg



A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.

Composition : Ginkgo (Ginkgo biloba L.) (extrait quantifié de tige à 24 % d'hercénosides de ginkgo et 6 % de Ginkgolides-bilobaïde 40,00 mg Pour un comprimé enrobé.

Liste des excipients à effet notoire :
lactose monohydraté.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

طريقة وكيفية الاستعمال: عن طريق الفم.

لامعة السواغات ذات تأثير معروف. لاكتيزا أجنبي السامية.

40,00 ملغ لكل قرص مغلف.

24% من الهيدروسيديت جينكو و6% من جينكوليد بيلوباليد.

جينكات جينكو (جينكو بيلوبا L) (مستخلص قماش) نسبتة

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.

يحفظ بعيدا عن مرئي ومتناول الأطفال.

يجب ألا علاج بانتباه على النشرة قبل تناول هذا الدواء

IPSEN

IPSEN Pharma

maphar

Km 10, route côtière 111
quartier industriel, Zénata, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg



Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

يوصف هذا الدواء على أنه علاجي أعراض بعض الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين (خاصة الاضطرابات الإدراكية الثانوية باستثناء أي نوع من الخلل الأيضي، الاضطرابات الثانوية ناتجة عن الأدوية، الاكتئاب، الاضطرابات الخلقية).

30, 74

2000 12 4



40000288-01
07/20

30 قرصا مغلفا
تاناكان 40مغ

42x25x88

30 COMPRIMÉS ENROBÉS

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

tanakan® 40mg



A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.

04

طريقة وكيفية الاستعمال: عن طريق الفم.
لامعة السواغات ذات تأثير معروف. لاكتيزا أحادي السامية.
40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
24% من الهيدروسيديك جينكو و6% من جينكويدي بيلوبا.
المكونات: جينكو (جينكو بيلوبا) (استخلص مقل) نسبتة

يحفظ بعيدا عن مرئي ومتناول الأطفال.
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
يجب ألا يؤخذ إلا بعد استشارة الطبيب.
تناول هذا الدواء



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN Pharma
maphar
Km 10, route côtière 111
Casablanca - Maroc
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaâ

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

يوصف هذا الدواء على أنه علاجي أعراض بعض الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين (خاصة الاضطرابات الإدراكية الثانوية باستثناء أي نوع من الخلل الوظيفي، الاضطرابات الثانوية ناتجة عن الأدوية، الاكتئاب، الاضطرابات الجسدية).

30, 74

2000 12 4



40000288-01
07/20

30 قرصا مغلفا
تاناكان 40مغ

42x25x88

30 COMPRIMÉS ENROBÉS

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

tanakan® 40mg



A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.

04

طريقة وكيفية الاستعمال: عن طريق الفم.
لامعة السواغات ذات تأثير معروف. لاكتيزا أحادي السامية.
40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
24% من الهيدروسيديت جينكو و6% من جينكوبيلوباليد.
المكونات: جينكو (جينكو بيلوبا) (استخلص مقاس) نسبتة

يحفظ بعيدا عن مرئي ومتناول الأطفال.
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
يرجى الإطلاع بانتباه على النشرة قبل تناول هذا الدواء



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN Pharma
maphar
Km 10, route côtière 111
Casablanca - Maroc
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaâ

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

يوصف هذا الدواء على أنه علاجي أعراض بعض الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين (خاصة الاضطرابات الذاكرة)، باستثناء أي نوع من الالتهاب، الاضطرابات الثانوية ناتجة عن الأدوية، الاكتئاب، الاضطرابات أيضية.

30, 74

2000 12 4

40000288-01
07/20

30 قرصا مغلفا
تاناكان 40مغ

42x25x88

30 COMPRIMÉS ENROBÉS

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

tanakan® 40mg



A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.

04

طريقة وكيفية الاستعمال: عن طريق الفم.
لامعة السواغات ذات تأثير معروف. لاكتيزا أحادي السامية.
40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
24% من الهيدروسيديت جينكو و6% من جينكوبيلوباليد.
المكونات: جينكو (جينكو بيلوبا) (استخلص مقاس) نسبتة

يحفظ بعيدا عن مرئي ومتناول الأطفال.
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
يرجى الإطلاع بانتباه على النشرة قبل تناول هذا الدواء



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN Pharma
maphar
Km 10, route côtière 111
Casablanca - Maroc
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaâ

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

يوصف هذا الدواء على أنه علاجي أعراض بعض الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين (خاصة الاضطرابات الذاكرة)، باستثناء أي نوع من الالتهاب، الاضطرابات الثانوية ناتجة عن الأدوية، الاكتئاب، الاضطرابات أيضية.

30, 74

2000 12 4

40000288-01
07/20

30 قرصا مغلفا
تاناكان 40مغ

42x25x88

30 COMPRIMÉS ENROBÉS

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

tanakan® 40mg



A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.

04

طريقة وكيفية الاستعمال: عن طريق الفم.
لامعة السواغات ذات تأثير معروف. لاكتيزا أجنبي السامية.
40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
24% من الهيدروسيديت جينكو و6% من جينكويد بيلوبايد.
المكونات: جينكو (جينكو بيلوبا) (استخلص مقل)، سبتة

يحفظ بعيدا عن مرئي ومتناول الأطفال.
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
يرجى الإطلاع بانتباه على النشرة قبل تناول هذا الدواء



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN Pharma
maphar
Km 10, route côtière 111
Casablanca - Maroc
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaâ

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

يوصف هذا الدواء على أنه علاجي أعراض بعض الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين (خاصة الاضطرابات الإدراكية الثانوية باستثناء أي نوع من الالتهاب العصبي، الاضطرابات الثانوية ناتجة عن الأدوية، الاكتئاب، الاضطرابات أيضية).

30, 74

2000 12 4



40000288-01
07/20

30 قرصا مغلفا
تاناكان 40مغ

42x25x88

30 COMPRIMÉS ENROBÉS

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

tanakan® 40mg



A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.

04

طريقة وكيفية الاستعمال: عن طريق الفم.
لامعة السواغات ذات تأثير معروف. لاكتيزا أحادي السامية.
40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
24% من الهيدروسيديت جينكو و6% من جينكوبيلوباليد.
المكونات: جينكو (جينكو بيلوبا) (استخلص مقاس) نسبتة

يحفظ بعيدا عن مرئي ومتناول الأطفال.
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
يرجى الإطلاع بانتباه على النشرة قبل تناول هذا الدواء



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN Pharma
maphar
Km 10, route côtière 111
Casablanca - Maroc
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaâ

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

يوصف هذا الدواء على أنه علاجي أعراض بعض الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين (خاصة الاضطرابات الذاكرة)، باستثناء أي نوع من الالتهاب، الاضطرابات الثانوية ناتجة عن الأدوية، الاكتئاب، الاضطرابات أيضية.

30, 74

2000 12 4

COMPOSITION :

Oméprazole.....20mg

Excipients.....qsp 1 gélule

Excipients à effet notoire : Saccharose

AMM n° 322DMP/21/NNP



COOPER
PHARMA

Fabriqué par COOPER PHARMA
41, Rue Med Diouri. 20 110 Casablanca
Amina DAOUDI : Pharmacien responsable

LOT: 181764
PER: 08-21
PPV: 140,00DH

COOPER
PHARMA



56 gélules

OEDES 20mg

جنتيات صالحة للعصارة المعقدة في برشامات

56 x 5



PPV (DH) :

LOT N° :

UT.AV.:

COMPOSITION :

Oméprazole.....20mg

Excipients.....qsp 1 gélule

Excipients à effet notoire : Saccharose

AMM n° 322DMP/21/NNP



COOPER
PHARMA

Fabriqué par COOPER PHARMA
41, Rue Med Diouri. 20 110 Casablanca
Amina DAOUDI : Pharmacien responsable

LOT: 181764
PER: 08-21
PPV: 140,00DH

COOPER
PHARMA



56 gélules

OEDES 20mg

جنتيات صالحة للعصارة المعقدة في برشامات

56 x 5



PPV (DH) :

LOT N° :

UT.AV.:

**À chaque fois
que l'œil est irrité**

16 unités stériles de 10 ml



HER MEDIC
PPC
99.00 DHS

PhyLarm

Solution stérile pour usage oculaire

Solution stérile pour usage oculaire

PhyLarm



16 unidades stériles de 10 ml

**À chaque fois
que l'œil est irrité**

BD 14882

54

**Timo-
COMOD®**
0,5 %

URSAPHARM

Arzneimittel GmbH
Industriestraße
66129 Saarbrücken
Allemagne

**Timo-
COMOD®**
0,5 %

**Timo-
COMOD®**
0,5 %

**Timo-
COMOD®**
0,5 %

**تيمو-
كومود (م)
% 0,5**

Maléate de timolol

Lire attentivement la notice!
Ne pas laisser à la portée des enfants!
اقرأ النشرة بتمعن!
لا تترك الأدوية في متناول الأطفال!
A conserver à une température ne
dépassant pas 25 °C et à l'abri de la
lumière. A utiliser dans les 12 semaines
après l'ouverture du flacon.
Ne pas injecter, ne pas avaler.

Laboratoires STERIPHARMA
Z. I Lina n° 347 Sidi Maârouf
Casablanca - MAROC
Amine Tahiri.
Pharmacien Responsable

sans conservateur

10 ml de collyre
A instiller dans
le cul-de-sac
conjunctival

Maléate de timolol

Composition: 1 ml de solution contient:
Maléate de timolol 6,84 mg (soit 5,0 mg de
timolol); phosphate monosodique dihydrate;
phosphate disodique dodécahydrate; eau
pour préparations injectables.

التركيبية: يحتوي كل مل:
تيمولول ماليتات 6,84 ملغ (كمية مطابقة لتيمولول
5,0 ملغ)؛ فوسفات أحادي الصوديوم ثنائي الهيدرات؛
فوسفات ثنائي الصوديوم دودكاهيدروجين؛ مياه الحقن.

Timo-COMOD® 0,5 %

collyre 10 ml



بلون مواد حافظة

10 ملل
من قطرات العين
للغرس في كيس
الملتحمه

uniquement sur ordonnance - Liste I

Respecter les doses prescrites

URSAPHARM

URSAPHARM

إر صافارم

Steripharma
PPV:103,00 dh

A utiliser avant: / Lot n°

0 5 / 2 0 2 4

3 0 1 5 5 9

31.1015
CCB

BD 14882

54

**Timo-
COMOD®**
0,5 %

URSAPHARM

Arzneimittel GmbH
Industriestraße
66129 Saarbrücken
Allemagne

**Timo-
COMOD®**
0,5 %

**Timo-
COMOD®**
0,5 %

**Timo-
COMOD®**
0,5 %

**تيمو-
كومود (م)
% 0,5**

Maléate de timolol

Lire attentivement la notice!
Ne pas laisser à la portée des enfants!
اقرأ النشرة بتمعن!
لا تترك الأدوية في متناول الأطفال!
A conserver à une température ne
dépassant pas 25 °C et à l'abri de la
lumière. A utiliser dans les 12 semaines
après l'ouverture du flacon.
Ne pas injecter, ne pas avaler.

Laboratoires STERIPHARMA
Z. I Lina n° 347 Sidi Maârouf
Casablanca - MAROC
Amine Tahiri.
Pharmacien Responsable

sans conservateur

10 ml de collyre
A instiller dans
le cul-de-sac
conjunctival

Maléate de timolol

Composition: 1 ml de solution contient:
Maléate de timolol 6,84 mg (soit 5,0 mg de
timolol); phosphate monosodique dihydrate;
phosphate disodique dodécahydrate; eau
pour préparations injectables.

التركيبية: يحتوي كل مل:
تيمولول ماليتات 6,84 ملغ (كمية مطابقة لتيمولول
5,0 ملغ)؛ فوسفات أحادي الصوديوم ثنائي الهيدرات؛
فوسفات ثنائي الصوديوم دودكاهيدروجين؛ مياه الحقن.

Timo-COMOD® 0,5 %

collyre 10 ml



بلون مواد حافظة

10 ملل
من قطرات العين
للغرس في كيس
الملتحمه

uniquement sur ordonnance - Liste I

Respecter les doses prescrites

URSAPHARM

URSAPHARM

إر صافارم

Steripharma
PPV:103,00 dh

A utiliser avant: / Lot n°

0 5 / 2 0 2 4

3 0 1 5 5 9

31.1015
CCB

BD 14882

54

**Timo-
COMOD®**
0,5 %

URSAPHARM

Arzneimittel GmbH
Industriestraße
66129 Saarbrücken
Allemagne

**Timo-
COMOD®**
0,5 %

**Timo-
COMOD®**
0,5 %

**Timo-
COMOD®**
0,5 %

**تيمو-
كومود (م)
% 0,5**

Maléate de timolol

Lire attentivement la notice!
Ne pas laisser à la portée des enfants!
اقرأ النشرة بتمعن!
لا تترك الأدوية في متناول الأطفال!
A conserver à une température ne
dépassant pas 25 °C et à l'abri de la
lumière. A utiliser dans les 12 semaines
après l'ouverture du flacon.
Ne pas injecter, ne pas avaler.

Laboratoires STERIPHARMA
Z. I Lina n° 347 Sidi Maârouf
Casablanca - MAROC
Amine Tahiri.
Pharmacien Responsable

sans conservateur

10 ml de collyre
A instiller dans
le cul-de-sac
conjunctival

Maléate de timolol

Composition: 1 ml de solution contient:
Maléate de timolol 6,84 mg (soit 5,0 mg de
timolol); phosphate monosodique dihydrate;
phosphate disodique dodécahydrate; eau
pour préparations injectables.

التركيبية: يحتوي كل مل:
تيمولول ماليتات 6,84 ملغ (كمية مطابقة لتيمولول
5,0 ملغ)؛ فوسفات أحادي الصوديوم ثنائي الهيدرات؛
فوسفات ثنائي الصوديوم دودكاهيدروجين؛ مياه الحقن.

Timo-COMOD® 0,5 %

collyre 10 ml



بلون مواد حافظة

10 ملل
من قطرات العين
للغرس في كيس
الملتحمه

uniquement sur ordonnance - Liste I

Respecter les doses prescrites

URSAPHARM

URSAPHARM

إر صافارم

Steripharma
PPV: 103,00 dh

A utiliser avant: / Lot n°

0 5 / 2 0 2 4

3 0 1 5 5 9

31.1015
CCB



Théalose®

Tréhalose 3 %
Hyaluronate de sodium
- 0,15 %
Solution Ophthalmique
Protège, hydrate
et lubrifie la surface
oculaire

10 ml

Sans conservateur

٢٠

تريالوز 3 %
هيا لورونات الصوديوم
0,15 %
محلول العين
بحمي ، يميته ويزلق سطح
العين

10 مل

بدون مادة حافظة

STERILE A



تاریخ اول فتح

25°C

Tréhalose.....	3 g/100 ml
Hyaluronate de sodium.....	

Solution optalmique.

solution pour la protection, l'hydratation et la lubrification de la surface oculaire indiquée dans le traitement du syndrome de l'œil sec modéré à sévère.

Ne pas conserver au-delà de 3 mois après ouverture.

VOIE LOCALE.

INSTILLATION OCULAIRE

TENIR HORS DE LA VUE

ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.

تريالوز 300/غ/100 مل

.....

محتول العين -
محلول لحماية، تعبئته و ترليق سطح العين
موصى به في علاج متلازمة جفاف العين

بعد الفتح لا يحفظ أكثر من ثلاث (3)

الشهر : استعمال موضعي.

يحفظ بعيداً عن أنظار ومتناول الأطفال.



Distribué au Maroc par :
Laboratoires SOTHEMA
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc
N° Homologation Maroc :
1573/2016/DMP/20/DM
PPC : 147,00 DH

JR2762C10MAR/0919



Théa C 0459

21

Laboratoires Thsa
12, rue Louis Blériot
63017 - Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
Farmila Thsa Farmaceutico S.p.A.
Via Enrico Fermi, 50
20019 Settimo, Milanese MI, Italie

تيسا
لورنس تيسو
6300 كليرون فيراند - فرنسا
فارملا - تيسا فارمaceutico س.پ.ا.
الانكرو فيرمي، 50
20019 ستيتمو ميلانيزي - إيطاليا.

Fust. 1449

8



Théalose®

Tréhalose 3 %
Hyaluronate de sodium
- 0,15 %
Solution Ophthalmique
Protège, hydrate
et lubrifie la surface
oculaire

10 ml

Sans conservateur

٢٠

تريالوز 3 %
هيا لورونات الصوديوم
0,15 %
محلول العين
بحمي ، يميته ويزلق سطح
العين

10 مل

بدون مادة حافظة

STERILE A



تاریخ اول فتح

25°C

Tréhalose.....	3 g/100 ml
Hyaluronate de sodium.....	

Solution optalmique.

solution pour la protection, l'hydratation et la lubrification de la surface oculaire indiquée dans le traitement du syndrome de l'œil sec modéré à sévère.

Ne pas conserver au-delà de 3 mois après ouverture.

VOIE LOCALE.

INSTILLATION OCULAIRE

TENIR HORS DE LA VUE

ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.

تريالوز 300/غ/100 مل

[illegible]

محتول العين -
محلول لحماية، تعبئته و ترليق سطح العين
موصى به في علاج متلازمة جفاف العين

بعد الفتح لا يحفظ أكثر من ثلاث (3)

الشهر : استعمال موضعي.

يحفظ بعيداً عن أنظار ومتناول الأطفال.



Distribué au Maroc par :
Laboratoires SOTHEMA
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc
N° Homologation Maroc :
1573/2016/DMP/20/DM
PPC : 147,00 DH

JR2762C10MAR/0919



Théa C 0459

21

Laboratoires Thsa
12, rue Louis Blériot
63017 - Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
Farmila Thsa Farmaceutico S.p.A.
Via Enrico Fermi, 50
20019 Settimo Milanese (MI) - Italie

تيسا
لورانس تيسا
6300 كليرون فيراند - فرنسا
فارملا - تيسا فارمaceutico س.پ.ا.
الانكرو فيرمي، 50
20019 ستيتمو ميلانيزي - إيطاليا.

Fust. 1449

8



Théalose®

Tréhalose 3 %
Hyaluronate de sodium
- 0,15 %
Solution Ophthalmique
Protège, hydrate
et lubrifie la surface
oculaire

10 ml

Sans conservateur

٢٠

تريالوز 3 %
هيا لورونات الصوديوم
0,15 %
محلول العين
بحمي ، يميته ويزلق سطح
العين

10 مل

بدون مادة حافظة

STERILE A



تاریخ اول فتح
Date de première ouverture

25°C

Tréhalose.....	3 g/100 ml
Hyaluronate de sodium.....	

Solution optalmique.

solution pour la protection, l'hydratation et la lubrification de la surface oculaire indiquée dans le traitement du syndrome de l'œil sec modéré à sévère.

Ne pas conserver au-delà de 3 mois après ouverture.

VOIE LOCALE.

INSTILLATION OCULAIRE

TENIR HORS DE LA VUE

ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.

تريالوز 300/غ/100 مل

.....

محتول العين -
محلول لحماية، تعبئته و ترليق سطح العين
موصى به في علاج متلازمة جفاف العين

بعد الفتح لا يحفظ أكثر من ثلاث (3)

الشهر : استعمال موضعي.

يحفظ بعيداً عن أنظار ومتناول الأطفال.

Laboratoires Thés

12, rue Louis Blériot

63017 - Clement-Ferrand Uceda &
Farmila-Thea Farmaceutici S.p.A.

Via Enrico Fermi, 50
20019 Sesto San Giovanni, Milano
Tel. 02/27001

12. شارع الخويس بشارو
63017

2001 - سترول هورون - مينيمس
 2001 - تينا فارمونتشي - د.
 2001 - سيمو ميلانيز - ايطاليا.

Théa C 0459



Distribué au Maroc par :
Laboratoires SOTHEMA
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc
N° Homologation Maroc :
1573/2016/DMP/20/DM
PPC : 147,00 DH

PR2762C10MAR/0919



Fust. 1449

Ouvrez le :

bimatoprost/timolol

collyre en solution

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,

GANFORT



92588MA

Flacon de 3 ml

غانفور ٥

٠,٣ ملغ/مل + ٥ ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution, flacon de 3 ml



Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

تحتوي على مواد مسبوكة
تتطلب مراقبة طبية

Tableau A (Liste I)
الأدوية جدول I



Ne pas utiliser chez les filles,
grosses ou allaitantes.
Ne pas procéder au portage,
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

Fabriqué par les Laboratoires

Allergan.

Castlebar Road

Westport, Co Mayo

Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosaes Ain Sebaâ
20590 Castablanca - Maroc

64156MA10

Allergan



0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

PPV:227DH00

Voie oculaire

Flacon de 3 ml



GANFORT

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,

collyre en solution

bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :

Bimatoprost.....0,3 mg

Timolol.....5,0 mg

sous forme de maléate de

timolol.....6,8 mg /

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide

citrique monohydraté, phosphate

disodique triphosphaté, chlorure de

sodium, hydroxyde de sodium ou

acide chlorhydrique (pour ajuster le

pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium

سواء كانت ذات تأثير معروف : كالكورين

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستخدام.

Tenir hors de la portée et de la vue

des enfants.

Conservez le flacon dans

l'emballage extérieur à l'abri de la

lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après

ouverture du flacon.

يستخدم خلال 4 أسابيع بعد فتح العبوة.

Lot

FAB:

EXP:

Ouvrez le :

bimatoprost/timolol

collyre en solution

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,

GANFORT



92588MA

Flacon de 3 ml

غانفور ٥

٠,٣ ملغ/مل + ٥ ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution, flacon de 3 ml



Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

تحتوي على مواد مسبوكة
تتطلب مراقبة طبية

Tableau A (Liste I)
الأدوية جدول I



Ne pas utiliser chez les filles,
grosses ou allaitantes.
Ne pas procéder au portage,
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

Fabriqué par les Laboratoires

Allergan.

Castlebar Road

Westport, Co Mayo

Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosaes Ain Sebaâ
20590 Castablanca - Maroc

64156MA10

Allergan



0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

PPV:227DH00

Voie oculaire

Flacon de 3 ml



GANFORT

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,

collyre en solution

bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :

Bimatoprost 0,3 mg

Timolol 5,0 mg

sous forme de maléate de

timolol 6,8 mg /

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide

citrique monohydraté, phosphate

disodique triphosphaté, chlorure de

sodium, hydroxyde de sodium ou

acide chlorhydrique (pour ajuster le

pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium

سواء كانت ذات تأثير معروف : ككبريت

ليزر الكونيم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستخدام

Tenir hors de la portée et de la vue

des enfants.

Conservez le flacon dans

l'emballage extérieur à l'abri de la

lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après

ouverture du flacon.

يستخدم خلال 4 أسابيع بعد فتح العبوة

Lot

FAB:

EXP:

Ouvrez le :

bimatoprost/timolol

collyre en solution

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,

GANFORT



92588MA

Flacon de 3 ml

غانفور ٥

٠,٣ ملغ/مل + ٥ ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution, flacon de 3 ml



Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

تحتوي على مواد مسبوكة
تتطلب مراقبة طبية

Tableau A (Liste I)
الأدوية جدول I



Ne pas utiliser chez les filles,
grosses ou allaitantes.
Ne pas procéder au portage,
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

Fabriqué par les Laboratoires

Allergan.

Castlebar Road

Westport, Co Mayo

Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosaes Ain Sebaâ
20590 Castablanca - Maroc

64156MA10

Allergan



0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

PPV:227DH00

Voie oculaire

Flacon de 3 ml



GANFORT

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,

collyre en solution

bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :

Bimatoprost.....0,3 mg

Timolol.....5,0 mg

sous forme de maléate de

timolol.....6,8 mg /

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide

citrique monohydraté, phosphate

disodique triphosphaté, chlorure de

sodium, hydroxyde de sodium ou

acide chlorhydrique (pour ajuster le

pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium

سواء كانت ذات تأثير معروف : كالكورين

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستخدام

Tenir hors de la portée et de la vue

des enfants.

Conservez le flacon dans

l'emballage extérieur à l'abri de la

lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après

ouverture du flacon.

يستخدم خلال 4 أسابيع بعد فتح العبوة

Lot

FAB:

EXP:

Ouvrez le :

bimatoprost/timolol

collyre en solution

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,

GANFORT



92588MA

Flacon de 3 ml

غانفور

0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution, flacon de 3 ml



Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

تحتوي على مواد مسبوكة
تتطلب مراقبة طبية

Tableau A (Liste I)
الأدوية جدول I



Ne pas utiliser chez les filles,
les femmes enceintes ou allaitant,
ou pendant la grossesse, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

Fabriqué par les Laboratoires

Allergan.

Castlebar Road
Westport, Co Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosaes Ain Sebaâ
20590 Castablanca - Maroc

64156MA10

Allergan



0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

PPV:227DH00

Voie oculaire

Flacon de 3 ml



GANFORT
0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :
Bimatoprost 0,3 mg
Timolol 5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol 6,8 mg /

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique trihydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
سواء كانت ذات تأثير معروف : كلوريد

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستخدام
وتجنب استخدامه خارج العين
والعين.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستخدم خلال 4 أسابيع بعد فتح العبوة.

Lot
FAB:
EXP:

Ouvrez le :

bimatoprost/timolol

collyre en solution

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,

GANFORT



92588MA

Flacon de 3 ml

غانفور ٥

٠,٣ ملغ/مل + ٥ ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution, flacon de 3 ml



Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

تحتوي على مواد مسبوكة
تحتوي على مواد مسبوكة

Tableau A (Liste I)
اللائحة جدول I



Ne pas utiliser chez les filles,
grosses ou allaitantes.
Ne pas utiliser chez les enfants
do procéder en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

Fabriqué par les Laboratoires

Allergan.

Castlebar Road
Westport, Co Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosa Ain Sebaâ
20590 Castablanca - Maroc

64156MA10

Allergan



0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

PPV:227DH00

Voie oculaire

Flacon de 3 ml



GANFORT
0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :
Bimatoprost 0,3 mg
Timolol 5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol 6,8 mg /

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique trihydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
سواء كانت ذات تأثير معروف : كلورين
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستخدام
Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستخدم خلال 4 أسابيع بعد فتح العبوة.

Lot
FAB:
EXP:

Ouvrez le :

bimatoprost/timolol

collyre en solution

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,

GANFORT



92588MA

Flacon de 3 ml

غانفور ٥

٠,٣ ملغ/مل + ٥ ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution, flacon de 3 ml



Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

تحتوي على مواد مسبوكة
تحتوي على مواد مسبوكة

Tableau A (Liste I)
اللائحة جدول I



Ne pas utiliser chez les filles,
grosses ou allaitantes.
Ne pas utiliser chez les enfants
do procéder en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

Fabriqué par les Laboratoires

Allergan.

Castlebar Road
Westport, Co Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosa Ain Sebaâ
20590 Castablanca - Maroc

64156MA10

Allergan



0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

PPV:227DH00

Voie oculaire

Flacon de 3 ml



GANFORT
0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :
Bimatoprost 0,3 mg
Timolol 5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol 6,8 mg /

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique trihydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
سواء كانت ذات تأثير معروف : كلورين
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستخدام
Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستخدم خلال 4 أسابيع بعد فتح العبوة.

Lot
FAB:
EXP:

Ouvrez le :

bimatoprost/timolol

collyre en solution

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,

GANFORT



92588MA

Flacon de 3 ml

غانفور ٥

٠,٣ ملغ/مل + ٥ ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution, flacon de 3 ml



Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

تحتوي على مواد مسبوكة
تحتوي على مواد مسبوكة

Tableau A (Liste I)
اللائحة جدول I



Ne pas utiliser chez les filles,
grosses ou allaitantes.
Ne pas utiliser chez les enfants
do procéder en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

Fabriqué par les Laboratoires

Allergan.

Castlebar Road
Westport, Co Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosa Ain Sebaâ
20590 Castablanca - Maroc

64156MA10

Allergan



0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

PPV:227DH00

Voie oculaire

Flacon de 3 ml



GANFORT
0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :
Bimatoprost 0,3 mg
Timolol 5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol 6,8 mg /

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique trihydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
Chlorure de benzalkonium

سواء كانت ذات تأثير معروف : كالكورين
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستخدام.

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستخدم خلال 4 أسابيع بعد فتح العبوة.

Lot
FAB:
EXP:

Ouvrez le :

bimatoprost/timolol

collyre en solution

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,

GANFORT



92588MA

Flacon de 3 ml

غانفور ٥

٠,٣ ملغ/مل + ٥ ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution, flacon de 3 ml



Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

تحتوي على مواد مسبوكة
تحتوي على مواد مسبوكة

Tableau A (Liste I)
اللائحة جدول I



Ne pas utiliser chez les filles,
grosses ou allaitantes.
Ne pas utiliser chez les enfants
ou pendant la grossesse, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

Fabriqué par les Laboratoires

Allergan.

Castlebar Road
Westport, Co Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosa Ain Sebaâ
20590 Castablanca - Maroc

64156MA10

Allergan



0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

PPV:227DH00

Voie oculaire

Flacon de 3 ml



GANFORT
0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :
Bimatoprost 0,3 mg
Timolol 5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol 6,8 mg /

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique trihydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium

سواء كانت ذات تأثير معروف : كلورين
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستخدام.

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستخدم خلال 4 أسابيع بعد فتح العبوة.

Lot
FAB:
EXP:

08 2023

THMP 1A

EXP :
Lot :

02

889362 MA

Titulaire d'AMM au Maroc

صاحب رخصة التسويق بالمغرب

Laboratoires SOThEMA

B.P N°1, 27182

Bouskoura-Maroc

NE PAS AVALER

RESPECTER LES DONNES PRESCRITES

Tableau A (liste I) - Uniquement
sur ordonnanceلا ينبغي
تخطي الجرعات الموصوفة
جاءت (تأخذ) الجرعة في وقت
واحد فقطSoyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la
noticeكن حذرا لا تقم بالسياقة
بدون قراءة التعليمات

Laboratoires Sothema Bouskoura
Tobradex® 0.3/0.1% collyre en suspension, 5 ml
AMM N°: 524/ 18 DMP/ 21/ NTO
Boîte de 1 flacon.
PPV : 35,70 DHS



406835 MA

Fabricant : الصنعة
Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14, 8287D Puurs, Belgique
Alcon Ocul. S.A.
Cami Fabre 58, 08320 El Masnou,
Barcelona, Espagne

COMPOSITION :

Dexaméthasone 0,10 g
Tobramycine 0,30 g

Pour 100 ml de collyre

Eau distillée de sodium

Chlorure de sodium

Sulfate de sodium anhydre

Tyrocidol

Hydroxyéthylcellulose

Acide succinique et/ou hydroxyde de sodium

Eau purifiée

Excipient à effet irritant

Chlorure de benzalkonium

Vase Optamix

Lire la notice pour plus d'informations.

TOUTE A PORTÉE ET DE LA

VUE DES ENFANTS

Ne pas utiliser ce produit après 4 semaines

Ce médicament est conservé à température ambiante (entre 15°C et 25°C)

Ne pas conserver à une température inférieure à 15°C

Ne pas conserver

Contenir 100 ml

Sous la forme d'un collyre

0,10 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

0,30 g

TOBRADEx®

COLLYRE

EN SUSPENSION

Tobramycine

Dexaméthasone

0.3/0.1%

قطرات العين على شكل

معلق

توبراداميسين/ديكساميثازون

0.1/0.3%

Flacon de 5 ml

قارورة من فئة 5 مل

NOVARTIS



Dr. Mustapha AZHARI

*Spécialiste des Maladies
et de la Chirurgie des Yeux
Ancien Interne des hôpitaux
de Toulouse (France)*

*Laser Excimer - Strabisme
Contactologie*



الدكتور مصطفى أزهرى

**اختصاصي في أمراض
وجراحة العيون
طبيب سابقا بمستشفيات
تولوز - فرنسا**

**جراحة بالليزر - علاج الحول
العدسات اللاصقة**

12 août 2022

Casablanca, le

Mme ZAKARIA IMANE

05,20 + 4

XOLA COLLYRE



1 goutte 2 x / j, dans les deux yeux, pendant 3 Mois

7:380,80

Pharmacie AL ABE
Dr. Sana CHEAIB
48, Lot Essoufria
Sidi Matarouf Casablanca
Tél 05 22 27 40 65

Dr. AZHARI Mustapha
OPHTALMOLOGUE
131, Boulevard Abdelmoumen - 4^e Etage - N° 15 - Casablanca
Tél / Fax 0522 27 60 61

৫৭

8
9
21
3
4
5
6
7
10
12
13



Tableau A (liste I) (لاصة I) جدول أ

Ne pas rester assis/Ne pas rester debout
عدم الجلوس/عدم الوقوف

جدد، السائلة (المزينة) السريعة للزوجة.
(نجاح: طريقة مستخدمة في جميع الحالات).
الحصول: أولاً، السادة (الزوجة) الحادة.
يطلق الدواء بعد 30 يوماً من فتح.
يحتفظ بعينه عن تناول الأطفال.
يحتفظ في درجة حرارة لا تزيد عن 30 °C.
عن طريق العين.
كلوريد البوتاسيوم.
سواء ذات معلقات معلومة:
(22.25 ملغ كلوريد البوتاسيوم).
كل 1 مل يحتوي على:

2% زولا

12502660-02S

6 118001 040421



5ml

Jamjoom Pharma

SOLUTION
OPTALMIQUE
(Dorzolamide)



Ophthalmics

82, Allée des Casseurs - Ap' Dada - Casablanca - Maroc

bottu.

AMM N°313R1/19DMP/21/NRQ

Un produit fabriqué par
Jamjoom Pharmaceutica Co.,
Jeddah, Arabie Saoudite
Lire attentivement la notice.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
À conserver 30 jours après ouverture.

Ne pas stocker au-dessus de 30 °C.

Vole oculaire

Chlorure de Benzaconium
Excipient à effet notable :
Dorzolamide 20 mg).
22,25 mg (Equivalent à
Chlorhydrate de Dorzolamide

2% Xola



24



Jamjoom Pharma

5ml

محلول ملحي
(موزون لا يند)



Ophthalmics

2% زولا
Xola®

Lot: 1 2 3 4 5
Fab: 0 5 2 1
Exp: 0 9 2 3

P.P.V: 65 DH 20



Dr. Mustapha AZHARI

Spécialiste des Maladies
et de la Chirurgie des Yeux
Ancien Interne des hôpitaux
de Toulouse (France)

Laser Excimer - Strabisme
Contactologie



الدكتور مصطفى أزهرى

اختصاصي في أمراض
وجراحة العيون
طبيب سابقاً بمستشفيات
تولوز - فرنسا

جراحة بالليزر - علاج الحول
العدسات اللاصقة

02 août 2022

Casablanca, le

Mme ZAKARIA IMANE

Monture + verres correcteurs progressifs

Antireflets multi-couches, Transition

VL : OD = + 2.25 (- 0.50 à 85°)

OG = - 0.25 (- 0.25 à 60°)

VP : ODG = Add : + 2.25

7

Dr. AZHARI Mustapha
OPHTALMOLOGUE
131, Boulevard Abdelmoumen
4ème Etage N° 15 CASA
Tél / Fax 0522 27 60 61

ATLAS OPTIQUE
LYNX OPTIQUE
DEPLOMES
N° Autorisation : 1091
Identifiant : 095007648
Pte. : 35707671 - TVA : 814261
ICE : 00145054000057

Dr. AZHARI Mustapha
OPHTALMOLOGUE
131, Boulevard Abdelmoumen
4ème Etage N° 15 CASA
Tél / Fax 0522 27 60 61

LYNX OPTIQUE
8 RUE ASSAAD IBN ZERRARA
MAARIF CASABLANCA
Tél : 05 22 99 22 88/ 89
Fax : 05 22 99 22 87
lynxoptique@menara.ma

CASABLANCA LE 02/08/2022

FACTURE N° 22/2840

MME ZAKARIA IMANE

INPE 095007548
IF 1000696
ICE 001515084000057

DESCRIPTION	MONTANT EN DHS/TTC
1 MONTURE OPTIQUE	2,000.00
1 VERRE ESSILOR PROGRESSIF ORGANIQUE AMINCI ANTIREFLETS MULTICO	3,500.00
1 VERRE ESSILOR PROGRESSIF ORGANIQUE AMINCI ANTIREFLETS MULTICO	3,500.00
OD = +2.25 (-0.50) 85° ADD +2.25 OG = -0.25 (-0.25) 60° ADD +2.25	

Dont TVA (20%)

1,500.00

TOTAL TTC

9,000.00

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
Neuf mille Dirhams

ATLAS OPTIQUE
LYNX OPTIQUE
Nadine COHEN
OPTICIENS DIPLOMES
N° Autorisation 1091 Identifiant INPE 095007548
RC: 72311 CNSS: 2351914 - TVA: 814261
Pte: 35701881 - IF: 1000696 - ICE: 001515084000057