

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES À LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 10347 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : Goudayy Mustafa

Date de naissance : 1948

Adresse : WIFIKA 3 Rue 73 N° 3 oufia 08

Tél. : 0706325998 Total des frais engagés : 3124.20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

	
Date de consultation : <u>09 SEP 2022</u>	<u>18/08/2022</u>
Norm et prénom du malade :	<u>Fatima SALITH FATHI</u>
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	<u>HTA + orthopé + Talalgies</u>

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le 18/08/2022

Signature de l'adhérent(e) : Dr. EL HADRAI



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18/08/2022			1500H	<i>Signature</i>
20/08/2022			Crédukt	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE D'IMANE 17/08/2022	18/08/22	794,20

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient DES TRAVAUX
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	MONTANTS DES SOINS
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Widad El Khadraj

Médecine Générale
ECHOGRAPHIE

ECG

Surveillance de Grossesse
Nutrition



الدكتورة وداد الخضراء

الطب العام
الفحص بالصدى
تخطيط القلب

مراقبة الحمل
الممية الطبية وتخفيض الوزن

Casablanca, le :

18/08/2022 الدار البيضاء في:

Name

SALHI

FATIMA

05/08

11 - extenrac

Date de fabrication :
A consommer de préférence avant fin :
N° de lot :
PPC = 95,00 DHS

V002-01/21
ETEXMAC030CP

10/2021
10/2024
0921065

3 760162 519741

My. 18/08/23

X 21 - mi prezar

49,60 DH بعثة 18/08/2023

31 - Dose

PPV: 49,60 DH
LOT: 22C01
EXP: 03/2025

05/08/23

Dr. WIDAD EL KHADRAJ

Médecine Générale
ECHOGRAPHIE

CASABLANCA
El Wifak 3 Rue 65, N° 59 El Oulfa - Casablanca (Prés de pharmacie Al Wifak)

Gsm: 05 22 89 19 27
06 20 89 19 27

Tél.: 05 22 891 927

حي الوفاق 3 زنة 65 رقم 59 الألف الدار البيضاء (قرب ميدالية الوفاق)



DIPREZAR®

Losartan 50 mg + Hydrochlorothiazide 12,5 mg

Comprimé pelliculé, boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Clafore pharmacothérapeutique : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques - code ATC : C09DA01
DIPREZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sel. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.
DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan, ou à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez ou avez eu autre dépendance chimique (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains anticonvulsifs qui sont les carbamazépine ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin),
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée,
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre DIPREZAR® en début de grossesse, voir rubrique 2),
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de la glibizine.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés :

Mises en garde et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien avant de prendre DIPREZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être [ou susceptible de devenir] enceinte. DIPREZAR® est désconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique 2).

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR® :

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue,
- Si vous prenez des diurétiques,
- Si vous faites un régime sans sel,
- Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées,
- Si vous avez une insuffisance cardiaque,
- Si votre fonction rénale est altérée (voir rubrique 2 « Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé »),
- Si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale,
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), d'angiome de poitrine (douleur thoracique du fait d'une mauvaise fonction cardiaque),
- Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque),
- Si vous êtes diabétique,
- Si vous avez eu de la goutte,
- Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie donnant de l'arthrite, un rash cutané et de la fièvre (lupus érythémateux disséminé),
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou de potassium, ou si vous suivez un régime basé sur le potassium,
- Si vous devez subir une chirurgie (rôle chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale ou faire des tests pour vérifier votre fonction pancréatique, vous devez informer votre médecin médical que vous prenez des comprimés de losartan potassique et d'hydrochlorothiazide,
- Si vous avez une hyperaldostéronisme primaire (un syndrome associé à une augmentation d'aldostéronisme suivi à une anomalie des glandes surrenales),
- Si vous prenez un ou des médicaments suivants destinés à traiter la pression artérielle élevée : - Un IEC (par exemple énapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux, diabète,
- L'aliskiren.

Votre médecin pourra être amené à vérifier votre fonction rénale, votre pression artérielle, et d'électrolytes (du potassium, par exemple) dans votre sang à intervalles réguliers.

Les patients qui prennent de l'HCTZ seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être surveillés pour tout risque de cancer de la peau non mélanome et doivent être informés de détecter toute nouvelle tumeur ou modification suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées et examinées pour diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera recommandé d'utiliser l'HCTZ doit aussi être réexaminié avec un examen de la peau.

Voir également la rubrique « Ne prenez jamais DIPREZAR® d'information. »

Enfants et adolescents :

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de DIPREZAR® par les enfants.

Autres médicaments et DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez d'autres médicaments.

Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide sont des médicaments.

Tous les préparations à base de lithium ne doivent pas être utilisées.

Des médicaments qui peuvent entraîner une contre-indication sont ceux qui contiennent de sel de potassium, suppléments potassiques, substituts de sel de potassium, d'autres diurétiques, certains laxatifs, médicaments pour contrôler le rythme cardiaque.

Il est aussi important pour votre médecin de savoir :

• Des autres médicaments pour abaisser votre pression artérielle,

• Des stéroïdes,

• Des médicaments pour le traitement du cancer,

• Des antidiabétiques,

• Des médicaments pour le traitement d'infection,

• Des médicaments contre l'arthrose,

• Des résines utilisées pour lutter contre un taux élevé de cholestérol,

• Des médicaments myorelaxants,

• Des somnifères,

• Des opioïdes tels que la morphine,

• Des catéchines pressives tels que l'adrénaline,

• Des médicaments antiépileptiques oraux ou cibles.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose.

Si vous prenez un IEC ou l'aliskiren (voir page 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés) et / ou Avant d'utiliser l'agent de contraste iodé.

Informez aussi votre médecin que vous prenez et recevez des produits de contraste iodés.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés

Il est conseillé de ne pas boire d'alcool en même temps que l'agent de contraste iodé.

Des quantités excessives de sel dans l'alimentation peuvent causer des courts ou des débordements des repas.

Grossesse et allaitement :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être enceinte. Il vous recommandera normalement d'arrêter de prendre DIPREZAR®. DIPREZAR® est désconseillé pendant la grossesse de plus de 3 mois car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

Informez votre médecin si vous alliez ou êtes enceinte ou si vous êtes allaitante et votre médecin conseille pour les femmes qui allaitent et votre médecin souhaitera allaiter.

Sportifs :

Le diurétique contenu dans ce médicament peut interférer avec le contrôle antidopage.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Lors de l'initiation du traitement par ce médicament, attention particulière (telles que la conduite d'une voiture) vous ne savez pas comment vous tolérez ce médicament.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés.

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance au médicament.

50 mg/12,5 mg,

légament en su-

à la médecine ou

à AR en fonction

à DIPREZAR®

à la pression arté

part des pa-

contrôle val-

primés une f

par jour de D

maximum par jour et

comprise par jo

P P V 1 1 4 D H 3 0
P E R 0 5 / 2 5
L O T L 1 6 9 8



ces comprimés doivent être avalés entiers avec un verre d'eau. Si vous avez pris plus de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, en cas de surdosage, vous devez consulter immédiatement un service d'urgence. Un surdosage peut provoquer une chute de la tension artérielle, des changements de la composition du sang.

DIPREZAR®

Losartan 50 mg + Hydrochlorothiazide 12,5 mg

Comprimé pelliculé, boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Clafore pharmacothérapeutique : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques - code ATC : C09DA01
DIPREZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sel. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.
DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan, ou à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez ou avez eu autre dépendance (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains anticonvulsifs qui sont les carbamazépine ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin),
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée,
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre DIPREZAR® en début de grossesse, voir rubrique 2),
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'olésikren.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés :

Mises en garde et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien avant de prendre DIPREZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être [ou susceptible de devenir] enceinte. DIPREZAR® est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique 2).

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR® :

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue,
- Si vous prenez des diurétiques,
- Si vous faites un régime sans sel,
- Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées,
- Si vous avez une insuffisance cardiaque,
- Si votre fonction rénale est altérée (voir rubrique 2 « Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé »),
- Si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale,
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), d'angiome de poitrine (douleur thoracique du fait d'une mauvaise fonction cardiaque),
- Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque),
- Si vous êtes diabétique,
- Si vous avez eu de la goutte,
- Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie donnant de l'arthrite, un rash cutané et de la fièvre (lupus érythémateux disséminé),
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou de potassium, ou si vous suivez un régime basé sur le potassium,
- Si vous devez subir une chirurgie (rôle chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale ou faire des tests pour vérifier votre fonction pancréatique, vous devez informer votre médecin médical que vous prenez des comprimés de losartan potassique et d'hydrochlorothiazide,
- Si vous avez une hyperaldostéronisme primaire (un syndrome associé à une augmentation d'aldostéronisme suivi à une anomalie des glandes surrenales),
- Si vous prenez un ou des médicaments suivants destinés à traiter la pression artérielle élevée : - Un IEC (par exemple énapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux, diabète,
- L'olésikren.

Votre médecin pourra être amené à vérifier votre fonction rénale, votre pression artérielle, et d'électrolytes (du potassium, par exemple) dans votre sang à intervalles réguliers.

Les patients qui prennent de l'HCTZ seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être examinés régulièrement pour détecter toute nouvelle tumeur ou modification suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées et examinées pour un diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera utile de porter des vêtements de protection adéquats. L'utilisation d'HCTZ doit aussi être réexaminée avec un avis de votre médecin.

Voir également la rubrique « Ne prenez jamais DIPREZAR® sans information. »

Enfants et adolescents :

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de DIPREZAR® chez les enfants.

Autres médicaments et DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez d'autres médicaments.

Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide sont des médicaments.

Tous les préparations à base de lithium ne doivent pas être utilisées.

Des médicaments qui peuvent entraîner une contre-indication sont ceux qui contiennent de sel de potassium, suppléments potassiques, substituts de sel de potassium, d'autres diurétiques, certains laxatifs, médicaments pour contrôler le rythme cardiaque.

Il est aussi important pour votre médecin de savoir :

- Des autres médicaments pour abaisser votre pression artérielle.
- Des stéroïdes.
- Des médicaments pour le traitement du cancer.
- Des antidiabétiques.
- Des médicaments pour le traitement d'infection.
- Des médicaments contre l'arthrose.
- Des résines utilisées pour lutter contre un taux élevé de cholestérol.
- Des médicaments myorelaxants.
- Des somnifères.
- Des opioïdes tels que la morphine.
- Des catéchines pressives tels que l'adrénaline.
- Des médicaments antidiabétiques oraux ou insuline.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose.

Si vous prenez un IEC ou l'olésikren (voir page 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés) et / ou Avelox, informez aussi votre médecin que vous prenez ces deux médicaments et recevez des produits de contraste iodés.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés :

Il est conseillé de ne pas boire d'alcool en même temps que ce médicament pour augmenter les effets de chacun d'eux. Des quantités excessives de sel dans l'alimentation peuvent entraîner des nausées ou des crampes.

Grossesse et allaitement :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être enceinte. Il vous recommandera normalement d'arrêter de prendre ce médicament. Il vous recommandera de ne pas prendre ce médicament pendant la première partie de la grossesse.

Informez votre médecin si vous alliez ou êtes enceinte ou si vous alliez ou êtes enceinte. Il vous recommandera de ne pas prendre ce médicament pendant la deuxième partie de la grossesse.

Informez votre médecin si vous alliez ou êtes enceinte ou si vous alliez ou êtes enceinte. Il vous recommandera de ne pas prendre ce médicament pendant la troisième partie de la grossesse.

Sportifs :

Le diurétique contenu dans ce médicament peut interférer avec les tests antidopage.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Lors de l'initiation du traitement par ce médicament, attention particulière (telles que la conduite d'une voiture) vous ne savez pas comment vous tolérez ce médicament.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés : Si votre médecin vous a informé d'une intolérance au médicament.

50 mg/12,5 mg,

légament en sucre, à prendre une fois par jour, en fonction de la pression artérielle.

Il faut des pilules pour contrôler votre tension artérielle. Prenez une pilule par jour de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé par jour.

P P V 1 1 4 D H 3 0
P E R 0 5 / 2 5
L O T L 1 6 9 8



ces comprimés doivent être avalés entiers avec un verre d'eau. Si vous avez pris plus de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, contactez le service des urgences. En cas de surdosage, vous devez consulter immédiatement un centre de soins de santé. Un surdosage peut provoquer une chute de la tension artérielle, des changements de la composition du sang.

DIPREZAR®

Losartan 50 mg + Hydrochlorothiazide 12,5 mg

Comprimé pelliculé, boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Clafore pharmacothérapeutique : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques - code ATC : C09DA01
DIPREZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sel. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.
DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés ?

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan, ou à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez ou avez eu autre dépendance chimique (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains anticonvulsifs qui sont les carbamazépine ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin),
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée,
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre DIPREZAR® en début de grossesse, voir rubrique 2),
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de la glibizine.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, Comprimés pelliculés :

Mises en garde et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien avant de prendre DIPREZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être [ou susceptible de devenir] enceinte. DIPREZAR® est désconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique 2).

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR® :

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue,
- Si vous prenez des diurétiques,
- Si vous faites un régime sans sel,
- Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées,
- Si vous avez une insuffisance cardiaque,
- Si votre fonction rénale est altérée (voir rubrique 2 « Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé »),
- Si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale,
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), d'angiome de poitrine (douleur thoracique du fait d'une mauvaise fonction cardiaque),
- Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque),
- Si vous êtes diabétique,
- Si vous avez eu de la goutte,
- Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie donnant de l'arthrite, un rash cutané et de la fièvre (lupus érythémateux disséminé),
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou de potassium, ou si vous suivez un régime basé sur le potassium,
- Si vous devez subir une chirurgie (rôle chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale ou faire des tests pour vérifier votre fonction pancréatique, vous devez informer votre médecin médical que vous prenez des comprimés de losartan potassique et d'hydrochlorothiazide,
- Si vous avez une hyperaldostéronisme primaire (un syndrome associé à une augmentation d'aldostéronisme suivi à une anomalie des glandes surrenales),
- Si vous prenez un ou des médicaments suivants destinés à traiter la pression artérielle élevée : - Un IEC (par exemple énapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux, diabète,
- L'aliskiren.

Votre médecin pourra être amené à vérifier votre fonction rénale, votre pression artérielle, et

d'électrolytes (du potassium, par exemple) dans votre sang à intervalles réguliers.

Les patients qui prennent de l'HCTZ seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être surveillés pour tout risque de cancer de la peau non mélanome et doivent être informés de toute nouvelle tumeur ou modification suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées et examinées pour diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera recommandé d'utiliser l'HCTZ doit aussi être réexaminié avec un examen de la peau.

Voir également la rubrique « Ne prenez jamais DIPREZAR® sans information. »

Enfants et adolescents :

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de DIPREZAR® chez les enfants.

Autres médicaments et DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez d'autres médicaments. Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide sont des médicaments.

Tous les préparations à base de lithium ne doivent pas être utilisées.

Des médicaments qui peuvent entraîner une contre-indication peuvent contenir de sel de potassium, suppléments potassiques, substituts de sel de potassium, d'autres diurétiques, certains laxatifs, médicaments pour contrôler le rythme cardiaque.

Il est aussi important pour votre médecin de savoir si vous prenez d'autres médicaments pour abaisser votre pression artérielle.

• Des stéroïdes,

• Des médicaments pour le traitement du cancer,

• Des antidiabétiques,

• Des médicaments pour le traitement d'infection,

• Des médicaments contre l'arthrose,

• Des résines utilisées pour lutter contre un taux élevé de cholestérol,

• Des médicaments myorelaxants,

• Des somnifères,

• Des opioïdes tels que la morphine,

• Des catéchines pressives tels que l'adrénaline,

• Des médicaments antidiabétiques oraux ou injectables.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés et / ou Avelox.

Informez aussi votre médecin que vous prenez et recevez des produits de contraste iodés.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés

Il est conseillé de ne pas boire d'alcool en même temps que DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés. Il peut augmenter les effets de chacun d'eux.

Des quantités excessives de sel dans l'alimentation peuvent causer des crampes ou des douleurs dans les intestins.

Grossesse et allaitement :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être enceinte. Il vous recommandera normalement d'arrêter de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Informez votre médecin si vous alliez ou êtes enceinte ou allaitante. Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Informez votre médecin si vous alliez ou êtes enceinte ou allaitante. Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés pendant la grossesse.

<p

