

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

0 Réclamation	: contact@mupras.com
0 Prise en charge	: pec@mupras.com
0 Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

10221

Société :

RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

AGNAN Rania

épouse ABAG

Date de naissance :

1981-06-26

Adresse :

Finchelle EL Nourui 5444 HH. APT. N° 6

Tél. :

06 69 26 36 79

Total des frais engagés : 653.600 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

ABAG Bouchair

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Cardiologue Hypertension - diabétique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 08/09/2022

Signature de l'adhérent(e) :



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
	x			



## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<b>PHARMACIE EL KHALIL</b> <b>S.A.R.L</b> Angle Bd Ghandi et Bd Abd Mansour - Casablanca 0522 36 08 06	919122	653,60

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

The diagram shows a dental arch with 16 numbered teeth (1 through 8 on each side) and arrows indicating movement directions. A horizontal arrow labeled 'D' points left, and a vertical arrow labeled 'B' points down. The teeth are arranged in a curve, with the first molar on each side being the lowest and the second molar being the highest. The teeth are numbered sequentially from 1 to 8 on both the upper and lower arches.

#### **[Création, remont, adjonction]**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Facture N°: 500 547

Ref N°: 09/09/22/ 76

Client: *Boudjema* Client Comptoir \*

Libellé Produit	Forme	Qté	Prix unitaire	Total PPM
AMAREL 2MG	CO	1	60,40	60,40
FLUDEX 1.5MG	CO	2	68,90	137,80
GALVUS MET 50MG/1000MG 60	CO	1	390,00	390,00
ASPEGIC 100	PG	3	21,80	65,40

  

Total à Payer:	653,60
----------------	--------

La présente facture est arrêtée à la somme de:

### SIX CENT CINQUANTE TROIS DIRHAMS SOIXANTE CENTIMES###

Le : 09-septembre-2022  
**PHARMACIE OULMES CASA**  
**S.A.R.L.A.U**  
 Angle Bd Ghandi et Yacoub  
 El Mansour - Casablanca  
 Tél: 0522 36 08 06

*Yacoub Boudjema*

PHARMACIE OULMES CASA  
 S.A.R.L.A.U  
 Angle Bd Ghandi et Yacoub  
 El Mansour - Casablanca  
 Tél: 0522 36 08 06

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicamente.

#### Fermette

L'acétaminophène, comme tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), peut altérer la fertilité des femmes et entraîner des difficultés, pour devenir enceinte, de façon réversible à l'arrêt du traitement. Informez votre médecin si vous planifiez une grossesse ou si vous avez des difficultés à concevoir.

#### ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

**CONTENU DE LA BOÎTE**

Ce médicament contient un sucre (le lactose) qui se décompose en galactose et en glucose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (malades bénéficiaires non).

Si votre médecin vous a déjà dit que vous ou votre enfant présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

#### 3. COMMENT UTILISER ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Versez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

#### CE DOSEAGE EST RÉSERVÉ AU NOURRISON ET À L'ENFANT PESANT ENTRE 6 ET 22 KG (VOIR ENVIRON 3 à 7 ANS).

Le dosage d'acétaminophène dépend du poids de l'enfant. Les âges sont mentionnés à titre d'information. Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée.

L'acétaminophène existe sous de nombreux dosages, permettant d'adapter le traitement au poids de chaque enfant.

#### EN CAS DE DÉSORDRE ENFANTIN FEVER

La dose quotidienne d'acétaminophène est d'environ 60 mg/kg/jour à répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/jour toutes les 6 heures ou 10 mg/jour toutes les 8 heures (référence non étiquetée aux parages simples, c'est-à-dire suivant le poids de votre enfant).

Enfants de 6 à 8 kg (environ 3 à 9 mois)

La dose habituelle est de 1 sachet par prise, à prononcer si besoin au bout de 6 heures, sans déposer de sucre, par jour.

Enfant de 9 à 11 kg (environ 3 à 24 mois)

La dose habituelle est de 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures.

Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée.

L'acétaminophène existe sous de nombreux dosages, permettant d'adapter le traitement au poids de chaque enfant.

#### EN CAS DE DÉSORDRE ENFANTIN FEVER

La dose quotidienne d'acétaminophène est d'environ 60 mg/kg/jour à répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/jour toutes les 6 heures ou 10 mg/jour toutes les 8 heures (référence non étiquetée aux parages simples, c'est-à-dire suivant le poids de votre enfant).

Enfants de 6 à 8 kg (environ 3 à 9 mois)

La dose habituelle est de 1 sachet par prise, à prononcer si besoin au bout de 6 heures, sans déposer de sucre, par jour.

Enfant de 9 à 11 kg (environ 3 à 24 mois)

La dose habituelle est de 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures.

Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée.

L'acétaminophène existe sous de nombreux dosages, permettant d'adapter le traitement au poids de chaque enfant.

#### EN CAS DE DÉSORDRE ENFANTIN FEVER

La dose quotidienne d'acétaminophène est d'environ 60 mg/kg/jour à répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/jour toutes les 6 heures ou 10 mg/jour toutes les 8 heures (référence non étiquetée aux parages simples, c'est-à-dire suivant le poids de votre enfant).

Enfants de 6 à 8 kg (environ 3 à 9 mois)

La dose habituelle est de 1 sachet par prise, à prononcer si besoin au bout de 6 heures, sans déposer de sucre, par jour.

Enfant de 9 à 11 kg (environ 3 à 24 mois)

La dose habituelle est de 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures.

Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée.

L'acétaminophène existe sous de nombreux dosages, permettant d'adapter le traitement au poids de chaque enfant.

#### EN CAS DE DÉSORDRE ENFANTIN FEVER

**Dose(s) du traitement**

La durée du traitement est limitée :

- 5 Jours en cas de douleurs,
- 3 Jours en cas de fièvre.

En cas de maladies rhumatismales, votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez lui donner ce médicament.

Arrêtez le traitement et consultez immédiatement votre médecin :

• Si les douleurs persistent plus de 3 jours,

• Si le douleur ou la fièvre s'aggrave,

• Si vous trouvez que le traitement n'est pas assez efficace,

• ou si tout nouveau signe apparaît (ex : raidissement de la nuque, diarrhées, vomissements, ...).

Si votre enfant a pris plus de ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose qu'il n'aaurait dû :

Consultez immédiatement votre médecin (en indiquant l'heure et la quantité prise).

Un surdosage peut être mortel, en particulier si vous avez également pris d'autres médicaments.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Si vous avez également pris d'autres médicaments, il faut consulter immédiatement votre pharmacien.

Quinoléï, maladie broncale avec baisse importante de la pression artérielle (choc anaphylactique).

frapin, clanteen, plats ou arachides avec déshydratation et sensation de soif, urination, éternuttement d'oreille, sensation de brûlure de l'urine, maux de tête et vertiges.

hypoglycémie importante (basculement du tonus du

syndrome de l'œve d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine (voir rubrique 2 « avertissements et précautions »).

inflammation des vaisseaux sanguins pouvant être associée à des atteintes des articulations, du rein, de la peau et du tube digestif.

augmentation des enzymes du foie, atteinte du foie (principalement des cellules du foie).

Maladie du foie chronique hépatite (nommée).

des patients au cours d'une réaction allergique liée à l'acide

une accumulation de liquide dans les tissus) si vous

avez également pris d'autres médicaments.

une insuffisance cardiaque en cas d'utilisation au long

tracé allant à l'aspirine.

réaction qui peut traduire vers l'œil gauche et la maladie

de l'œil (comme).

une réaction allergique à l'aspirine.

ne peut pas être systématique, surtout si la fièvre est bien supportée par

l'enfant.

épandante ce qui est dû à une systématique, surtout si la fièvre est bien supportée par

l'enfant.

enfants, les convulsions, et les courbures superficielles de vêtements,

ne pas trop chauffer la pièce (environ 20-25 °C).

Ces 3 mesures simples sont suffisantes, dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.

D'autres mesures existent (bain tiède, poches de glace, enveloppements humides, ...), elles ne sont pas forcément plus efficaces et ne seront envisagées que si elles

augmentent le mal être de l'enfant.

ne pas trop chauffer la pièce (environ 20-25 °C).

Ces 3 mesures simples sont suffisantes, dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.

D'autres mesures existent (bain tiède, poches de glace, enveloppements humides, ...), elles ne sont pas forcément plus efficaces et ne seront envisagées que si elles

augmentent le mal être de l'enfant.

ne pas trop chauffer la pièce (environ 20-25 °C).

Ces 3 mesures simples sont suffisantes, dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.

D'autres mesures existent (bain tiède, poches de glace, enveloppements humides, ...), elles ne sont pas forcément plus efficaces et ne seront envisagées que si elles

augmentent le mal être de l'enfant.

ne pas trop chauffer la pièce (environ 20-25 °C).

Ces 3 mesures simples sont suffisantes, dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.

D'autres mesures existent (bain tiède, poches de glace, enveloppements humides, ...), elles ne sont pas forcément plus efficaces et ne seront envisagées que si elles

augmentent le mal être de l'enfant.

ne pas trop chauffer la pièce (environ 20-25 °C).

Ces 3 mesures simples sont suffisantes, dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.

D'autres mesures existent (bain tiède, poches de glace, enveloppements humides, ...), elles ne sont pas forcément plus efficaces et ne seront envisagées que si elles

augmentent le mal être de l'enfant.

ne pas trop chauffer la pièce (environ 20-25 °C).

Ces 3 mesures simples sont suffisantes, dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.

D'autres mesures existent (bain tiède, poches de glace, enveloppements humides, ...), elles ne sont pas forcément plus efficaces et ne seront envisagées que si elles

augmentent le mal être de l'enfant.

ne pas trop chauffer la pièce (environ 20-25 °C).

\* Les autres composants sont : La glycine, l'acide mandarique (contenant du lactose) et le glycyrhizate d'ammonium.

que faire en cas de réaction allergique à l'emballage extérieur

ce médicament se présente sous la forme d'une poudre blanche dans un sachet-dose.

chaque boîte contient 20 sachets-doses.

Conditions de prescription et de livraison

Mediamente se presentan a prescripción médica.

La fecha de vencimiento a de la fièvre lorsque se temperatura desciende a 38 °C.

La fièvre es una reacción natural y frecuente de la organismos para luchar contra las infecciones, si o no es que sea el signo de una enfermedad grave o que sea

entraña de las complicaciones.

ce que se hace:

Conseil d'éducation sanitaire :

QUE FAIRE EN CAS DE FIÈVRE ?

On considère qu'un enfant a de la fièvre lorsque sa température dépasse 38 °C.

La fièvre est une réaction naturelle et fréquente de l'organisme pour lutter contre les infections, il oírás que es el signo de una enfermedad grave o que es

entraña de las complicaciones.

ce que se fait :

Comment fait se utilise un médicament contre la fièvre ?

1) Avant de donner un médicament contre la fièvre, il faut toujours :

• enlever les vêtements et les couvertures de vêtements,

• presenter a boner a l'enfant,

• ne pas trop chauffer la pièce (environ 20-25 °C).

Ces 3 mesures simples sont suffisantes, dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.

D'autres mesures existent (bain tiède, poches de glace, enveloppements humides, ...), elles ne sont pas forcément plus efficaces et ne seront envisagées que si elles

augmentent le mal être de l'enfant.

ne pas trop chauffer la pièce (environ 20-25 °C).

Ces 3 mesures simples sont suffisantes, dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.

D'autres mesures existent (bain tiède, poches de glace, enveloppements humides, ...), elles ne sont pas forcément plus efficaces et ne seront envisagées que si elles

augmentent le mal être de l'enfant.

ne pas trop chauffer la pièce (environ 20-25 °C).

Ces 3 mesures simples sont suffisantes, dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.

D'autres mesures existent (bain tiède, poches de glace, enveloppements humides, ...), elles ne sont pas forcément plus efficaces et ne seront envisagées que si elles

augmentent le mal être de l'enfant.

ne pas trop chauffer la pièce (environ 20-25 °C).

Ces 3 mesures simples sont suffisantes, dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.

D'autres mesures existent (bain tiède, poches de glace, enveloppements humides, ...), elles ne sont pas forcément plus efficaces et ne seront envisagées que si elles

augmentent le mal être de l'enfant.

ne pas trop chauffer la pièce (environ 20-25 °C).

Ces 3 mesures simples sont suffisantes, dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.

D'autres mesures existent (bain tiède, poches de glace, enveloppements humides, ...), elles ne sont pas forcément plus efficaces et ne seront envisagées que si elles

augmentent le mal être de l'enfant.

ne pas trop chauffer la pièce (environ 20-25 °C).

Ces 3 mesures simples sont suffisantes, dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.

D'autres mesures existent (bain tiède, poches de glace, enveloppements humides, ...), elles ne sont pas forcément plus efficaces et ne seront envisagées que si elles

augmentent le mal être de l'enfant.

ne pas trop chauffer la pièce (environ 20-25 °C).

le

cas

de

la

re

ac

re

re