

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

229292

**Maladie**

**Dentaire**

**Optique**

**Autres**

Matricule :

2175

Société :

RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

BENNIS Abdeslam

Date de naissance :

04/09/1950

Adresse :

39 Route AÏT MOUR résidence Yasmine

Tél. :

0661196048

Total des frais engagés :

3215,70

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

05 SEP. 2020  
DR BENKIRANE MED JALIL  
33 BD. AÏTAOUIJATE - CASA

Date de consultation :

Mr BENNIS Abdeslam

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Dr Ben Ab Jil

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 05/09/2020

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
05 SEP 2022			300,14	300,14
05 SEP 2022			250,00	250,00

EXECUTION DES ORDONNANCES


Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
ANFA SUPERIOR	05/09/22	1145,70

ANALYSES - RADIGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE REGATTO Casablanca	06.09.22	1520,01	


Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT  
MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
	00000000	00000000
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
B		

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DES TRAVAUX

MONTANTS  
DES SOINS

DEBUT  
D'EXECUTION

FIN  
D'EXECUTION

COEFFICIENT  
DES TRAVAUX

MONTANTS  
DES SOINS

DATE DU  
DEVIS

DATE DE  
L'EXECUTION

# الدكتور محمد جليل بنكيران Docteur M.J BENKIRANE

Spécialiste en Hépato Gastro Entérologie

Diplômé de la faculté de médecine de Paris

Ancien attaché au CHU Bichat (Paris) et à l'Hôpital de Poissy

Diplômé en endoscopie digestive et interventionnelle

Diplômé en échographie digestive

Diplômé en nutrition

Membre de la Société Française d'Hépato Gastro Entérologie



اختصاصي في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والبواسر  
مجاز بكلية الطب بباريس

ملحق سابق بمستشفيات باريس

مجاز الكشف بالمنظار

مجاز الكشف بالتلفرة

مجاز في وقاية وعلاج أمراض التغذية

عضو الجمعية الفرنسية للجهاز الهضمي والتهاب الكبد

Casablanca, le : 05/09/2022

MR BENNIS ABDESLAM

46,90 x 3

• Acticarbine 70 mg

1 Comprimé, matin et soir, pendant 3 mois

60,60 x 3

• Meteospasmyl

1 Capsule, matin midi et soir, avant repas, pendant

123,60 x 6



• Inexium 40 mg

1 Comprimé, soir, après repas, pendant 3 mois

142,20

→ Fortrans

1 sachets par litre fois 4 à débuter la veille de la coloscopie à 14h



Dr. BENKIRANE MED JALIL  
HEPATO GASTRO ENTEROLOGUE  
13, Bd. Aïn Taoujتate - CASA

13, Bd Ain Taoujتate (en face clinique Badr) Rés Iliass Appt N°3, 2<sup>ème</sup> Étage - Quartier Bourgogne

Casablanca - Anfa - Tél : 05 22 27 03 53

13 شارع عين ثوجطاث مقابل مصحة بدر إقامة إلياس، شقة رقم 3 الطابق الثاني - حي بوركون

الدارالبيضاء - أنفا - الهاتف : 05 22 27 03 53

E-mail: faxcabinetbenkirane@gmail.com

**NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR  
FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet**

Pour les médicaments à large thérapeutique étroite ou à grande étendue d'efficacité.

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

• • •  
Avertissez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. (Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.)

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

**Que contient cette notice?**

1. Qu'est-ce que FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet?
3. Comment prendre FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?**

Laxatif cosmétique - code ATC: A05A0B5 (A : appareil digestif et métabolisme). Ce médicament permet le lavage colique assurant la préparation des patients ayant une exploration médicale ou une intervention chirurgicale.

FORTRANS appartient à un groupe de médicaments appelés laxatifs osmotiques contenant du macrogol (polyéthylène glycol ou PEG) à poids moléculaire élevé et des sels sodiés. FORTRANS permet d'augmenter la quantité d'eau dans l'intestin, ce qui augmente la fréquence des selles dont le contenu devient de plus en plus liquide; et, à terme, provoque un lavage de l'intestin.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'PRENDRE FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet?**

**Ne prenez jamais FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet:**  
Si vous êtes allergique au macrogol 4000 ou au sulfate de sodium ou au bicarbonate de sodium, ou au chlorure de sodium ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament et mentionnés en rubrique 6.

Si vous présentez une altération grave de l'état général telle qu'une déshydratation sévère ou une atteinte cardiaque sévère (insuffisance cardiaque).  
Si vous présentez un des problèmes digestifs suivants:

Un gonflement de stade aigu ou autre atteinte grave du colon entraînant une fragilité de la muqueuse très importante.

**Grossesse et allaitement**  
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou que vous êtes enceinte ou que vous alliez, si vous pensez être enceinte, consultez à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

**FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet contient:**

**3. COMMENT PRENDRE FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet?**  
Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les recommandations du pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. FORTRANS doit être administré par voie orale et doit être diluée chez l'adulte. La dose recommandée est de 1 litre de solution pour 15 à 20 kg de poids moyen de 3 à 4 litres de solution recombinée. Chaque sachet doit être dissout dans 1 litre d'eau. Mélangez jusqu'à ce que la poudre dissoute. Une fois la poudre dissoute, la solution doit être absorbée sans délai. Chaque sachet (1 litre) contient 100 g de FORTRANS, peut être ingéré soit en une prise (3 à 4 litres) soit en deux prises (2 litres le soir avant le repas, 1 à 2 litres le matin de l'après-matin de l'entraînement).

Selon la prescription de votre médecin, vous devez boire un verre de 250 ml d'eau fraîche 15 minutes.

Vous devez avoir fini d'ingérer la solution au moins 3 ou 4 heures avant le début de l'entraînement.

**Si vous avez pris plus de FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet et si vous avez de la diarrhée**

Si vous pensez que vous avez pris plus de FORTRANS, que vous n'auriez dû, buvez suffisamment d'eau ou de liquide pour éviter de vous déshydrater.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Après avoir pris ce médicament, vous aurez des envies fréquentes d'aller à la selle. Ceci est normal et montre que le médicament est en train d'agir. Restez à proximité de toilettes jusqu'à ce que les effets du médicament s'arrêtent.

Informez votre médecin immédiatement et arrêtez de prendre FORTRANS si vous ressentez les effets suivants:

ou de la gorge ou une difficulté à respirer ou par un malaise sévère avec chute de la pression artérielle, (choc anaphylactique).

• Les effets indésirables indiqués:

○ Très fréquent (chez plus d'1 patient sur 10):  
Nauseas, douleurs abdominales et distension (gonflement) abdominale.

○ Fréquent (chez 1 à 5 patients sur 10):  
Vomissements.

Fréquence indéterminée (peut être estimée sur la base des données disponibles): Autres réactions allergiques: éruption cutanée et urticaire.

**maphar**

Boulevard Alcibiade n°68  
Zaier Industriel Sidi Bernoussi Casablanca - Maroc

**FORTRANS SAC B4**

P.P.V. : 142,20 DH



6118001181209

Ex : 102204  
LOT : U22427

# MeteoSpasmyl®

## Capsule molle - Boite de 20 Citrate d'alvérine et Siméticone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
3. Comment prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver METEOSPASMYL, capsule molle ?

taires.

METEOSPASMYL®  
aliments, b  
Sans objet

Grossesse

Grossesse

Il est préfér

pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que METEOSPASMYL ait un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASMYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

### 3. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL, capsule molle ?

Posologie

1 capsule molle

1 à 2 fois par jour

15 à 30 minutes avant les repas

**METEOSPASMYL® B 20 caps molles**  
Alvérine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg  
P.P.V. : 40,40 DH  
Distribué par COOPER PHARMA  
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca

6 110001 100293



# MeteoSpasmyl®

## Capsule molle - Boite de 20 Citrate d'alvérine et Siméticone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
3. Comment prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver METEOSPASMYL, capsule molle ?

taires.

METEOSPASMYL®  
aliments, b  
Sans objet

Grossesse

Grossesse

Il est préfér

pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que METEOSPASMYL ait un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASMYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

### 3. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL, capsule molle ?

Posologie

1 capsule molle

1 à 2 fois par jour

15 à 30 minutes avant les repas

**METEOSPASMYL® B 20 caps molles**  
Alvérine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg  
P.P.V. : 40,40 DH  
Distribué par COOPER PHARMA  
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca

6 110001 100293

# MeteoSpasmyl®

## Capsule molle - Boite de 20 Citrate d'alvérine et Siméticone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
3. Comment prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver METEOSPASMYL, capsule molle ?

taires.

METEOSPASMYL®  
aliments, b  
Sans objet

Grossesse

Grossesse

Il est préfér

pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que METEOSPASMYL ait un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASMYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

### 3. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL, capsule molle ?

Posologie

1 capsule molle

1 à 2 fois par jour

15 à 30 minutes avant les repas

**METEOSPASMYL® B 20 caps molles**  
Alvérine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg  
P.P.V. : 40,40 DH  
Distribué par COOPER PHARMA  
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca

6 110001 100293



# INexium 20 mg, comprimés

# INexium 40 mg, comprimés

ésoméprazole

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubir bneu al aouam roches

noires casablanca

INEXIUM

O

40 mg

Boite 14

Cpr GR

641/150MP/21NRQ

P.P.V: 123,60 DH

6 118001 020607

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont similaires aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
- Comment prendre INexium
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver INexium
- Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

##### Adultes

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée *"Helicobacter pylori"*. Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

##### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée *"Helicobacter pylori"*.

# INexium 20 mg, comprimés

# INexium 40 mg, comprimés

ésoméprazole

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubir bneu al aouam roches

noires casablanca

INEXIUM

O

40 mg

Boite 14

Cpr GR

641/150MP/21NRQ

P.P.V: 123,60 DH

6 118001 020607

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont similaires aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
- Comment prendre INexium
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver INexium
- Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

##### Adultes

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée *"Helicobacter pylori"*. Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

##### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée *"Helicobacter pylori"*.

# INexium 20 mg, comprimés

# INexium 40 mg, comprimés

ésoméprazole

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubir bneu al aouam roches

noires casablanca

INEXIUM

O

40 mg

Boite 14

Cpr GR

641/150MP/21NRQ

P.P.V: 123,60 DH

6 118001 020607

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont similaires aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
- Comment prendre INexium
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver INexium
- Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

##### Adultes

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée *"Helicobacter pylori"*. Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

##### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée *"Helicobacter pylori"*.

# INexium 20 mg, comprimés

# INexium 40 mg, comprimés

ésoméprazole

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubir bneu al aouam roches

noires casablanca

INEXIUM

O

40 mg

Boite 14

Cpr GR

641/150MP/21NRQ

P.P.V: 123,60 DH

6 118001 020607

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont similaires aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
- Comment prendre INexium
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver INexium
- Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

##### Adultes

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée *"Helicobacter pylori"*. Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

##### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée *"Helicobacter pylori"*.

# INexium 20 mg, comprimés

# INexium 40 mg, comprimés

ésoméprazole

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubir bneu al aouam roches

noires casablanca

INEXIUM

O

40 mg

Boite 14

Cpr GR

641/150MP/21NRQ

P.P.V: 123,60 DH

6 118001 020607

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont similaires aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
- Comment prendre INexium
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver INexium
- Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

##### Adultes

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée *"Helicobacter pylori"*. Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

##### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée *"Helicobacter pylori"*.

# INexium 20 mg, comprimés

# INexium 40 mg, comprimés

ésoméprazole

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubir bneu al aouam roches

noires casablanca

INEXIUM

O

40 mg

Boite 14

Cpr GR

641/150MP/21NRQ

P.P.V: 123,60 DH

6 118001 020607

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont similaires aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
- Comment prendre INexium
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver INexium
- Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

##### Adultes

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée *"Helicobacter pylori"*. Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

##### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-œsophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée *"Helicobacter pylori"*.

Spécialiste en Hépato Gastro Entérologie

Diplômé de la faculté de médecine de Paris

Ancien attaché au CHU Bichat (Paris) et à L'hôpital de Poissy

Diplômé en endoscopie digestive et interventionnelle

Diplômé en échographie digestive

Diplômé en nutrition

Membre de la Société Française d'Hépato Gastro Entérologie



اختصاصي في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والبواسر

مجاز بكلية الطب بباريس

ملحق سابق بمستشفيات باريس

مجاز الكشف بالمنظار

مجاز الكشف بالتلفزة

مجاز في وقاية وعلاج أمراض التغذية

عضو الجمعية الفرنسية للجهاز الهضمي والتهاب الكبد

Casablanca, le : 05/09/2022

Cher(e) ami(e)

*Merci de voir en consultation pré anesthésie*

*Mr BENNIS ABDESLAM*

Qui présente des douleurs abdominale rebelle en vu de réaliser une fibroscopie coloscopie

Dr. BENKIRANE MED JALIL  
HEPATO GASTRO ENTEROLOGUE  
13, BD. AÏN TAOUJTA - CASA

---

13, Bd Ain Taoujta ( en face clinique Badr) Rés Iliass Appt N°3, 2<sup>ème</sup> Etage - Quartier Bourgogne

Casablanca - Anfa - Tél : 05 22 27 03 53

13 شارع عين ثوجطاث مقابل مصحة بدر إقامة إلیاس، شقة رقم 3 الطابق الثاني - حي بوركون

الدار البيضاء - أنفا - الهاتف : 05 22 27 03 53

E-mail: faxcabinetbenkirane@gmail.com

Spécialiste en Hépato Gastro Entérologie

Diplômé de la faculté de médecine de Paris

Ancien attaché au CHU Bichat (Paris) et à l'hôpital de Poissy

Diplômé en endoscopie digestive et interventionnelle

Diplômé en échographie digestive

Diplômé en nutrition

Membre de la Société Française d'Hépato Gastro Entérologie

اختصاصي في أمراض الكبد والجهاز الهضمي وال بواسر

مجاز بكلية الطب بباريس

ملحق سابق بمستشفيات باريس

مجاز الكشف بالمنظار

مجاز الكشف بالتلوزة

مجاز في وقاية وعلاج أمراض التغذية

عضو الجمعية الفرنسية للجهاز الهضمي والتهاب الكبد



Casablanca, le : 05/09/2022

**MR BENNIS ABDESLAM**

- NFS Plq
- Glycémie à jeun
- Cholésterol T HDL LDL
- ALAT ASAT γGT
- Ac urique
- TP TCA
- Férritinémie
- Vit D2/D3 (25 Hydroxy-vit D)
- Urée Crétatine
- PSA totale
- Triglycérides
- Hb Glycosylé



Dr. BENKIRANE MED JALIL  
HEPATO GASTRO ENTEROLOGUE  
13, BD. AIN TAOUJTA - CASA

13, Bd Ain Taoujta (en face clinique Badr) Rés Iliass Appt N°3, 2<sup>ème</sup> Étage - Quartier Bourgogne

Casablanca - Anfa - Tél : 05 22 27 03 53

13 شارع عين ثوجطاث مقابل مصحة بدر إقامة إيلاس، شقة رقم 3 الطابق الثاني - حي بوركون

الدار البيضاء - أنفا - الهاتف 05 22 27 03 53

E-mail: faxcabinetbenkirane@gmail.com



# مختبر التحاليل الطبية الرغراي

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES REGRAGUI

S. MESTASSI

Biologiste Diplomé de la faculté  
De Médecine et de Pharmacie  
de Clermont Ferrand

**FACTURE N° : 2209062016**

Casablanca le 06-09-2022

**Mr Abdeslam BENNIS**

Date de l'examen : 06-09-2022

INPE :




Caisse : **MUPRAS**

Analyses :

Récapitulatif des analyses				
CN	Analyse	Clé	Clé	Total
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	E11.5	E	11.50 MAD
0100	Acide urique	B30	B	26.70 MAD
0111	Créatinine	B30	B	26.70 MAD
0106	Cholestérol total	B30	B	26.70 MAD
0154	Ferritine	B250	B	222.50 MAD
0141	Gamma glutamyl transférase ( GGT)	B50	B	44.50 MAD
0118	Glycémie	B30	B	26.70 MAD
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B	89.00 MAD
0216	Numération formule	B80	B	71.20 MAD
0361	PSA	B300	B	267.00 MAD
0239	Temps de céphaline: TCK	B40	B	35.60 MAD
0236	Taux de prothrombine	B40	B	35.60 MAD
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B	44.50 MAD
0147	Transaminases P (TGP)	B50	B	44.50 MAD
0134	Triglycérides	B60	B	53.40 MAD
0135	Urée	B30	B	26.70 MAD
0439	Vitamine D	B450	B	400.50 MAD
0110	Cholestérol HDL+ L D L	B80	B	71.20 MAD
				<b>Total 1524.50 MAD</b>

TOTAL DOSSIER : 1520DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : mille cinq cent vingt dirhams



# CLINIQUE JERRADA OASIS



090061078

CASABLANCA Le : 07-09-2022

## Facture N° 16476/22

### A. Identification

N° Dossier : CJO22I07103125

N° Identifiant : 043451/21

**Nom & Prénom : M. BENNIS ABDESLAM**

C.I.N : B18268

Adresse : CASA

Médecin traitant : DR . MAKAYSSI RAKIA


Qté	Prestations	Observation	Prix U.	L.C.	Coef	Total
<b>PARTIE CLINIQUE :</b>						
<b>HONORAIRES MEDICAUX</b>						
1	DR. MAKAYSSI RAKIA (ANESTHESIE-REANIMATION)		250,00			250,00
<b>PARTIE HONORAIRES ET ACTES EXTERNES :</b>						
						<b>Total Rubrique :</b>
						250,00
						<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>
						250,00

Arrêté la présente facture à la somme de :

DEUX CENT CINQUANTE DIRHAMS

Arrêté la présente facture à la somme de la part organisme de :

  
signature de l'assuré



S. MESTASSI  
Biologiste Diplôme de la faculté  
De Médecine et de Pharmacie  
de Clermont Ferrand



Né (e) le: 04-02-1950, âgé (e) de : 72 ans  
Enregistré le: 06-09-2022 à 09:00  
Édité le: 06-09-2022 à 12:40  
Prélèvement : au labo  
Le : 06-09-2022 à 09:11

Mr Abdeslam BENNIS

Référence : 2209062016

Prescrit par : Dr BENKIRANE Mohammed Jalil

## HEMATOCYTOLOGIE

### Numération formule sanguine (Cytométrie en flux et Impédance Beckman Coulter)

18-02-202

Hématies	5.36	10 <sup>6</sup> /mm <sup>3</sup>	(4.50-6.20)	5.38
Hémoglobine	16.5	g/dl	(13.0-16.6)	17.0
Hématocrite	50.0	%	(40.0-52.0)	50.4
- VGM	93	fL	(80-98)	94
- TCMH	31	pg	(27-33)	32
- CCMH	33	g/dl	(32-36)	34
Leucocytes	8 700	/mm <sup>3</sup>	(4 000-10 000)	9 800
Polynucléaires Neutrophiles	64.8	%		70.0
Soit	5 638	mm <sup>3</sup>	(1 800-7 500)	6 888
Polynucléaires Eosinophiles	2.8	%		0.9
Soit	244	/mm <sup>3</sup>	(0-700)	88
Polynucléaires Basophiles	0.0	%		0.0
Soit	0	/mm <sup>3</sup>	(0-200)	0
Lymphocytes	27.3	%		21.7
Soit	2 375	/mm <sup>3</sup>	(1 000-4 000)	2 127
Monocytes	5.1	%		7.0
Soit	444	/mm <sup>3</sup>	(100-1 000)	696
Plaquettes	225	10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>	(150-500)	227
VPM	8.1	fl	(6.0-12.0)	8.3



Enregistré le: 06-09-2022 à 09:00  
Edité le: 06-09-2022 à 12:40  
Prescrit par : Dr BENKIRANE Mohammed Jalil

**Mr Abdeslam BENNIS**

Né (e) le : 04-02-1950, âgé (e) de : 72 ans  
Référence : **2209062016**

## **HEMOSTASE**

### **Taux de prothrombine** (Satellite/ Stago)

		18-02-2021
Temps de Quick patient	13.9 sec.	13.9
TP	92 %	(>70) 93
Ratio patient/ témoin	1.05	(<1.20) 1.05

### **Temps de céphaline active** (Satellite/ Stago)

	18-02-2021
TCA patient	31 sec 33
TCA Ratio patient/ témoin	1.03 (<1.20) 1.10





Né (e) le: 04-02-1950, âgé (e) de : 72 ans  
Enregistré le: 06-09-2022 à 09:00  
Édité le: 06-09-2022 à 12:40  
Prélèvement : au labo  
Le : 06-09-2022 à 09:11

## Mr Abdeslam BENNIS

Référence : 2209062016

Prescrit par : Dr BENKIRANE Mohammed Jalil

## BIOCHIMIE SANGUINE

(Cobas c311/AU 480)


25-08-2021

## Glycémie à jeûn

1.23 g/l (0.70–1.10)  
6.8 mmol/l (3.9–6.1)

1.2.

6.




25-08-2021

## Hémoglobine glycosylée (HPLC /D10.Biora)

6.4 % (3.5–6.3)

6.



### *Interprétation:*


<i>Interprétation:</i>	
<i>Glycémie proche de la normale</i>	: 6.7
<i>Bon contrôle</i>	: 7-8
<i>Métabolisme mal équilibré</i>	: >8

12-01-202

### Urée sanguine

0.41 g/l (0.17–0.71)  
6.83 mmol/l (2.83–11.83)

0.4  
6.8



Compte rendu imprimé en **recto verso** ; prière de tourner la page si nécessaire

Page 3 sur 7

Enregistré le: 06-09-2022 à 09:00  
 Edité le: 06-09-2022 à 12:40  
 Prescrit par : Dr BENKIRANE Mohammed Jalil

Mr Abdeslam BENNIS

Né (e) le : 04-02-1950, âgé (e) de : 72 ans  
 Référence : 2209062016


12-01-2022

Créatinine sanguine (RC)  
 (Technique enzymatique)

17.2 mg/l  
 153 µmol/l

(7.2-12.0)  
 (64-107)

12:  
 107



DFG par CKD EPI

38.9 ml/min

(>60.0)

60.3

Acide Urique sanguin (RC)

82 mg/l  
 489 µmol/l

(35-72)  
 (209-429)

25-08-2020

Cholestérol total


2.60 g/l  
 6.71 mmol/l

(1.20-2.00)  
 (3.10-5.16)

2.42  
 6.24

Interprétation:

Recommandé : <2.00 g/L  
 Limite supérieure : 2.00 – 2.39 g/L  
 Élevé : >ou= 2.40 g/L



25-08-2020

Cholestérol HDL

0.48 g/l  
 1.23 mmol/l

(>0.35)  
 (>0.90)

0.45  
 1.16

Rapport CT/HDL  
 (Athérogénicité du cholestérol)

5.42

(<5.00)

5.38

Cholestérol LDL


1.71 g/l  
 4.41 mmol/l

25-08-2020

1.56  
 4.02

Optimal : <1 g/L  
 Presque optimal : 1-1.29 g/L  
 Limite supérieur : 1.3-1.59 g/L  
 Élevé : 1.6-1.89 g/L  
 Très élevé : >ou= 1.9 g/L





# مختبر التحاليل الطبية الرگراگي

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES REGRAGUI

S. MESTASSI  
Biologiste Diplôme de la faculté  
De Médecine et de Pharmacie  
de Clermont Ferrand



Né (e) le: 04-02-1950, âgé (e) de : 72 ans  
Enregistré le: 06-09-2022 à 09:00  
Edité le: 06-09-2022 à 12:40  
Prélèvement : au labo  
Le : 06-09-2022 à 09:11

**Mr Abdeslam BENNIS**

Référence : 2209062016

Prescrit par : Dr BENKIRANE Mohammed Jalil

Le niveau du LDL sera interprété en fonction du niveau de risque cardio-vasculaire global évalué à l'aide de la table SCORE ou des facteurs de risque cardio-vasculaire (HAS, février 2017)

Rapport LDL/HDL

**3.56**

(<3.55)

3.47

	Faible	Modéré	Élevé	Très élevé
Niveau de risque cardio-vasculaire	SCORE < 1%	-Diabète type 1 ou 2 < 40 ans ni atteinte organe cible -SCORE > ou = 1 - <5%	-IRC (30-59 ml/min) -TA > 180/110 mmHg -Diabète type 1 ou 2 sans FRCV ni atteinte des organes cibles si < 40 ans -SCORE > ou = 5 - <10%	-Diabète type 1 ou 2 avec atteinte d'organe cible ou au moins un FRCV, si < 40 ans -IRC sévère (15 à 29 ml/min) - SCORE > ou = 10%
Objectifs thérapeutiques	Mesure hygiéno-diététiques <b>Cible LDL &lt; 1.9 g/l ou 4.9 mmol/l</b>	Mesure hygiéno-diététiques+ médicament(s) <b>cible LDL &lt; ou = 1.30 g/l ou 3.4 mmol/l</b>	Mesures hygiéno-diététiques + médicament(s) <b>cible LDL &lt; ou = 1 g/l ou 2.6 mmol/l</b>	Mesures hygiéno-diététiques+médicament(s) <b>Cible LDL &lt; ou = 0.7 g/l ou 1.8 mmol/l</b>

25-08-2020

Triglycérides

**2.05 g/l**

(<1.50)

**2.34 mmol/l**

(<1.71)

2.06

2.35


Interprétation :

Normal : <1.50 g/L

Limite supérieur : 1.50 – 1.99 g/L

Elevé : 2.00 – 4.99 g/L

Très élevé : >ou= 5.00 g/L



09-12-2020

Transaminase ASAT / SGOT

**15 UI/l**

(<40)


Enregistré le: 06-09-2022 à 09:00  
Edité le: 06-09-2022 à 12:40  
Prescrit par : Dr BENKIRANE Mohammed Jalil

## Mr Abdeslam BENNIS

Né (e) le : 04-02-1950, âgé (e) de : 72 ans  
Référence : 2209062016

Transaminases ALAT / GPT 18 UI/l (<41)

09-12-2020  
Gamma Glutamyl-Transferase 38 UI/l (10-71) 56  
(Test colorimétrique enzymatique Roche)





Ferritine 192.0 ng/ml  
(Immunoturbidimétrie)

Changement de technique le : 02/09/2022

## MARQUEURS TUMORAUX

25-08-2020  
P.S.A totale 1.67 µg/l (<6.40) 1.30  
(Chimiluminescence)





S. MESTASSI  
Biologiste Diplôme de la faculté  
De Médecine et de Pharmacie  
de Clermont Ferrand



Né (e) le: 04-02-1950, âgé (e) de : 72 ans  
Enregistré le: 06-09-2022 à 09:00  
Édité le: 06-09-2022 à 12:40  
Prélèvement : au labo  
Le : 06-09-2022 à 09:11

Mr Abdeslam BENNIS

Référence : 2209062016

Prescrit par : Dr BENKIRANE Mohammed Jalil


## VITAMINOLOGIE

09-12-2022

Vitamine D2/D3 (25 OHD)  
(Chimiluminescence CLIA Diasorin)

42.9 nmol/l (75.0-250.0)  
17.2 ng/ml (30.0-100.0)

29.  
11.



Valeurs souhaitables : 75-250 nmol/l  
Insuffisance : 25-75 nmol/l  
Carence : < 25 nmol/l  
Possibilité intoxication : > 375 nmol/l

(RC) : Résultat contrôlé



# CLINIQUE JERRADA OASIS

PAIEMENT EFFECTUE PAR : . BENNIS  
ABDESLAM

NOM DU PATIENT : M. BENNIS ABDESLAM  
DATE DE NAISSANCE : 04/02/1950  
CJO22I07103125



Reçu N°: 121966

Paiement du 07/09/2022 10h45

Actes	
Montant	250,00 Dh
Numéro de compte	445439****2990
Nom de propriétaire	. BENNIS ABDESLAM
Type de paiement	TPE