

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

1207

Société :

RAM

29769

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

FATIHA Abdellatif

Date de naissance :

1/1/1952

Adresse :

HAY EL QADIS PRES FIFIATR 10 BNI BOURG

Tél. :

062066278  
0632258237

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

16/08/2029

Age :

Nom et prénom du malade :

FATIHA d YAMI

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

LISTE DES ACTES ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/10/2024	Consultation	1	300 DH	

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE LA MÉDAILLE Résidence Al Boustan 2 Rue "I" Mg 1 Casablanca	16/08/22	3.96,52

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b>				Coefficient des travaux
$  \begin{array}{r}  H \quad 25533412 \quad 21433552 \\  D \quad 00000000 \quad 00000000 \\  \hline  B \quad 35533411 \quad 11433553  \end{array}  $				Montants des soins
<b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				Date du devis
				Date de l'exécution

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION**

Centre Brésilien de Chirurgie Esthétique et Laser

Dr. Lahliou Mohamed Amine

Chirurgie Esthétique, Plastique, Brûlés et Laser

Diplômé de Paris VI

Attaché à l'Institut Ivo Pitanguy à Rio de Janeiro



المركز البرازيلي للجراحة التجميلية والعلاج بالبليز  
الدكتور لحلو محمد محمد أمين

طبيب جراح متخصص في الجراحة التجميلية والتقويمية والعروق والعلاج بالبليز  
خريج بباريس VI وريو دي جانيرو

ORDONNANCE

Casablanca Le :

16/08/2022

Pour Mme Diyani Fatiha  
22.557.18

11 I stacqne -  
1 cp matin et 1 cp le soir  
Quantité suffisante pour  
03 mois -



T = 396.00

MANAQUE LA MISSION  
Résidence Al Boustan 2  
Mm 1<sup>er</sup> Mg 1 Casablanca  
0522 255 455 06 63 88 14 48

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille

- Enfant de moins de 8 ans, en raison de la denture.

- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera.

- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> mois.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'émail

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'émail

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'émail

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'œil

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'œil chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'émail

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'émail

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'érythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'érythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'émail

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'œil

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'œil chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'émail

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'émail

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'émail

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'émail

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'émail

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'œil

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'œil chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'émail

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'émail

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'œil

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'œil chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

# ISTACYNE

## Doxycycline

• Comprimés  
Boîte de 10

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) Composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

Doxycycline..... 100 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

Doxycycline..... 200 mg

Excipients..... q.s. pour un comprimé

#### b) Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c) Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophthalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponémies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitements prophylactiques post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille
- Enfant de moins de 8 ans, en raison dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. intera
- Chez la femme enceinte à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.


Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde

En raison des risques de photosensibilisation

pendant le traitement qui doit être interrompu

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes



lents et d'hypoplasie de l'œil

Allaitement.

ion directe au soleil et aux UV

s cutanées à type d'erythème.

/ les conditions d'administration.

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'œil chez l'enfant au-dessous de 8 ans.
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite, candidoses anogénitales).
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes, favorisées par la prise en position couchée, et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réactions de photosensibilisation, très rares cas d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,