

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 84.99

Société : RAM Hassan

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

BOUHMAMI DRISS

199722

Date de naissance :

3/12/1963

Adresse :

Res. Al. Boustane II, F. n° 6, Apt. 20, 4^e étage
Bennoussi Casablanca

Tél. : 0613856914

Total des frais engagés : 2541 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 19/08/2022

Nom et prénom du malade : Dr. IFTAYE ZAHRA

Age : 57 ans

Lien de parenté : Lui-même Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 16/09/2022

Signature de l'adhérent(e) : Dr. IFTAYE ZAHRA



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	16/08/22	1519,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Analyses Médicales YAFI EL KHARIFI Amal Bek Ben Boumber Hammoud N°52-54 Boulevard Sidi El Khoussi Casablanca 75 86 77 Fax : 05 23 76 10 10	10/05/12	3600	200.00

AUXILIAIRES MEDICALS

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODP.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Fatima zahra IFTAHY
Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie et
Maladies métaboliques
Diplômée de la Faculté de Médecine
de Casablanca
Ancienne résidente du CHU Ibn Rochd
de Casablanca



الدكتورة فاطمة الزهراء

افتاحي

أخصائية في أمراض الغدد ، داء السكري
وأمراض الأيض
خريجة كلية الطب بالدار البيضاء ،
طبيبة مقيمة سابقًا بالمستشفي الجامعي ابن رشد
بالدار البيضاء

Ordonnance

Casablanca, le

16/10/2028 الدار البيضاء ، في

ame Daif Fayda

W19.0093

①

Forxipé 10mg

50

3

لـ زاهي دلتيم

②

Diclofamine 20mg

5

3
ml

1 - 1 - 1 au milieu Rep

③

fly 5 hydrolin

5

(10.)

Dr. IFTAHY F. ZAHRA
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Maladies Métaboliques
Av. Mouktar Garnaoui Imm 39 N° 2
1er Etg. Hay Saada Sidi Bernoussi
Tél. : 0520 95 69 44 - 0520 95 69 44
Cell. : 0520 95 69 44 - 0520 95 69 44

④

Tdexium 20mg

1.00 (1ml)

5

16/10/2028
Résidence LA MANSOUR
Casablanca
N° 200 741 200
Résidence LA MANSOUR
Al Boustane 200
N° 200 741 200
Résidence Garnaoui Imm 39
Mg 1 Casablanca
N° 200 741 200

شارع مختار الكروانى عمارة رقم 39 شقة رقم 2 الطابق الأول حي السعادة البرنوسي - الدار البيضاء
Avenue Moukhtar Garnaoui Imm 39 Appt N° 2, 1er étage, Hay Saada Sidi Bernoussi, Casablanca
Tél. : +(212) 520 986 543 Gsm. : +(212) 707 741 613 الهاتف : E-mail : dr.iftahy@gmail.com

DIAFORMINE® 850 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine 850,00 mg
Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'examens de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas: par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé au repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour sans interruption sauf recommandation particulière du médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

CONTRE-INDICATIONS

DIAFORMINE 850mg, comprimé pelliculé NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine ou à l'un des constituants du produit,
- en cas de déséquilibre du diabète avec acido-cétose,
- si vous avez une insuffisance rénale même si elle est modérée (défaillance des reins avec augmentation de la créatinine dans le sang),
- en cas de maladies infectieuses avec fièvre élevée (infection broncho-pulmonaire, infection urinaire),
- pendant les 2 jours qui suivent une opération chirurgicale ou un examen radiologique utilisant des produits radiographiques iodés,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire,
- si vous avez une insuffisance hépatique (défaillance du foie),
- en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés,
- en cas de consommation importante de boissons alcool,
- pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, crampes musculaires ou de malaise général avec sensa déséquilibre grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre mé

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament

Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les ins

déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessite

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention comme une maladie cardiaque, informez le médecin que

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste, demandez à votre médecin de ne pas prendre ce médicament pendant au moins 48 heures avant l'examen et de ne pas le reprendre



Si vous avez des symptômes de l'insuline, vous devrez peut-être prendre moins de cet examen et de ne pas le reprendre

que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.



DIAFORMINE® 850 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine 850,00 mg
Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'examens de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas: par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé au repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour sans interruption sauf recommandation particulière du médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

CONTRE-INDICATIONS

DIAFORMINE 850mg, comprimé pelliculé NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine ou à l'un des constituants du produit,
- en cas de déséquilibre du diabète avec acido-cétose,
- si vous avez une insuffisance rénale même si elle est modérée (défaillance des reins avec augmentation de la créatinine dans le sang),
- en cas de maladies infectieuses avec fièvre élevée (infection broncho-pulmonaire, infection urinaire),
- pendant les 2 jours qui suivent une opération chirurgicale ou un examen radiologique utilisant des produits radiographiques iodés,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire,
- si vous avez une insuffisance hépatique (défaillance du foie),
- en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés,
- en cas de consommation importante de boissons alcool,
- pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, crampes musculaires ou de malaise général avec sensa déséquilibre grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre mé

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament

Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les ins

déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessite

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention comme une maladie cardiaque, informez le médecin que

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste, demandez à votre médecin de ne pas prendre ce médicament pendant au moins 48 heures avant l'examen et de ne pas le reprendre



Si vous avez des symptômes de l'insuline, vous devrez peut-être prendre moins de cet examen et de ne pas le reprendre

que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.



DIAFORMINE® 850 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine 850,00 mg
Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'examens de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas: par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé au repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour sans interruption sauf recommandation particulière du médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

CONTRE-INDICATIONS

DIAFORMINE 850mg, comprimé pelliculé NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine ou à l'un des constituants du produit,
- en cas de déséquilibre du diabète avec acido-cétose,
- si vous avez une insuffisance rénale même si elle est modérée (défaillance des reins avec augmentation de la créatinine dans le sang),
- en cas de maladies infectieuses avec fièvre élevée (infection broncho-pulmonaire, infection urinaire),
- pendant les 2 jours qui suivent une opération chirurgicale ou un examen radiologique utilisant des produits radiographiques iodés,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire,
- si vous avez une insuffisance hépatique (défaillance du foie),
- en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés,
- en cas de consommation importante de boissons alcool,
- pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, crampes musculaires ou de malaise général avec sensa déséquilibre grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre mé

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament

Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les ins

déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessite

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention comme une maladie cardiaque, informez le médecin que

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste, demandez à votre médecin de ne pas prendre ce médicament pendant au moins 48 heures avant l'examen et de ne pas le reprendre



DIAFORMINE® 850 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine 850,00 mg
Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'examens de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas: par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé au repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour sans interruption sauf recommandation particulière du médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

CONTRE-INDICATIONS

DIAFORMINE 850mg, comprimé pelliculé NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine ou à l'un des constituants du produit,
- en cas de déséquilibre du diabète avec acido-cétose,
- si vous avez une insuffisance rénale même si elle est modérée (défaillance des reins avec augmentation de la créatinine dans le sang),
- en cas de maladies infectieuses avec fièvre élevée (infection broncho-pulmonaire, infection urinaire),
- pendant les 2 jours qui suivent une opération chirurgicale ou un examen radiologique utilisant des produits radiographiques iodés,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire,
- si vous avez une insuffisance hépatique (défaillance du foie),
- en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés,
- en cas de consommation importante de boissons alcool,
- pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, crampes musculaires ou de malaise général avec sensa déséquilibre grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre mé

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament

Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les ins

déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessite

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention comme une maladie cardiaque, informez le médecin que

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste, demandez à votre médecin de ne pas prendre ce médicament pendant au moins 48 heures avant l'examen et de ne pas le reprendre



Si vous avez des symptômes de l'insuline, vous devrez peut-être prendre moins de cet examen et de ne pas le reprendre



DIAFORMINE® 850 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine 850,00 mg
Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'examens de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas: par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé au repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour sans interruption sauf recommandation particulière du médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

CONTRE-INDICATIONS

DIAFORMINE 850mg, comprimé pelliculé NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine ou à l'un des constituants du produit,
- en cas de déséquilibre du diabète avec acido-cétose,
- si vous avez une insuffisance rénale même si elle est modérée (défaillance des reins avec augmentation de la créatinine dans le sang),
- en cas de maladies infectieuses avec fièvre élevée (infection broncho-pulmonaire, infection urinaire),
- pendant les 2 jours qui suivent une opération chirurgicale ou un examen radiologique utilisant des produits radiographiques iodés,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire,
- si vous avez une insuffisance hépatique (défaillance du foie),
- en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés,
- en cas de consommation importante de boissons alcool,
- pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, crampes musculaires ou de malaise général avec sensa déséquilibre grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre mé

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament

Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les ins

déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessite

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention comme une maladie cardiaque, informez le médecin que

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste, demandez à votre médecin de ne pas prendre ce médicament pendant au moins 48 heures avant l'examen et de ne pas le reprendre



DIAFORMINE® 850 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine 850,00 mg
Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'examens de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas: par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé au repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour sans interruption sauf recommandation particulière du médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

CONTRE-INDICATIONS

DIAFORMINE 850mg, comprimé pelliculé NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine ou à l'un des constituants du produit,
- en cas de déséquilibre du diabète avec acido-cétose,
- si vous avez une insuffisance rénale même si elle est modérée (défaillance des reins avec augmentation de la créatinine dans le sang),
- en cas de maladies infectieuses avec fièvre élevée (infection broncho-pulmonaire, infection urinaire),
- pendant les 2 jours qui suivent une opération chirurgicale ou un examen radiologique utilisant des produits radiographiques iodés,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire,
- si vous avez une insuffisance hépatique (défaillance du foie),
- en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés,
- en cas de consommation importante de boissons alcool,
- pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, crampes musculaires ou de malaise général avec sensa déséquilibre grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre mé

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament

Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les ins

déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessite

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention comme une maladie cardiaque, informez le médecin que

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste, demandez à votre médecin de ne pas prendre ce médicament pendant au moins 48 heures avant l'examen et de ne pas le reprendre



Si vous avez des symptômes de l'insuline, vous devriez immédiatement arrêter de prendre ce médicament et vous faire soigner par un médecin.



DIAFORMINE® 850 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine 850,00 mg
Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Il peut parfois être prescrit chez les patients diabétiques traités par l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'examens de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas: par exemple, 1 comprimé au petit déjeuner et 1 comprimé au repas du soir si la posologie est de 2 comprimés par jour.

Ce médicament doit être pris chaque jour sans interruption sauf recommandation particulière du médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

CONTRE-INDICATIONS

DIAFORMINE 850mg, comprimé pelliculé NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine ou à l'un des constituants du produit,
- en cas de déséquilibre du diabète avec acido-cétose,
- si vous avez une insuffisance rénale même si elle est modérée (défaillance des reins avec augmentation de la créatinine dans le sang),
- en cas de maladies infectieuses avec fièvre élevée (infection broncho-pulmonaire, infection urinaire),
- pendant les 2 jours qui suivent une opération chirurgicale ou un examen radiologique utilisant des produits radiographiques iodés,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire,
- si vous avez une insuffisance hépatique (défaillance du foie),
- en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés,
- en cas de consommation importante de boissons alcool,
- pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, crampes musculaires ou de malaise général avec sensa déséquilibre grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre mé

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament

Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les ins

déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessite

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention comme une maladie cardiaque, informez le médecin que

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste, demandez à votre médecin de ne pas prendre ce médicament pendant au moins 48 heures avant l'examen et de ne pas le reprendre





Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que MYCOHYDRALIN®, crème et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser MYCOHYDRALIN®, crème ?
3. Comment utiliser MYCOHYDRALIN®, crème ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MYCOHYDRALIN®, crème ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE MYCOHYDRALIN®, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTIFONGIQUE LOCAL

(G : Système génito-urinaire et hormones sexuelles)

Ce médicament est indiqué dans le traitement des atteintes vulvaires des mycoses vulvo-vaginales à levures sensibles (infections dues à des champignons microscopiques). Ce médicament est réservé à l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MYCOHYDRALIN®, crème ?

Contre-indications

N'utilisez jamais MYCOHYDRALIN®, crème dans les cas suivants :
• Allergie (hypersensibilité) aux dérivés imidazolés ou à l'un des autres constituants mentionnés dans la rubrique « Informations supplémentaires »

Mises en garde et précautions d'emploi

Faites attention avec MYCOHYDRALIN® crème :

- Eviter l'application près des yeux.
- En cas d'application sur une peau lésée, respecter impérativement les recommandations et la posologie indiquée par votre médecin en raison de la pénétration du produit dans ces circonstances.
- Si vous présentez l'un des symptômes suivants, avant ou au cours de l'utilisation de MYCOHYDRALIN®, veuillez demander conseil à votre médecin :
 - o fièvre, nausées, vomissement,
 - o douleurs abdominales basses,
 - o douleurs au dos ou aux épaules,
 - o sécrétions vaginales accompagnées de mauvaises odeurs,
 - o hémorragie vaginale.

3. COMMENT UTILISER MYCOHYDRALIN®, crème ?

Mode et voie d'administration :

Ne pas avaler.

Le produit doit être utilisé 2 fois par jour après une toilette soigneuse et séchage des lésions à traiter.

Durée du traitement :

La durée du traitement est de 1 semaine.

L'utilisation régulière du produit pendant toute la durée du traitement est déterminante pour la réussite du traitement.

Si les symptômes persistent au-delà de 7 jours, une consultation médicale doit être envisagée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, MYCOHYDRALIN®, crème est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Urticaire, rash, prurit, irritations, brûlures, œdème ;
- Syncope, hypotension, dyspnée ;
- Inconfort au niveau génital.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5. COMMENT CONSERVER MYCOHYDRALIN®, crème ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur.

Pas d'exigences particulières.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés.

Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient MYCOHYDRALIN®, crème ?

La substance active est : Clotrimazole.....1,0 g Pour 100 g de crème.

Les autres composants sont :

Stéarate de sorbite, polysorbate 60, palmitate de cétyle, alcool cétostéarylique, octyldécanol, alcool benzylique, eau purifiée.

Qu'est-ce que MYCOHYDRALIN®, crème et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de crème en tube de 30 g.

Titulaire

BAYER SA

Bd Sidi

Tou

200

Lot N° :

La d
18 D

Con

a) Qu

Les r

muq

vagin

Candic

l'organ

prolifera

EXP :

PPV
36,00

Fabricant

aboratoires Pfizer SA
m 0500, Route de Oualidia
P 24000-35 EL jadida
laroc

La a été approuvée est le

gionale?

fections fréquentes des
es de la femme (vulve et
n champignon nommé
turellement présent dans
peuvent provoquer une
n et entraîner une infection.

P101325

10 جم (پ)
5 جم (پ)



Maphar

Bd Alkimia N° 6, QI,
Sidi Bernoussi, Casablanca

Forxiga 10 mg cp pell b28
P.P.V : 419,00 DH



6 118003 185023



P101325

Forxiga® 5mg
Forxiga® 10mg
Comprimés
pelliculés
dapagliflozine

P101325

10 جم (پ)
5 جم (پ)



Maphar

Bd Alkimia N° 6, QI,
Sidi Bernoussi, Casablanca

Forxiga 10 mg cp pell b28
P.P.V : 419,00 DH



6 118003 185023



P101325

Forxiga® 5mg
Forxiga® 10mg
Comprimés
pelliculés
dapagliflozine

P101325

10 جم (پ)
5 جم (پ)



Maphar

Bd Alkimia N° 6, QI,
Sidi Bernoussi, Casablanca

Forxiga 10 mg cp pell b28

P.P.V : 419,00 DH



6 118003 185023



P101325

Forxiga® 5mg
Forxiga® 10mg
Comprimés
pelliculés
dapagliflozine

**INEXIUM® 20 mg,
comprimé gastro-résistant
ésoméprazole**



**إينكسيوم® 20 ملخ ،
قرص صامد لحموضة
المعدة
ازومبرازول**

SYNTHEMEDIC
22 rue zoubair bniou el souam roches
noires casablanca
INEXIUM

20 mg Cpr GR

Boîte 14

64015DMP/21/NRQ R.P.V: 82,10 DH



6 118001 020591

AstraZeneca

Docteur Fatima zahra IFTAHY

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie et

Maladies métaboliques

Diplômée de la Faculté de Médecine

de Casablanca

Ancienne résidente du CHU Ibn Rochd

de Casablanca



الدكتورة فاطمة الزهراء

إفتاحي

أخصائية في أمراض الغدد، داء السكري

وأمراض الأيض

خرسچة كلية الطب بالدار البيضاء

طبيبة مقيمة سابقاً بمستشفى الجامعي ابن رشد

بالدار البيضاء

٨٢١٥٨١٢٠٢٢

BILAN

Daf
Foujic

- Glycémie à jeun
- Hémoglobine glyquée
- Triglycérides
- Cholestérol total, HDL, LDL
- Uricémie
- Urée, créatinine
- ASAT/ALAT
- Bilirubine totale, BL, BC
- NFS-PlQ
- Ferritinémie
- CRP
- PSA
- Vit D2/D3
- Calcémie
- Parathormone
- Albuminémie, Protidémie
- Phosphorémie
- Calciurie de 24h
- ECBU
- Microalbuminurie 24h
- Protéinurie de 24h

- TSH
- T4L
- T3L
- Ac anti TPO
- Ac anti récepteurs TSH
- Ac anti thyroglobuline
- Thyroglobuline Ultrasensible
- Calcitonine
- Cortisol libre urinaire
- Cortisolémie de 8h
- FSH LH
- Testostéronémie Oestradiol
- IGF1
- Prolactinémie
- 17 OH Progestérone
- Dérivés méthoxylés urinaires
- Aldostéronémie
- Activité rénine plasmatique
- Ac anti GAD Ac anti IA2
- Peptide C Insulinémie
- Ac anti transglutaminases

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFA
Dr EL KHAFIF Amal
Tél: 05 22 75 86 77 Fax: 05 22 76 84 39
Aboabekr Ben Boubker Hammadi N° 52 - 54
Rue Sayyid Ben Zayd 34 Casablanca



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFÀ

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif

Pharmacienne Biologiste

د.أمال الخفيف

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Patente : 31606078 - IF : 53000550 - CNSS . 2064872 - ICE : 001540529000093

FACTURE N° : 220800798

Casablanca le 13-08-2022

Mme DAIF Fouzia

Demande N°: 2208130027

Date de l'examen : 13-08-2022

INPE
0930034440 / 0930034440
INPE

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
PS	Prélèvement	E10	E
B106	Cholestérol total	B30	B
B110	Cholestérol HDL+LDL	B80	B
B111	Créatinine	B30	B
B118	Glycémie	B30	B
B119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
B134	Triglycérides	B50	B
B135	Urée	B30	B
B154	Ferritine	B250	B

Total des B : 600

Total dossier: 700.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :
sept cents dirhams

Laboratoire d'Analyses Médicales YAFÀ
Dr EL KHAFF Amal
Bd Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52 - 54
Hay Al Qods Sidi El Bernoussi Casablanca
Tel : 05 22 75 86 77 Fax : 05 22 76 84 39

تاریخ اجراء التحاليل
غير قابل للتغيير

أوقات العمل : من الإثنين إلى الجمعة : 7h30 - 18h30 / السبت 7h30 - 14h أخذ العينات في المنزل بالميعاد

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 18h30 / Samedi : 7h30 - 14h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Mousbara Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يafa للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES Yafa

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د. أمال الخفيف رمذانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 13-08-2022
Edition : 13-08-2022

Mme DAIF Fouzia

Code Patient 2111160055 Référence : 2208130027

Prescripteur : Dr IFTAHY Fatima ZAHRA

Page : 3/3

Ferritin
(ECLIA Cobas e411)

269.1 ng/mL

(20.0-200.0)

460.2

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement et livraison de 7h30 à 17h00 Valide par Dr. AMAL EL KHAFIF

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubarak Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com



Laboratoire Autorisé N°: 26050

مختبر يafa للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES Yafa

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د. أمان الخفيف رمضانى

Pharmacienne Biologiste

Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 13-08-2022
Edition : 13-08-2022

Mme DAIF Fouzia

Code Patient 2111160055 Référence : 2208130027

Prescripteur : Dr IFTAHY Fatima ZAHRA

Page : 2/3


HbA1c

(HPLC-TOSOH)
<6:Niveau non diabétique
<7:Équilibré
>8:Action à entreprendre

7.0 %

(4.0-6.0)

7.0



Cholestérol total
(colorimétrique Cobas C311)

2.06 g/L
5.23 mmol/L

(1.54-2.01)
(3.98-5.20)

1.91

HDL-Cholestérol
(Enzymatique Cobas C311)

0.60 g/L
1.55 mmol/L

17-05-2022

0.53

LDL-Cholestérol (direct)

(Enzymatique Cobas C311)

1.25 g/L
3.23 mmol/L

(<1.00)
(<2.59)

1.15

Indications du traitement médical selon les recommandations de l'AFFSAPS:

- En l'absence de facteur de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 2,0 g/l (5,7 mmol/l) ;
- En présence d'un facteur de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 1,90 g/l (4,9 mmol/l) ;
- En présence de deux facteurs de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 1,60 g/l (4,1 mmol/l) ;
- En présence de plus de deux facteurs de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 1,30 g/l (3,4 mmol/l) ;
- En présence d'antécédents de maladie cardiovasculaire avérée ou de risques équivalents, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être <à 1 g/l (2,6 mmol/l).

Triglycérides
(Enzymatique Cobas C311)

1.37 g/l
1.56 mmol/L

(<1.50)
(<1.71)

17-05-2022

1.22

17-05-2022

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Validé par : Dr Amal EL KHAFIF

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Mousbaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com



مختبر يافا للتحاليل الطبية

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YAFÀ

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE - HORMONOLOGIE

Dr. Amal El Khafif Ramdani

د. أمال الخفيف رمذانى

Pharmacienne Biologiste
Diplômée de l'Université de Granada-Espagne

Prélèvement du : 13-08-2022
Edition : 13-08-2022

Mme DAIF Fouzia

Code Patient 2111160055 Référence : 220E130027

Prescripteur : Dr IFTAHY Fatima ZAHRA

Page : 1/3

BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE


17-05-2022

Glycémie à jeun
(Hexokinase G6PD-H Cobas C311)

1.36 g/L
7.55 mmol/L

(0.65-1.10)
(3.61-6.11)

1.38



Urée
(Enzymatique Cobas C311)

0.30 g/l
5.00 mmol/l

(0.20-0.50)
(3.33-8.33)

0.28

Créatinine
(Cinétique Cobas C311)


6.6 mg/L
58.4 µmol/L

(5.0-11.0)
(44.3-97.4)

17-05-2022

17-05-2022

6.9



17-05-2022

Horaire continu : du Lundi au Vendredi : 7h30 - 17h00 / Samedi : 7h30 - 13h Prélèvement à domicile Dr Amal El KHAFIF

Bd. Mbarek Ben Boubker Hammadi N° 52-54, Moubaraka Hay Al Qods Sidi El Bernoussi - Casablanca

Tél. : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39 - E-mail : laboyafa@hotmail.com

Dr Amal El KHAFIF
Laboratoire d'Analyses Médicales YAFÀ
Casablanca - Maroc
Tél. : 05 22 75 86 77 / Fax : 05 22 76 84 39
E-mail : laboyafa@hotmail.com