

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

M22- 0010257

129716


☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5230 Société : RAM
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : SAADOUNI Jaber
 Date de naissance : 01-01-1953
 Adresse : Rue 5 n° 36, Résidence ATTADAMOUNE
 EL OULFA, Casablanca
 Tél. : 0675263663 Total des frais engagés : 905,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 19/08/22
 Nom et prénom du malade : SAADOUNI JABER Age :
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie :
 Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Signature de l'adhérent(e) : Le : 05/09/2022

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019



EXPERT ASSERMENT PRES LES TRIBUNAUX
Diplômé de l'Université de Montpellier 1

PREVENTION ET DEPISTAGE EN GYNÉCOLOGIE

ECHOGRAPHIE

خبير محلف لدى المحاكم
خريج جامعة مونتبيلي 1
الفحص بالصدى



Casablanca, le :


19708722

SAADOUNI Jaber

432.00

- Valeur :

288.00



Gabrine M (P.N)

18 gélules au coucher.



687.00



Ordonnance

Dr. CHAFIK Fouad
MEDECIN EXPERT
Bd. Oued Oum Errebii Rue 69
N° 4 - Oulfa - CASABLANCA
Tél.: 05 22 90 51 65

Le 05/09/22

SAADOUNI Jaber

68,60

- Héparine



CV 23

PHARMACIE NAGUIB
Dr Naguib Nadia
334, Bd Oued Daoura
Oulfa - Casablanca
Tél.: 05 20 00 25 95

Dr. CHAFIK Fouad
MEDECIN EXPERT
Bd. Oued Oum Errebii Rue 69
N° 4 - Oulfa - CASABLANCA
Tél.: 05 22 90 51 65

HEPANAT®

le dieci erbe

Composition par comprimé de 400 mg :

Rhamnus purshiana écorce 85,4 mg. Jus d'aloë ferox 64 mg. Foeniculum vulgare graines 53,4 mg. Cassia angustifolia feuilles 42,7 mg. Glycyrrhiza glabra racine 16 mg. Gentiana lutea racine 16 mg. Taraxacum officinale racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg. Rheum palmatum racine 10,7 mg. Marrubium vulgare sommités fleuries 10,7 mg. Maltodextrine ; agent de charge : Cellulose microcristalline ; antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium ; agents de revêtement : Hydroxypropylméthylcellulose, acides gras, cellulose microcristalline.

Propriétés :

Confort digestif et intestinal.

Conseils d'utilisation :

2 à 4 comprimés par jour.

Précautions d'emploi :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse.

Présentations :

- Boîte de 20 comprimés.
- Boîte de 40 comprimés.

Tenir hors de la portée des enfants.

Conserver le produit dans un endroit sec à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE, CE N'EST PAS UN MÉDICAMENT

Produit Fabriqué par **ESI srl**
Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV) ITALY
www.esi.it

Importé et Distribué par **ESNAPHARM** - 7, Rue Abdelmajid Benjelloun
Maârif extension - Casablanca

SYSTÈME DE GESTION QUALITÉ
CERTIFIÉ ISO 9001:2015
PAR CERTIQUALITY

ENOHNV020-002

N° d'enregistrement : 20211112158/MAv4/DMP/CA/18



Notice : Information de l'utilisateur
GABLINE® 25 mg, 75 mg, 150 mg et 300 mg.
Gélules. Boîte de 56.
Prégabaline

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que GABLINE, gélule et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GABLINE, gélule ?
3. Comment prendre GABLINE, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GABLINE, gélule ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE GABLINE, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

GABLINE appartient à une classe de médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, les douleurs neuropathiques et le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte.

Douleurs neuropathiques périphériques et centrales : GABLINE est utilisé pour traiter les douleurs persistantes causées par des lésions des nerfs. Différentes pathologies comme le diabète ou le zona peuvent induire des douleurs neuropathiques périphériques. Les manifestations douloureuses peuvent être décrites comme étant des sensations de chaleur, de brûlure, de douleur lancinante, d'élanement, de coup de poignard, de douleur fulgurante, de crampes, d'endolorissement, de picotements, d'engourdissement, de pincements et de coups d'aiguille. Les douleurs neuropathiques périphériques et centrales peuvent aussi être associées à des changements de l'humeur, des troubles du sommeil, de la fatigue, et peuvent avoir un impact sur le fonctionnement physique et social, et sur la qualité de vie en général.

Épilepsie : GABLINE est utilisé pour traiter un type particulier d'épilepsie (crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire) chez l'adulte. Votre médecin vous prescrira GABLINE pour aider à traiter votre épilepsie lorsque votre traitement actuel ne permet pas de contrôler complètement vos crises. Vous devez prendre GABLINE en association à votre traitement actuel. GABLINE ne doit pas être utilisé seul, mais doit toujours être utilisé en association à un autre traitement antiepileptique.

Trouble Anxieux Généralisé : GABLINE est utilisé pour traiter le Trouble Anxieux Généralisé (TAG). Les symptômes du TAG comportent une anxiété excessive prolongée et une inquiétude difficiles à contrôler. Le TAG peut également induire une agitation ou une sensation d'excitation ou d'énervement, une sensation d'être facilement fatigué, des difficultés à se concentrer ou des trous de mémoire, une irritabilité, une tension musculaire ou des troubles du sommeil. Ceci est différent du stress et des tensions de la vie quotidienne.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE GABLINE, gélule ?

Ne prenez jamais GABLINE, gélule :

Si vous êtes allergique à la prégabaline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Faites attention avec GABLINE, gélule :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre GABLINE.

- Quelques patients prenant GABLINE ont fait état de symptômes évocateurs d'une réaction allergique. Il s'agissait d'un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge ainsi que d'un rash cutané diffus. Contactez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un de ces réactions.
- GABLINE a été associé à des étourdissements et de la somnolence, pouvant augmenter la survenue de blessures accidentelles (chutes) chez les patients âgés. Vous devez par conséquent être prudent jusqu'à ce que vous soyez habitué aux éventuels effets que le médicament pourrait produire.
- GABLINE peut faire apparaître une vision trouble ou une perte de la vue ou d'autres modifications de la vue, la plupart desquelles étant transitoires. Informez immédiatement votre médecin si vous observez une quelconque modification de votre vision.
- Une adaptation des médicaments utilisés en cas de diabète peut être nécessaire chez certains patients diabétiques qui ont pris du poids lors d'un traitement sous prégabaline.
- Certains effets indésirables peuvent être plus fréquents, notamment la somnolence, car les patients présentant une lésion de la moelle épinière peuvent recevoir d'autres médicaments, destinés à traiter par exemple la douleur ou la spasticité, qui ont des effets indésirables similaires à ceux de la Prégabaline et dont la sévérité peut être augmentée lorsque ces traitements sont pris en même temps.
- Des cas d'insuffisance cardiaque ont été rapportés chez certains patients prenant GABLINE; ces patients étaient pour la plupart âgés et présentaient des problèmes cardiovasculaires. **Avant de prendre ce médicament, vous devez informer votre médecin si vous avez déjà eu des maladies cardiaques dans le passé.**
- Des cas d'insuffisance rénale ont été rapportés chez certains patients prenant GABLINE. Si au cours de votre traitement par GABLINE, vous observez une diminution de votre miction, vous devez informer votre médecin car l'arrêt de votre traitement peut améliorer ces troubles.
- Un petit nombre de personnes traitées avec des antiepileptiques tels que GABLINE ont eu des idées autodestructrices ou suicidaires. Si de telles pensées venaient à apparaître, à tout moment, contactez immédiatement votre médecin.
- Des problèmes gastro-intestinaux peuvent apparaître (p.ex. constipation, transit intestinal bloqué ou paralysé) lorsque GABLINE est utilisé avec d'autres médicaments pouvant entraîner une constipation (tels que certaines classes de médicaments contre la douleur). Informez votre médecin si vous souffrez de constipation, en particulier si vous êtes sujet à ce problème.
- Avant de prendre ce médicament vous devez informer votre médecin si vous avez des antécédents d'alcoolisme, d'abus de médicament ou de dépendance. Ne prenez pas davantage de médicaments que la dose prescrite.
- Des cas de convulsions ont été rapportés lors de la prise de GABLINE ou peu après l'arrêt du traitement. En cas de convulsions, contactez votre médecin immédiatement.
- Des cas de modification de la fonction cérébrale (encéphalopathie) ont été rapportés chez certains patients prenant GABLINE et présentant des facteurs favorisants. Prévenez votre médecin en cas d'antécédents médicaux graves y compris les maladies du foie ou des reins.

Enfants et adolescents

La sécurité d'emploi et l'efficacité chez les enfants et les adolescents (moins de 18 ans) n'a pas été établie. La prégabaline ne doit donc pas être utilisée dans cette population.

Autres médicaments et GABLINE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez

récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. GABLINE peut interagir avec d'autres médicaments, c'est-à-dire qu'il peut avoir une influence sur d'autres médicaments et inversement. Pris avec certains médicaments qui ont des effets sédatifs (y compris les opioïdes), GABLINE peut potentialiser ces effets et pourrait entraîner une insuffisance respiratoire, le coma et le décès. L'intensité des étourdissements, de la somnolence et de la diminution de la concentration peut être augmentée si GABLINE est pris en même temps que des médicaments contenant :
 • de l'oxycodone – (utilisé pour traiter la douleur)
 • du lorazépam – (utilisé pour traiter l'anxiété)
 • de l'alcool.

GABLINE peut être pris en même temps que les contraceptifs oraux.

GABLINE avec des aliments, des boissons et de l'alcool

Les gélules de GABLINE peuvent être prises au moment ou en dehors des repas.

La prise simultanée de GABLINE et d'alcool n'est pas recommandée.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

GABLINE ne doit pas être pris pendant la grossesse ou l'allaitement, sauf avis contraire de votre médecin. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une méthode contraceptive efficace. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

GABLINE peut entraîner des étourdissements, de la somnolence et une diminution de la concentration. Vous ne devez ni conduire, ni utiliser des machines complexes, ni vous engager dans des activités potentiellement dangereuses jusqu'à ce qu'il soit déterminé si ce médicament affecte votre aptitude à exercer de telles activités.

GABLINE, gélule contient du lactose monohydraté. Si vous avez

été informé par votre médecin que vous présentez une maladie héréditaire responsable d'une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

GABLINE 75 mg, gélule contient un agent colorant azoïque (Jaune

orangé - S (E110)) et peut provoquer des réactions allergiques.

3. COMMENT PRENDRE GABLINE, gélule ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin déterminera la posologie qui convient dans votre cas. GABLINE est destiné à la voie orale uniquement.

Douleurs neuropathiques périphériques et centrales, épilepsie ou Trouble Anxieux Généralisé :

- Prenez le nombre de gélules prescrit par votre médecin.
- La dose habituelle, qui a été adaptée à vous et à votre état, est comprise entre 150 mg et 600 mg par jour.
- Votre médecin vous dira si vous devez prendre GABLINE deux fois ou trois fois par jour. En cas de deux prises par jour, prenez GABLINE une fois le matin et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour. En cas de trois prises par jour, prenez GABLINE une fois le matin, une fois le midi et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de GABLINE est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous êtes un patient âgé (de plus de 65 ans), vous devez prendre GABLINE normalement sauf en cas de maladie des reins.

Votre médecin peut vous prescrire un horaire de prise et/ou une dose différente en cas de maladie des reins.

Avalez la gélule entière avec de l'eau.

Continuez à prendre GABLINE jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter.

نشرة : معلومات للمستعمل

غابلين® 25 ملغ، 75 ملغ، 150 ملغ و 300 ملغ.
كبسولات. علبة من فئة 56.
بريقابالين

يرجى الإطلاع على هذه النشرة بأكملها قبل تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة من أجلكم.
- احتفظوا بهذه النشرة. فقد تحتاجون إلى قراءتها من جديد.
- إذا كانت لديكم أسئلة أخرى، أطلبوا المزيد من المعلومات من طبيبك أو من صيدليكم.
- لقد تم وصف هذا الدواء لكم بشكل شخصي. لا تقوموا بإعطائه لأشخاص آخرين، لأنه قد يتسبب في الضرر لهم حتى في حال وجود أعراض مشابهة لأعراضكم.
- إذا أصبحت بعض التأثيرات غير المرغوب فيها خطيرة أو إذا لاحظتم أي تأثير غير مرغوب فيه غير مدرج في هذه النشرة، فالمرجو إخبار طبيبك أو الصيدلاني.

ما هو محتوى هذه النشرة ؟

1. ما هو غابلين. كبسولة و ما هي دواعي استعماله ؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول غابلين. كبسولة ؟
3. كيف يجب استعمال غابلين. كبسولة ؟
4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة ؟
5. كيف يجب حفظ غابلين. كبسولة ؟
6. معلومات إضافية.

1. ما هو غابلين. كبسولة و ما هي دواعي استعماله ؟

ينتمي غابلين إلى مجموعة من الأدوية المستخدمة لعلاج الصرع. آلام اعتلال الأعصاب و اضطراب القلق العام (TAG) عند البالغ.

آلام اعتلال الأعصاب المحيطية و المركزية : يُستخدم غابلين لعلاج الآلام المستمرة الناجمة عن تلف في الأعصاب. هناك مجموعة متنوعة من الأمراض يمكن أن تسبب آلام اعتلال الأعصاب المحيطية، مثل مرض السكري أو واء الهربس النطاقي. يمكن وصف ظهور الآلام بأنه إحساس بالسخونة، بالحرق، بالرمح، بالتم برقي، بالطنع، بالتم حاد، بشد عضلي، بإحساس قوْل، بإحساس بالوخز، بتخدير، بالبرص ووخز الإبر، و يمكن أن ترتبط آلام اعتلال الأعصاب المحيطية و المركزية أيضاً بتغيرات في المزاج، باضطرابات النوم، بالإرهاق، و يمكن أن يكون لها تأثير على الأداء الجسدي و الاجتماعي، و على نوعية الحياة عموماً.

الصرع : يُستخدم غابلين لعلاج نوع معين من الصرع (نوبات الصرع الجزئية مع أو بدون تعميم ثانوي) عند البالغ. سوف يصف لكم طبيبك غابلين للمساعدة في علاج الصرع عندما يكون علاجكم الحالي غير كافي للسيطرة على نوبات الصرع التي تعانون منها. يجب تناول غابلين بلوادة مع علاجكم الحالي. لا يُستخدم غابلين لوحده، بل يتوجب تناوله دائماً مع علاج آخر مضاد للصرع.

اضطراب القلق العام : يُستخدم غابلين لعلاج اضطراب القلق العام (TAG)، تشمل أعراض اضطراب القلق العام قلقاً مفرطاً لفترات طويلة و تورط يصعب السيطرة عليه. قد يسبب اضطراب القلق العام أيضاً احتياج الأشخاص للإشارة أو الإنفعال. الشعور بسهولة بالإرهاق، صعوبة في التركيز أو النسيان، تهيج، تورع عضلي أو اضطرابات في النوم، هذا يختلف مع الإجهاد والضغط في الحياة اليومية.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول غابلين. كبسولة ؟

لا تتناولوا أبداً غابلين. كبسولة :
إذا كنتم تعانون من الحساسية مادة بريغابالين أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في الفقرة 6).

ينبغي توخي الحذر عند تناول غابلين. كبسولة:
استشيروا طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول غابلين.
* أفيد لدى بعض المرضى الذين يتناولون غابلين عن ظهور أعراض تشير إلى حدوث حساسية، تشمل هذه الأعراض انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان والحلق وكذلك ظهور طفح جلدي منتشر. اتصلوا بطبيبكم على الفور إذا واجهتمكم أي من هذه الأعراض.
* قد تصاحب تناول غابلين دوخة ونعاس. قد يزيدان من احتمال حدوث إصابات مفاجئة (سقوط) عند المرضى المسنين. لذلك يجب عليكم توخي الحذر عند التعود على التأثيرات المحتملة التي قد تصاحب هذا الدواء.
* قد يسبب غابلين حدوث ضبابية في الرؤية أو فقدان للرؤية أو تغيرات أخرى في الرؤية. معظم هذه التغيرات مؤقتة، أخبروا طبيبك على الفور إذا لاحظتم أي تغيير في قدرتمكم على الرؤية.
* قد يكون التعديل في الأدوية المستخدمة في حالة مرض السكري ضروري عند بعض المرضى الذين يعانون من مرض السكري والذين اكتسبوا الوزن أثناء العلاج بريغابالين.

قد تكون بعض الآثار الجانبية أكثر شيوعاً، خاصة النعاس. لأن المرضى الذين يعانون من إصابة في النخاع الشوكي قد يتلقون أدوية أخرى، مثل مضادات الألم أو التقيؤ. والتي لها تأثيرات جانبية مماثلة لتأثيرات بريغابالين و يمكن أن تزداد حدتها عند تناولهما في نفس الوقت.
* تم الإبلاغ عن حالات قصور القلب عند بعض المرضى الذين يتناولون غابلين. هؤلاء المرضى كانوا في الغالب من كبار السن و لديهم مشاكل القلب و الأوعية الدموية. لذا يجب عليكم إخبار طبيبك قبل تناول هذا الدواء إذا كنتم في الماضي من أمة أمراض قلبية.
* تم الإبلاغ عن حالات من الفشل الكلوي عند بعض المرضى الذين يتناولون غابلين. إذا لاحظتم خلال علاجكم بـ غابلين، انخفاض في التبول، يجب عليكم إبلاغ طبيبك لأن إيقاف علاجكم قد يحسن هذه الاضطرابات.

سجلتم عند عدد محدود من المرضى الذين يعانون بمضادات الصرع مثل غابلين أفكار تدميرية ذاتية أو انتحارية. إذا راودتكم مثل هذه الأفكار في أي وقت، اتصلوا بطبيبكم على الفور.
* قد تظهر مشاكل الجهاز الهضمي (مثل الإمساك، السداد أو شلل الأمعاء) عند تناول غابلين مع أدوية أخرى مسيلة للإمساك (مثل بعض أنواع الأدوية المسكنة للألم)، أخبروا طبيبك إذا كنتم تعانون من الإمساك. خاصة إذا كنتم عرضة لهذه المشكلة.
* قبل تناول هذا الدواء يجب عليكم إخبار طبيبك إذا كان لديكم تاريخ من الإدمان على الكحول. إرفاق في استخدام الدواء أو الإدمان عليه. لا تأخذوا أكثر من الجرعة الموصوفة لكم من الدواء.

* تم الإبلاغ عن حالات اختلاجات أثناء تناول غابلين أو بعد فترة قصيرة من التوقف عن تناوله. في حال أصبتم باختلاجات، اتصلوا بطبيبكم على الفور.
* تم الإبلاغ عن حالات تغيير في وظيفة الدماغ (اعتلال دماغي) عند بعض المرضى الذين يتناولون غابلين و الذين لديهم عوامل مساهمة. أخبروا طبيبك في حالة وجود تاريخ مرضي خطير بما في ذلك أمراض الكبد أو الكلى.

الأطفال و المراهقون

لم تثبت السلامة والفعالية عند الأطفال و المراهقين (أقل من 18 عاماً). لا ينبغي إذن أن يستخدم بريغابالين عند هذه الفئة العمرية.

الأدوية الأخرى و غابلين

يرجى إخبار طبيبك أو الصيدلاني إذا كنتم تستعملون. إذا استعملتم مؤخراً أو قد تستعملون أي دواء آخر.
قد يتفاعل غابلين مع الأدوية الأخرى. أي قد يحصل تأثير على الأدوية الأخرى والعكس بالعكس. تناول غابلين بالتزامن مع بعض الأدوية التي لها آثار مهدنة (بما في ذلك أشباه الأفيونيات)، قد يزيد من هذه التأثيرات و قد يؤدي

إلى فشل الجهاز التنفسي، الغيبوبة و الموت. قد تزداد حدة الدوخة، النعاس وانخفاض التركيز إذا أخذ غابلين في نفس الوقت مع الأدوية التي تحتوي على:
أوكسيكودون - (يستخدم لعلاج الألم)
لورازيبام - (يستخدم لعلاج القلق)
الكحول.
يمكن تناول غابلين في نفس الوقت مع حبوب منع الحمل.

تناول غابلين مع الطعام، الشراب و الكحول
يمكن تناول كبسولات غابلين مع الطعام أو بدونه.
يوصى بعدم شرب الكحول أثناء تناول غابلين.

الاستعمال خلال الحمل و الرضاعة
يجب عدم تناول غابلين أثناء الحمل أو الرضاعة، إلا إذا أوصى طبيبك بخلاف ذلك. يجب على النساء في سن الإنجاب استخدام وسيلة فعالة لمنع الحمل إذا كنتم حاملاً أو مرضعة، إذا كنتم تعتقدن أنك حامل أو إذا كنتم تخططين للحمل. استشيروا طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول هذا الدواء.

التأثير على القدرة على قيادة السيارات أو تشغيل الآلات
قد يسبب غابلين الدوخة، النعاس وفلة التركيز. يجب عدم القيادة أو استخدام الآلات المعقدة أو القيام بأي أنشطة يحملن أن تكون خطيرة حتى تتأكدوا ما إذا كان هذا الدواء يؤثر على قدرتمكم على القيام بمثل هذه الأنشطة.

يحتوي غابلين. كبسولة على مونهدرات اللاكتوز. إذا أخبركم طبيبك بأن لديكم مرض وراثي يسبب عدم تحمل بعض السكريات، استشيروا طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي غابلين 75 ملغ. كبسولة على صياغ آزوي (أصفر برتقالي - س EE110) والذي يمكن أن يتسبب في حدوث تفاعلات حساسية.

3. كيف يجب استعمال غابلين. كبسولة ؟

تناولوا دائماً هذا الدواء بالاتباع التام لتعليمات طبيبك.
عليكم التحقق من طبيبك أو الصيدلاني في حالة الشك.
سيقوم الطبيب بتحديد الجرعة المناسبة لحالتكم.
غابلين مخصص للاستعمال عن طريق الفم فقط.

آلام اعتلال الأعصاب المحيطية و المركزية، الصرع أو اضطراب القلق العام :
تناولوا عدد الكبسولات المحدد من قبل طبيبك.
المزولة، المعتادة، التي تم تحديدها لكم و خالتكم، هي ما بين 150 ملغ و 600 ملغ في اليوم.
* سيخبركم طبيبك إذا كان يجب عليكم تناول غابلين مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، في حالة جرعتين في اليوم. يجب تناول غابلين مرة في الصباح و مرة في المساء، في نفس الوقت تقريباً كل يوم. في حالة ثلاث جرعات في اليوم. تناولوا غابلين مرة في الصباح، مرة في الظهر و مرة في المساء، في نفس الوقت تقريباً كل يوم.

إذا شعرت بأن تأثير غابلين أقوى أو أضعف من المطلوب، استشيروا طبيبك أو الصيدلاني.
إذا كنتم مرضاً مسبقاً (أكثر من 65 عاماً)، يجب عليكم تناول غابلين بشكل طبيعي إلا إذا كنتم تعاني من مشاكل في الكلى.
قد يصف لكم طبيبك نظام توقيت أخذ الجرعة و/أو جرعة مختلفة إذا كنتم تعانون من مرض في الكلى.
يجب بلع الكبسولة بأكملها بالماء.
استمروا في تناول غابلين حتى يطلب منكم طبيبك التوقف عن تناوله.

إذا تناولتم غابلين. كبسولة أكثر من ما يجب
اتصلوا بطبيبكم على الفور أو توجهوا إلى قسم المستعجلات بأقرب