

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|--|-----------------------|
| <input type="radio"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="radio"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="radio"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0012724

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3475 Société :

Actif Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :


Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 30/06/2012 Nom et prénom du malade : ESSMAÏL CHABRA Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Affection neuropsychiatre

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
30-06-2022	1	1	350 DH	Dr. RGUIBI L'USS Centre Adelbounien, Angle Bd. Attouai (O.D.F.) Casablanca - Tél. 05 22 52 00 42

Pharmacie ATTOUAI
Secteur El Kheir, Rue 1, N°64/45 Chouek
Abdelmoumen, et Bd. Attouai (O.D.F.) Casablanca - Tél. 05 22 52 00 42

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du fourisseur	Date	Montant de la Facture
	30/06/22	835.00 f

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient		
				Coefficient DES TRAVAUX	
				MONTANTS DES SOINS	
				DEBUT D'EXECUTION	
				FIN D'EXECUTION	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				
	H 25533412 00000000	21433552 00000000	G 35533411 11433553	B	Coefficient DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				MONTANTS DES SOINS
					DATE DU DEVIS
					DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr RGUIBI LOUAFI

Psychiatre

Diplômé de la Faculté
de médecine de Paris

Consultant, ancien chef service
et chef consultation au C.H.S. de Taïf

Centre Abdelmoumen - Angle Bd Abdelmoumen
et Bd Anoual (Derb Ghalef) - Casablanca
Tél.: 05.22.86.02.65 / 05.22.86.00.78

Sur Rendez-vous

الدكتور ركيبى الوفى

اختصاصي في الأمراض النفسية والعقلية

خريج كلية الطب بباريس

مستشار الطب النفسي

رئيس مصلحة ومدير العيادات

الخارجية بـ م.ص.ن. بالطائف (مطيف)



Casablanca, le 30-06-2022 الدار البيضاء، في

JESSMANI CHAKRA



~~50.00 +~~
~~25.00~~ D Aperitive 50 ml.

~~50.00 +~~
~~25.00~~ 1) Rd 12 n
~~50.00 +~~
2) Atlynil 30 mg.



~~23.00 +~~
~~16.00~~ 1) Rd 12 n
3) Elust a 17



0 - 0 - 1 / Rd 12 n

835,00

Dr. RGUIBI Louafi
- Psychiatre -
Centre Abdelmoumen, et Bd
Abdelmoumen - Casablanca - Tél. 05 22 86 02 65

ATHYMIL 30 mg

Comprimés pelliculés sécables - Boîte de 20
DCI : Chlorhydrate de mianséroline

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous quelqu'un d'autre, n'est pas nocif.

Si l'un des effets indésirables non mentionnés ci-dessous vous arrivez, contactez votre pharmacien.

1. Composition du médicament

Principe actif :

Chlorhydrate de mianséroline

Les excipients :

Amidon de pomme de terre, Silice colloïdale, Stéarate de magnésium, Méthylcellulose, Hydrogénophosphate de calcium, Hypromellose, Macrogol 8000 et Dioxyde de titane.

Excipients à effet notoire : Néant

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Ce médicament est un antidépresseur

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N06AX03

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement des épisodes dépressifs.

4. Posologie

Conformez-vous strictement à la prescription du médecin.

N'arrêtez pas votre traitement sans avis médical, même si vous ressentez une amélioration.

Votre médecin, dans certains cas, pourra adapter progressivement la posologie. Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé sécable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.

Avallez les comprimés avec un verre d'eau sans les croquer.

Fréquence d'administration

La dose quotidienne pourra être répartie au cours de la journée ou administrée de préférence le soir au coucher.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Durée de traitement

Le traitement est habituellement de plusieurs mois (de l'ordre de 6 mois).

Conformez-vous strictement à la prescription du médecin et n'arrêtez pas la prise de ce médicament sans son avis.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

5. Contre-indications

Ne prenez jamais ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé sécable :

- si vous êtes allergique à la mianséroline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique « composition ».

- maladie du foie sévère.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé dans les cas suivants, sauf avis contraire de votre médecin :

- association avec l'alcool (voir rubrique « interactions avec d'autres médicaments »).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

6. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- somnolence,

- sécheresse de la bouche,

• constipation.

Rarement:

- convulsions,

- prise de poids,

- douleurs articulaires,

- céderme (gonflement),

- douleurs musculaires,

- élévation des transaminases, du foie, fonction hépatique.

98,30



• idées suicidaires,

• hyperkinésie (hyperactivité motrice).

Par ailleurs, certains effets non souhaités sont possibles : état dépressif : possibilité de troubles psychiques.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice.

7. Mises en garde spéciales et précautions

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien si vous prenez un autre comprimé pelliculé sécable.

Mises en garde spéciales

Comme avec tous les antidépresseurs, l'absorption peut prendre jusqu'à plusieurs jours. Il est donc important de prendre régulièrement même en l'absence d'amélioration de l'état de santé.

Idées suicidaires et aggravation de votre état de santé

Si vous souffrez de dépression et/ou de trouble bipolaire, certaines idées d'auto-agression (agression envers soi-même) peuvent être majorées au début du traitement. Cela peut arriver car ce type de médicament n'agit pas toujours immédiatement ou au bout de quelques semaines ou plus de traitement.

Vous êtes plus susceptible de présenter ces types de comportements :

- si vous avez déjà eu des idées suicidaires,
- si vous êtes un jeune adulte. Les études sur le comportement suicidaire étaient accrues chez les personnes atteintes d'une maladie psychiatrique et traitées par antidepressifs.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'autodestruction, contactez immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital. Vous pouvez vous faire aider par un ami ou une personne proche. Si vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un état de santé mental, contactez votre pharmacien ou votre médecin. Vous pouvez lui demander de vous aider à gérer vos symptômes de dépression ou votre anxiété qui peuvent s'aggraver ou entraîner des idées suicidaires.

Utilisation chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans

ATHYMIL 30 mg doit habituellement pas être donné à des enfants de moins de 18 ans. Il est également important de savoir que les enfants de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets secondaires tels que pensées suicidaires et comportement suicidaire, comportement d'opposition et colère, lors de l'utilisation de ce médicament. Néanmoins, il est possible que certains patients de moins de 18 ans soient traités avec succès. Si votre pharmacien a prescrit ATHYMIL 30 mg à votre enfant, contactez-le immédiatement. Si vous avez des symptômes énumérés ci-dessous, contactez votre pharmacien ou votre médecin. Ces symptômes peuvent indiquer que la sécurité à long terme concernant le développement cognitif et comportemental de votre enfant est compromise.

ATHYMIL 30 mg

Comprimés pelliculés sécables - Boîte de 20
DCI : Chlorhydrate de mianséroline

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous quelqu'un d'autre, n'est pas nocif.

Si l'un des effets indésirables non mentionnés ci-dessous vous arrivez, contactez votre pharmacien.

1. Composition du médicament

Principe actif :

Chlorhydrate de mianséroline

Les excipients :

Amidon de pomme de terre, Silice colloïdale, Stéarate de magnésium, Méthylcellulose, Hydrogénophosphate de calcium, Hypromellose, Macrogol 8000 et Dioxyde de titane.

Excipients à effet notoire : Néant

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Ce médicament est un antidépresseur

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N06AX03

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement des épisodes dépressifs.

4. Posologie

Conformez-vous strictement à la prescription du médecin.

N'arrêtez pas votre traitement sans avis médical, même si vous ressentez une amélioration.

Votre médecin, dans certains cas, pourra adapter progressivement la posologie. Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé sécable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.

Avallez les comprimés avec un verre d'eau sans les croquer.

Fréquence d'administration

La dose quotidienne pourra être répartie au cours de la journée ou administrée de préférence le soir au coucher.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Durée de traitement

Le traitement est habituellement de plusieurs mois (de l'ordre de 6 mois).

Conformez-vous strictement à la prescription du médecin et n'arrêtez pas la prise de ce médicament sans son avis.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

5. Contre-indications

Ne prenez jamais ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé sécable :

- si vous êtes allergique à la mianséroline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique « composition ».

- maladie du foie sévère.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé dans les cas suivants, sauf avis contraire de votre médecin :

- association avec l'alcool (voir rubrique « interactions avec d'autres médicaments »).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

6. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- somnolence,

- sécheresse de la bouche,

• constipation.

Rarement:

- convulsions,

- prise de poids,

- douleurs articulaires,

- cédème (gonflement),

- douleurs musculaires,

- élévation des transaminases (enzymes) du foie, fonction hépatique.

98,30



• idées suicidaires,

• hyperkinésie (hyperactivité motrice).

Par ailleurs, certains effets non souhaités sont possibles : état dépressif : possibilité de troubles psychiques.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice.

7. Mises en garde spéciales et précautions

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien si vous prenez un autre comprimé pelliculé sécable.

Mises en garde spéciales

Comme avec tous les antidépresseurs, l'absorption peut prendre jusqu'à plusieurs jours. Il est donc important de prendre régulièrement même en l'absence d'amélioration de l'état de santé.

Idées suicidaires et aggravation de votre état de santé

Si vous souffrez de dépression et/ou de trouble bipolaire, certaines idées d'auto-agression (agression envers soi-même) peuvent être majorées au début du traitement. Cela peut arriver car ce type de médicament n'agit pas toujours immédiatement ou au bout de quelques semaines ou plus de traitement.

Vous êtes plus susceptible de présenter ces symptômes :

- si vous avez déjà eu des idées suicidaires,
- si vous êtes un jeune adulte. Les études sur le comportement suicidaire étaient accrues chez les personnes atteintes d'une maladie psychiatrique et traitées par antidepressifs.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'autodestruction, contactez immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital. Vous pouvez vous faire aider par un ami ou une personne proche. Si vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un état de santé mental, contactez votre pharmacien ou votre médecin. Vous pouvez lui demander de vous aider à gérer vos symptômes de dépression ou votre anxiété qui s'aggrave, ou de vous aider à gérer votre comportement.

Utilisation chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans

ATHYMIL 30 mg doit habituellement pas être donné à moins de 18 ans. Il est également important de savoir que les enfants et les adolescents de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets secondaires tels que pensées suicidaires et comportement suicidaire, comportement d'opposition et colère, lors de l'utilisation de certains médicaments. Néanmoins, il est possible que certains patients de moins de 18 ans soient traités avec succès par ATHYMIL 30 mg. Si votre pharmacien a prescrit ATHYMIL 30 mg à votre enfant ou adolescent, contactez-le immédiatement. Il peut être nécessaire de modifier la dose ou le régime de traitement.

ATHYMIL 30 mg

Comprimés pelliculés sécables - Boîte de 20
DCI : Chlorhydrate de mianséroline

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous quelqu'un d'autre, n'est pas nocif.

Si l'un des effets indésirables non mentionnés ci-dessous vous arrivez, contactez votre pharmacien.

1. Composition du médicament

Principe actif :

Chlorhydrate de mianséroline

Les excipients :

Amidon de pomme de terre, Silice colloïdale, Stéarate de magnésium, Méthylcellulose, Hydrogénophosphate de calcium, Hypromellose, Macrogol 8000 et Dioxyde de titane.

Excipients à effet notoire : Néant

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Ce médicament est un antidépresseur

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N06AX03

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement des épisodes dépressifs.

4. Posologie

Conformez-vous strictement à la prescription du médecin.

N'arrêtez pas votre traitement sans avis médical, même si vous ressentez une amélioration.

Votre médecin, dans certains cas, pourra adapter progressivement la posologie. Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé sécable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.

Avallez les comprimés avec un verre d'eau sans les croquer.

Fréquence d'administration

La dose quotidienne pourra être répartie au cours de la journée ou administrée de préférence le soir au coucher.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Durée de traitement

Le traitement est habituellement de plusieurs mois (de l'ordre de 6 mois).

Conformez-vous strictement à la prescription du médecin et n'arrêtez pas la prise de ce médicament sans son avis.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

5. Contre-indications

Ne prenez jamais ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé sécable :

- si vous êtes allergique à la mianséroline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique « composition ».

- maladie du foie sévère.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé dans les cas suivants, sauf avis contraire de votre médecin :

- association avec l'alcool (voir rubrique « interactions avec d'autres médicaments »).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

6. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- somnolence,

- sécheresse de la bouche,

• constipation.

Rarement:

- convulsions,

- prise de poids,

- douleurs articulaires,

- céderme (gonflement),

- douleurs musculaires,

- élévation des transaminases, du foie, fonction hépatique.

98,30



• idées suicidaires,

• hyperkinésie (hyperactivité motrice).

Par ailleurs, certains effets non souhaités sont possibles : état dépressif : possibilité de troubles psychiques.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice.

7. Mises en garde spéciales et précautions

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien si vous prenez un autre comprimé pelliculé sécable.

Mises en garde spéciales

Comme avec tous les antidépresseurs, l'absorption peut prendre jusqu'à plusieurs jours. Il est donc important de prendre régulièrement même en l'absence d'amélioration de l'état de santé.

Idées suicidaires et aggravation de votre état de santé

Si vous souffrez de dépression et/ou de trouble bipolaire, certaines idées d'auto-agression (agression envers soi-même) peuvent être majorées au début du traitement. Cela peut arriver car ce type de médicament n'agit pas toujours immédiatement ou au bout de quelques semaines ou plus de traitement.

Vous êtes plus susceptible de présenter ces types de comportements :

- si vous avez déjà eu des idées suicidaires,
- si vous êtes un jeune adulte. Les études sur le comportement suicidaire étaient accrues chez les personnes atteintes d'une maladie psychiatrique et traitées par antidepressifs.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'autodestruction, contactez immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital. Vous pouvez vous faire aider par un ami ou une personne proche. Si vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un état de santé mental, contactez votre pharmacien ou votre médecin. Vous pouvez lui demander de vous aider à gérer vos symptômes de dépression ou votre anxiété qui peuvent s'aggraver ou entraîner des idées suicidaires.

Utilisation chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans

ATHYMIL 30 mg doit habituellement pas être donné à des enfants de moins de 18 ans. Il est également important de savoir que les enfants de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets secondaires tels que pensées suicidaires et comportement suicidaire, comportement d'opposition et colère, lors de l'utilisation de ce médicament. Néanmoins, il est possible que certains patients de moins de 18 ans soient traités avec succès. Si votre pharmacien a prescrit ATHYMIL 30 mg à votre enfant, contactez-le immédiatement. Si vous avez des symptômes énumérés ci-dessous, contactez votre pharmacien ou votre médecin. Ces symptômes peuvent indiquer que la sécurité à long terme concernant le développement cognitif et comportemental de votre enfant est compromise.

ATHYMIL 30 mg

Comprimés pelliculés sécables - Boîte de 20
DCI : Chlorhydrate de mianséroline

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous quelqu'un d'autre, n'est pas nocif.

Si l'un des effets indésirables non mentionnés ci-dessous vous arrivez, contactez votre pharmacien.

1. Composition du médicament

Principe actif :

Chlorhydrate de mianséroline

Les excipients :

Amidon de pomme de terre, Silice colloïdale, Stéarate de magnésium, Méthylcellulose, Hydrogénophosphate de calcium, Hypromellose, Macrogol 8000 et Dioxyde de titane.

Excipients à effet notoire : Néant

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Ce médicament est un antidépresseur

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N06AX03

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement des épisodes dépressifs.

4. Posologie

Conformez-vous strictement à la prescription du médecin.

N'arrêtez pas votre traitement sans avis médical, même si vous ressentez une amélioration.

Votre médecin, dans certains cas, pourra adapter progressivement la posologie. Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé sécable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.

Avallez les comprimés avec un verre d'eau sans les croquer.

Fréquence d'administration

La dose quotidienne pourra être répartie au cours de la journée ou administrée de préférence le soir au coucher.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Durée de traitement

Le traitement est habituellement de plusieurs mois (de l'ordre de 6 mois).

Conformez-vous strictement à la prescription du médecin et n'arrêtez pas la prise de ce médicament sans son avis.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

5. Contre-indications

Ne prenez jamais ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé sécable :

- si vous êtes allergique à la mianséroline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique « composition ».

- maladie du foie sévère.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé dans les cas suivants, sauf avis contraire de votre médecin :

- association avec l'alcool (voir rubrique « interactions avec d'autres médicaments »).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

6. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- somnolence,

- sécheresse de la bouche,

• constipation.

Rarement:

- convulsions,

- prise de poids,

- douleurs articulaires,

- cédème (gonflement),

- douleurs musculaires,

- élévation des transaminases, du foie, fonction hépatique.

98,30



• idées suicidaires,

• hyperkinésie (hyperactivité motrice).

Par ailleurs, certains effets non souhaités sont possibles : dépression : possibilité de troubles psychiques

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice.

7. Mises en garde spéciales et précautions

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien si vous prenez un comprimé pelliculé sécable.

Mises en garde spéciales

Comme avec tous les antidépresseurs, l'absorption peut prendre jusqu'à plusieurs jours. Il est donc important de prendre régulièrement même en l'absence d'amélioration de l'état de santé.

Idées suicidaires et aggravation de votre état de santé

Si vous souffrez de dépression et/ou de trouble bipolaire, certaines idées d'auto-agression (agression envers soi-même) peuvent être majorées au début du traitement. Cela peut arriver car ce type de médicament n'agit pas toujours immédiatement ou au bout de quelques semaines ou plus de traitement.

Vous êtes plus susceptible de présenter ces symptômes si :

- si vous avez déjà eu des idées suicidaires,
- si vous êtes un jeune adulte. Les études sur le comportement suicidaire étaient accrues chez les personnes de moins de 24 ans.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'autodestruction, contactez immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital. Vous pouvez vous faire aider par un ami ou une personne de confiance. Si vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un état de santé mentale, contactez votre pharmacien ou votre psychiatre. Vous pouvez lui demander de modifier la dose ou de changer de médicament. Vous pouvez également consulter un psychologue ou un thérapeute.

Utilisation chez l'enfant et l'adolescent

ATHYMIL 30 mg doit habituellement pas être donné à un enfant de moins de 18 ans. Il est également important de savoir que les enfants de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets secondaires tels que pensées suicidaires et comportement suicidaire, comportement d'opposition et colère, lors de l'utilisation de ce médicament. Néanmoins, il est possible d'utiliser ATHYMIL 30 mg à des patients de moins de 18 ans sous surveillance médicale. Si votre médecin a prescrit ATHYMIL 30 mg à votre enfant, suivez ses instructions et contactez-le si vous avez des questions ou si vous observez des effets secondaires.

ALPERIDE® 50,100,200 et 400 mg
Comprimé Sécable
Boîte de 30
Amisulpride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.
cela pourrait lui être nocif.

Attention : ce médicament contient des substances qui peuvent entraîner une hypotension importante. Si vous ressentez des symptômes d'hypotension (vertiges, étourdissements, faiblesse), arrêtez immédiatement de prendre ce médicament et contactez votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative

Amisulpride (DCI).....

0,00
0,00
0,00
1 Ci

Excipients

O.S.P.

EXCIPENT A EFFET NOTOIRE

Lactose.

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPSYCHOTIQUE (code ATC : N05AL05).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin.

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Ce médicament est à utiliser par voie orale.

Avez-le(s) comprimé(s) avec un peu d'eau.

DUREE DE TRAITEMENT :

N'arrêtez pas de vous-même le traitement.

NE DEPASSEZ PAS LA POSOLOGIE NI LA DUREE DE TRAITEMENT PRESCRITES PAR VOTRE MEDECIN.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ne prenez jamais ALPERIDE®, comprimé sécable dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'Amisulpride) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Si vous souffrez d'un phéochromocytome (croissance excessive des glandes surrénales situées au niveau des reins et libérant des substances qui provoquent une pression artérielle élevée).

- Chez l'enfant de moins de 15 ans.

- Si vous allaitez.

- Si vous avez une tumeur dépendante de la prolactine (hormone provoquant la sécrétion de lait), par exemple un cancer du sein ou des troubles d'origine hypophysaire.

- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ce médicament n'est pas contre-indiquée (Voir le paragraphe "Prise d'autres médicaments").

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUS LES MEDICAMENTS, ALPERIDE®, comprimés sécables EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES EFFETS INDESIRABLES, SURTOUT DURANT LA PREMIERE OU LES DEUX PREMIERES SEMAINES DE TRAITEMENT.

La survenue d'une rigidité des muscles et de troubles de la conscience s'accompagnant d'une fièvre inexplicable au cours du traitement nécessite **l'arrêt immédiat** du traitement et une consultation médicale d'urgence.

Les effets indésirables suivants surviennent très fréquemment (plus de 1 personne sur 10) :

- Tremblements, rigidité musculaire, crampes, mouvements anormaux, salivation excessive.

Les effets indésirables suivants surviennent fréquemment (de 1 à 10 personnes sur 100) :

à certains muscles

59,50

a bouche,
te dans le sang,
it en dehors des
ince (trouble de
équemment (de 1

(paralysie temporaire d'un ou plusieurs muscles),

- Hypoglycémie (quantité excessive de sucre dans le sang),
- Ralentissement du rythme cardiaque,
- Augmentation des enzymes du foie et principalement des transaminases,
- Réactions allergiques.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir mais on ne connaît pas leur fréquence. Si vous ressentez un de ces symptômes, consultez immédiatement un médecin :

- Fièvre inexplicable associée à des troubles généraux et neurologiques,
- Syncopes graves (pertes de connaissance), troubles du rythme cardiaque pouvant entraîner le décès,
- Gonflement, douleur et rougeur au niveau des jambes. En effet, des caillots sanguins veineux, (particulièrement au niveau des jambes) peuvent se déplacer via les vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons et provoquer une douleur dans la poitrine et une difficulté à respirer.
- Brusque gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer et mettre en danger le patient (angio-oedème), plaques rouges sur la peau qui démangent (urticaire).

(leucopénie, neutropénie, agranulocytose (quantité basse de globules blancs dans le sang) (voir paragraphe « Mises en garde spéciales »),

Syndrome de sevrage du nouveau-né (voir paragraphe « Grossesse »).

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec ALPERIDE®, comprimé sécable :

- Votre médecin pourra pratiquer un électrocardiogramme avant de vous donner ce traitement. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

• Utilisez ce médicament avec précaution dans les cas suivants :

- Chez les personnes âgées, notamment si elles sont atteintes de démentie, en raison du risque de baisse de la tension artérielle et de somnolence ; en cas d'insuffisance rénale, la posologie peut être réduite par votre médecin,

- Si vous présentez des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral (appelé également « attaque cérébrale ») et se produisant lorsque la circulation du sang est brusquement interrompue dans une partie du cerveau),

- Si vous ou quelqu'un de votre famille avez des antécédents de formation de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques peut provoquer la formation de caillots sanguins,

ALPERIDE® 50,100,200 et 400 mg
Comprimé Sécable
Boîte de 30
Amisulpride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.
cela pourrait lui être nocif.

Attention : ce médicament contient des substances susceptibles d'aggraver les crises d'épilepsie. Si vous souffrez d'épilepsie, n'oubliez pas de consulter votre médecin ou votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative

Amisulpride (DCI).....

0,00
0,00
0,00
1 Ci

Excipients

O.S.P.

EXCIPENT A EFFET NOTOIRE

Lactose.

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPSYCHOTIQUE (code ATC : N05AL05).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin.

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Ce médicament est à utiliser par voie orale.

Avez-le(s) comprimé(s) avec un peu d'eau.

DUREE DE TRAITEMENT :

N'arrêtez pas de vous-même le traitement.

NE DEPASSEZ PAS LA POSOLOGIE NI LA DUREE DE TRAITEMENT PRESCRITES PAR VOTRE MEDECIN.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ne prenez jamais ALPERIDE®, comprimé sécable dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'Amisulpride) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Si vous souffrez d'un phéochromocytome (croissance excessive des glandes surrénales situées au niveau des reins et libérant des substances qui provoquent une pression artérielle élevée).

- Chez l'enfant de moins de 15 ans.

- Si vous allaitez.

- Si vous avez une tumeur dépendante de la prolactine (hormone provoquant la sécrétion de lait), par exemple un cancer du sein ou des troubles d'origine hypophysaire.

- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ce médicament n'est pas contre-indiquée (Voir le paragraphe "Prise d'autres médicaments").

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUS LES MEDICAMENTS, ALPERIDE®, comprimés sécables EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES EFFETS INDESIRABLES, SURTOUT DURANT LA PREMIERE OU LES DEUX PREMIERES SEMAINES DE TRAITEMENT.

La survenue d'une rigidité des muscles et de troubles de la conscience s'accompagnant d'une fièvre inexplicable au cours du traitement nécessite **l'arrêt immédiat** du traitement et une consultation médicale d'urgence.

Les effets indésirables suivants surviennent très fréquemment (plus de 1 personne sur 10) :

- Tremblements, rigidité musculaire, crampes, mouvements anormaux, salivation excessive.

Les effets indésirables suivants surviennent fréquemment (de 1 à 10 personnes sur 100) :

à certains muscles

59,50

a bouche,

te dans le sang,

et en dehors des

ince (trouble de

équemment (de 1

• Hypoglycémie (quantité excessive de sucre dans le sang),

- Ralentissement du rythme cardiaque,

- Augmentation des enzymes du foie et principalement des transaminases,

- Réactions allergiques.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir mais on ne connaît pas leur fréquence. Si vous ressentez un de ces symptômes, consultez immédiatement un médecin :

- Fièvre inexplicable associée à des troubles généraux et neurologiques,

- Syncopes graves (pertes de connaissance), troubles du rythme cardiaque pouvant entraîner le décès,

- Gonflement, douleur et rougeur au niveau des jambes. En effet, des caillots sanguins veineux, (particulièrement au niveau des jambes) peuvent se déplacer via les vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons et provoquer une douleur dans la poitrine et une difficulté à respirer.

- Brusque gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer et mettre en danger le patient (angio-oedème), plaques rouges sur la peau qui démangent (urticaire).

- Leucopénie, neutropénie, agranulocytose (quantité basse de globules blancs dans le sang) (voir paragraphe « Mises en garde spéciales »),

- Syndrome de sevrage du nouveau-né (voir paragraphe « Grossesse »).

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec ALPERIDE®, comprimé sécable :

- Votre médecin pourra pratiquer un électrocardiogramme avant de vous donner ce traitement. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

- Utilisez ce médicament avec précaution dans les cas suivants :

- Chez les personnes âgées, notamment si elles sont atteintes de démentie, en raison du risque de baisse de la tension artérielle et de somnolence ; en cas d'insuffisance rénale, la posologie peut être réduite par votre médecin,

- Si vous présentez des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral (appelé également « attaque cérébrale ») et se produisant lorsque la circulation du sang est brusquement interrompue dans une partie du cerveau,

- Si vous ou quelqu'un de votre famille avez des antécédents de formation de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques peut provoquer la formation de caillots sanguins,

ALPERIDE® 50,100,200 et 400 mg
Comprimé Sécable
Boîte de 30
Amisulpride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.
cela pourrait lui être nocif.

Attention : ce médicament contient des substances qui peuvent entraîner une hypotension importante. Si vous ressentez des symptômes d'hypotension (vertiges, étourdissements, faiblesse), arrêtez immédiatement de prendre ce médicament et contactez votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative

Amisulpride (DCI).....

0,00
0,00
0,00
1 Ci

Excipients

O.S.P.

EXCIPENT A EFFET NOTOIRE

Lactose.

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPSYCHOTIQUE (code ATC : N05AL05).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin.

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Ce médicament est à utiliser par voie orale.

Avez-le(s) comprimé(s) avec un peu d'eau.

DUREE DE TRAITEMENT :

N'arrêtez pas de vous-même le traitement.

NE DEPASSEZ PAS LA POSOLOGIE NI LA DUREE DE TRAITEMENT PRESCRITES PAR VOTRE MEDECIN.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ne prenez jamais ALPERIDE®, comprimé sécable dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'Amisulpride) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Si vous souffrez d'un phéochromocytome (croissance excessive des glandes surrénales situées au niveau des reins et libérant des substances qui provoquent une pression artérielle élevée).

- Chez l'enfant de moins de 15 ans.

- Si vous allaitez.

- Si vous avez une tumeur dépendante de la prolactine (hormone provoquant la sécrétion de lait), par exemple un cancer du sein ou des troubles d'origine hypophysaire.

- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ce médicament n'est pas contre-indiquée (Voir le paragraphe "Prise d'autres médicaments").

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUS LES MEDICAMENTS, ALPERIDE®, comprimés sécables EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES EFFETS INDESIRABLES, SURTOUT DURANT LA PREMIERE OU LES DEUX PREMIERES SEMAINES DE TRAITEMENT.

La survenue d'une rigidité des muscles et de troubles de la conscience s'accompagnant d'une fièvre inexplicable au cours du traitement nécessite **l'arrêt immédiat** du traitement et une consultation médicale d'urgence.

Les effets indésirables suivants surviennent très fréquemment (plus de 1 personne sur 10) :

- Tremblements, rigidité musculaire, crampes, mouvements anormaux, salivation excessive.

Les effets indésirables suivants surviennent fréquemment (de 1 à 10 personnes sur 100) :

à certains muscles

59,50

a bouche,

te dans le sang,

et en dehors des

ince (trouble de

équemment (de 1

• Hypoglycémie (quantité excessive de sucre dans le sang),

- Ralentissement du rythme cardiaque,

- Augmentation des enzymes du foie et principalement des transaminases,

- Réactions allergiques.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir mais on ne connaît pas leur fréquence. Si vous ressentez un de ces symptômes, consultez immédiatement un médecin :

- Fièvre inexplicable associée à des troubles généraux et neurologiques,

- Syncopes graves (pertes de connaissance), troubles du rythme cardiaque pouvant entraîner le décès,

- Gonflement, douleur et rougeur au niveau des jambes. En effet, des caillots sanguins veineux, (particulièrement au niveau des jambes) peuvent se déplacer via les vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons et provoquer une douleur dans la poitrine et une difficulté à respirer.

- Brusque gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer et mettre en danger le patient (angio-oedème), plaques rouges sur la peau qui démangent (urticaire).

- Leucopénie, neutropénie, agranulocytose (quantité basse de globules blancs dans le sang) (voir paragraphe « Mises en garde spéciales »),

- Syndrome de sevrage du nouveau-né (voir paragraphe « Grossesse »).

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec ALPERIDE®, comprimé sécable :

- Votre médecin pourra pratiquer un électrocardiogramme avant de vous donner ce traitement. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

- Utilisez ce médicament avec précaution dans les cas suivants :

- Chez les personnes âgées, notamment si elles sont atteintes de démentie, en raison du risque de baisse de la tension artérielle et de somnolence ; en cas d'insuffisance rénale, la posologie peut être réduite par votre médecin,

- Si vous présentez des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral (appelé également « attaque cérébrale ») et se produisant lorsque la circulation du sang est brusquement interrompue dans une partie du cerveau,

- Si vous ou quelqu'un de votre famille avez des antécédents de formation de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques peut provoquer la formation de caillots sanguins,

ALPERIDE® 50,100,200 et 400 mg
Comprimé Sécable
Boîte de 30
Amisulpride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.
cela pourrait lui être nocif.

Attention : ce médicament contient des substances susceptibles d'aggraver les crises d'épilepsie. Si vous souffrez d'épilepsie, n'oubliez pas de consulter votre médecin ou votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative

Amisulpride (DCI).....

0,00
0,00
0,00
1 Ci

Excipients

O.S.P.

EXCIPENT A EFFET NOTOIRE

Lactose.

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPSYCHOTIQUE (code ATC : N05AL05).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin.

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Ce médicament est à utiliser par voie orale.

Avez-le(s) comprimé(s) avec un peu d'eau.

DUREE DE TRAITEMENT :

N'arrêtez pas de vous-même le traitement.

NE DEPASSEZ PAS LA POSOLOGIE NI LA DUREE DE TRAITEMENT PRESCRITES PAR VOTRE MEDECIN.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ne prenez jamais ALPERIDE®, comprimé sécable dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'Amisulpride) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Si vous souffrez d'un phéochromocytome (croissance excessive des glandes surrénales situées au niveau des reins et libérant des substances qui provoquent une pression artérielle élevée).

- Chez l'enfant de moins de 15 ans.

- Si vous allaitez.

- Si vous avez une tumeur dépendante de la prolactine (hormone provoquant la sécrétion de lait), par exemple un cancer du sein ou des troubles d'origine hypophysaire.

- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ce médicament n'est pas contre-indiquée (Voir le paragraphe "Prise d'autres médicaments").

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUTS LES MEDICAMENTS, ALPERIDE®, comprimés sécables EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES EFFETS INDESIRABLES, SURTOUT DURANT LA PREMIERE OU LES DEUX PREMIERES SEMAINES DE TRAITEMENT.

La survenue d'une rigidité des muscles et de troubles de la conscience s'accompagnant d'une fièvre inexplicable au cours du traitement nécessite **l'arrêt immédiat** du traitement et une consultation médicale d'urgence.

Les effets indésirables suivants surviennent très fréquemment (plus de 1 personne sur 10) :

- Tremblements, rigidité musculaire, crampes, mouvements anormaux, salivation excessive.

Les effets indésirables suivants surviennent fréquemment (de 1 à 10 personnes sur 100) :

à certains muscles

59,50

a bouche,

te dans le sang,

et en dehors des

ince (trouble de

équemment (de 1

• Hypoglycémie (quantité excessive de sucre dans le sang),

- Ralentissement du rythme cardiaque,

- Augmentation des enzymes du foie et principalement des transaminases,

- Réactions allergiques.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir mais on ne connaît pas leur fréquence. Si vous ressentez un de ces symptômes, consultez immédiatement un médecin :

- Fièvre inexplicable associée à des troubles généraux et neurologiques,

- Syncopes graves (pertes de connaissance), troubles du rythme cardiaque pouvant entraîner le décès,

- Gonflement, douleur et rougeur au niveau des jambes. En effet, des caillots sanguins veineux, (particulièrement au niveau des jambes) peuvent se déplacer via les vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons et provoquer une douleur dans la poitrine et une difficulté à respirer.

- Brusque gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer et mettre en danger le patient (angio-oedème), plaques rouges sur la peau qui démangent (urticaire).

- Leucopénie, neutropénie, agranulocytose (quantité basse de globules blancs dans le sang) (voir paragraphe « Mises en garde spéciales »),

- Syndrome de sevrage du nouveau-né (voir paragraphe « Grossesse »).

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec ALPERIDE®, comprimé sécable :

- Votre médecin pourra pratiquer un électrocardiogramme avant de vous donner ce traitement. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

- Utilisez ce médicament avec précaution dans les cas suivants :

- Chez les personnes âgées, notamment si elles sont atteintes de démentie, en raison du risque de baisse de la tension artérielle et de somnolence ; en cas d'insuffisance rénale, la posologie peut être réduite par votre médecin,

- Si vous présentez des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral (appelé également « attaque cérébrale ») et se produisant lorsque la circulation du sang est brusquement interrompue dans une partie du cerveau),

- Si vous ou quelqu'un de votre famille avez des antécédents de formation de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques peut provoquer la formation de caillots sanguins,

ALPERIDE® 50,100,200 et 400 mg
Comprimé Sécable
Boîte de 30
Amisulpride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.
cela pourrait lui être nocif.

Attention : ce médicament contient des substances susceptibles d'aggraver les crises d'épilepsie. Si vous souffrez d'épilepsie, n'oubliez pas de consulter votre médecin ou votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative

Amisulpride (DCI).....

0,00
0,00
0,00
1 Ci

Excipients

O.S.P.

EXCIPENT A EFFET NOTOIRE

Lactose.

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPSYCHOTIQUE (code ATC : N05AL05).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin.

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Ce médicament est à utiliser par voie orale.

Avez-le(s) comprimé(s) avec un peu d'eau.

DUREE DE TRAITEMENT :

N'arrêtez pas de vous-même le traitement.

NE DEPASSEZ PAS LA POSOLOGIE NI LA DUREE DE TRAITEMENT PRESCRITES PAR VOTRE MEDECIN.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ne prenez jamais ALPERIDE®, comprimé sécable dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'Amisulpride) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Si vous souffrez d'un phéochromocytome (croissance excessive des glandes surrénales situées au niveau des reins et libérant des substances qui provoquent une pression artérielle élevée).

- Chez l'enfant de moins de 15 ans.

- Si vous allaitez.

- Si vous avez une tumeur dépendante de la prolactine (hormone provoquant la sécrétion de lait), par exemple un cancer du sein ou des troubles d'origine hypophysaire.

- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec ce médicament n'est pas contre-indiquée (Voir le paragraphe "Prise d'autres médicaments").

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUS LES MEDICAMENTS, ALPERIDE®, comprimés sécables EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES EFFETS INDESIRABLES, SURTOUT DURANT LA PREMIERE OU LES DEUX PREMIERES SEMAINES DE TRAITEMENT.

La survenue d'une rigidité des muscles et de troubles de la conscience s'accompagnant d'une fièvre inexplicable au cours du traitement nécessite **l'arrêt immédiat** du traitement et une consultation médicale d'urgence.

Les effets indésirables suivants surviennent très fréquemment (plus de 1 personne sur 10) :

- Tremblements, rigidité musculaire, crampes, mouvements anormaux, salivation excessive.

Les effets indésirables suivants surviennent fréquemment (de 1 à 10 personnes sur 100) :

à certains muscles

59,50

a bouche,

te dans le sang,

et en dehors des

ince (trouble de

équemment (de 1

• Hypoglycémie (quantité excessive de sucre dans le sang),

- Ralentissement du rythme cardiaque,

- Augmentation des enzymes du foie et principalement des transaminases,

- Réactions allergiques.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir mais on ne connaît pas leur fréquence. Si vous ressentez un de ces symptômes, consultez immédiatement un médecin :

- Fièvre inexplicable associée à des troubles généraux et neurologiques,

- Syncopes graves (pertes de connaissance), troubles du rythme cardiaque pouvant entraîner le décès,

- Gonflement, douleur et rougeur au niveau des jambes. En effet, des caillots sanguins veineux, (particulièrement au niveau des jambes) peuvent se déplacer via les vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons et provoquer une douleur dans la poitrine et une difficulté à respirer.

- Brusque gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer et mettre en danger le patient (angio-oedème), plaques rouges sur la peau qui démangent (urticaire).

- Leucopénie, neutropénie, agranulocytose (quantité basse de globules blancs dans le sang) (voir paragraphe « Mises en garde spéciales »),

- Syndrome de sevrage du nouveau-né (voir paragraphe « Grossesse »).

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec ALPERIDE®, comprimé sécable :

- Votre médecin pourra pratiquer un électrocardiogramme avant de vous donner ce traitement. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

- Utilisez ce médicament avec précaution dans les cas suivants :

- Chez les personnes âgées, notamment si elles sont atteintes de démentie, en raison du risque de baisse de la tension artérielle et de somnolence ; en cas d'insuffisance rénale, la posologie peut être réduite par votre médecin,

- Si vous présentez des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral (appelé également « attaque cérébrale ») et se produisant lorsque la circulation du sang est brusquement interrompue dans une partie du cerveau,

- Si vous ou quelqu'un de votre famille avez des antécédents de formation de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques peut provoquer la formation de caillots sanguins,