

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 066179

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☒ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3155 Société : R.A.M. 131042
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : BACHA Mohammed
 Date de naissance : 13/12/1955
 Adresse : 267, Bd de la grande Casbah
 Tél : 0613744690 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 19/09/2022
 Nom et prénom du malade : BACHA Mohammed Age : 66 ans
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 26/09/2022 Le : 26/09/2022

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23/09/22	2	2	300 dh	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

23/09/22

187 dh

2022

269.80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

22/09/22 360

105,40 dh

23/09/22 coloxcamer

2500 dh

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées

Nature des Soins

Coefficient



Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION


FIN D'EXECUTION

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H	
25533412	21433552	
00000000	00000000	
D		G
00000000	00000000	
35533411	11433553	
	B	

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS


VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Bouchra MADI

Spécialiste des Maladies
de l'Appareil Digestif
Estomac - Foie - Intestins
Hémorroïdes

Endoscopie Digestive
Échographie Abdominale

778, Bd Mokhtar Soussi - Hassania 1
El Alia - Mohammedia
Tél. : 05 23 28 15 30



الدكتورة بشرى الماضي

إختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي
(المعدة الأمعاء الكبد البواسير)

الفحص بالمنظار الداخلي
الفحص بالصدى

778. شارع المختار السوسي - الحسنية 1
العالية - المحمدية
الهاتف : 05 23 28 15 30

Mohammedia, le

19-09-2022

المحمدية، في
PHARMACIE EL ARL

Dr. KHALID ZIoud

394 Bd. El Houria El Alia Mohammedia
Tél : 05 23 32 77 56

778

INACTIF

(34,40X2)

- Dispersal

1-0-1

(21,00X2)

- Labab = 1-0-1

20j

PHARMACIE EL ARL
Dr. KHALID ZIoud
394 Bd. El Houria El Alia Mohammedia
Tél : 05 23 32 77 56

1-0-1

209,80

20j

Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dus à l'anxiété et à la tension psychique.

Composition :

5 mg de chlórdiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl 3-benzoyloxyquinuclidinium par dragée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

Propriétés :

Le chlórdiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlórdiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétoire. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlórdiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlórdiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlórdiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlórdiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlórdiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlórdiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desméthylchlórdiazépoxide, démoxépam, desméthylidiazépam. Le démoxépam et le desméthylidiazépam sont éliminés sous forme de conjugués inactifs de l'acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlórdiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie, puis rapidement hydrolysé dans le sang sous forme de quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine au côté du bromure de clidinium inchangé sous forme inchangée à une circulation entière en deux phases, avec des demi-vies de

Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles intestinaux et spasmodiques.

Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament avec du liquide.

Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer par 1-2 dragées par jour, augmenter progressivement la posologie jusqu'à la dose optimale, efficace.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et l'affection à traiter. Les dragées peuvent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

Librax® 5 / 2,5 mg

30 comprimés dragéifiés



6 118000 280019

OT:22083 PER:06/2025
PPV:21.00 DH

Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dus à l'anxiété et à la tension psychique.

Composition :

5 mg de chlórdiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl 3-benzoyloxyquinuclidinium par dragée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

Propriétés :

Le chlórdiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlórdiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétoire. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlórdiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlórdiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlórdiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlórdiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlórdiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlórdiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desméthylchlórdiazépoxide, démoxépam, desméthylidiazépam. Le démoxépam et le desméthylidiazépam sont éliminés sous forme de conjugués inactifs de l'acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlórdiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie, puis rapidement hydrolysé dans le sang sous forme de quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine au côté du bromure de clidinium inchangé sous forme inchangée à une circulation entière en deux phases, avec des demi-vies de

Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles intestinaux et spasmodiques.

Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament avec du liquide.

Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer par 1-2 dragées par jour, augmenter progressivement la posologie jusqu'à la dose optimale, efficace.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et l'affection à traiter. Les dragées peuvent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

Librax® 5 / 2,5 mg

30 comprimés dragéifiés



6 118000 280019

OT:22083 PER:06/2025
PPV:21.00 DH

DISPAINOL® 80mg

Phlogluclinol dihydrate
comprimés dispersibles et orodispersibles

• Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION :

Principe actif :
Chaque comprimé dispersible et orodispersible contient 80 mg de substance active, le Phlogluclinol dihydrate.
Excipients :
Quantité correspondant en Phlogluclinol anhydre 62,25 mg.
Aspartam, Lactose monohydraté, Povidone (PVP K90), Crospovidone (Polyplasdone XL 10), Cellulose microcristalline (type PH 102), Stéarate de magnésium.
Excipients à effet notoire : Aspartam, Lactose monohydraté.
FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS :
Comprimés dispersibles et orodispersibles dosés à 80 mg, sous plaquettes thermoformées.
Aluminium/PVC/PVDC.
DISPAINOL 80 mg : disponible en boîte de 10 et 20.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antispasmodique musculotrope (A) ; appareil digestif et métabolisme ; G : système génito-urinaire).
DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
Ne prenez jamais DISPAINOL 80 mg comprimés en cas de :

composants.
En raison de la présence d'aspartam, ce médicament est contre-indiqué chez les personnes atteintes de diabète sucré (maladie héréditaire dénotée à la naissance).
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Si vous présentez une intolérance à certains sucres, consultez votre pharmacien, en raison de la présence de lactose.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients atteints d'un syndrome de malabsorption héréditaire (rare).
L'association de Phlogluclinol avec des antalgiques majeurs tels que le paracétamol ou un syndrome de malabsorption héréditaire (rare).
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER VOTRE PHARMACIEN.



INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE LES MÉDICAMENTS, VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MÉDICAMENT.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée que si le bénéfice attendu l'emporte sur les risques. L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme enceinte ou allaitante. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

3443

Phloroglucinol dihydrate
comprimés dispersibles et orodispersibles

• Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même s'il souffre de la même maladie.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION :

Chaque comprimé dispersible et orodispersible contient 80 mg de substance active, le Phloroglucinol diluhyaté.

Excipients :
Quantité correspondant en Phloroglucinol anhydre 62,25 mg.

Aspartam, Lactose monohydraté, Povidone (PVP K90), Crospovidone (Polyplasdone XL 10), Cellulose microcristalline (type PH 102), Stéarate de magnésium.

Excipients à effet notoire : Aspartam, Lactose monohydraté.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS :
Comprimés dispersibles et orodispersibles dosés à 80 mg, sous plaquettes thermoformées Aluminium/PVC/PVDC.

DISPALINOL 80 mg : disponible en boîte de 10 et 20.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antispasmodique musculotrope (A: appareil digestif et métabolisme; G: système génito-urinaire).

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ne prenez jamais DISPAINOL 80 mg comprimés en ce

En raison de la présence d'asparam, ce médicament est contre-indiqué chez les personnes souffrant d'une maladie héréditaire dénotée à la naissance.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN.

Dispainol® 8mg
20 comprimés dispersibles

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMP

Si vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin pour en savoir plus sur les précautions à prendre.

6 118000 082835

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE MÉDICAMENTS

3440

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée qu'après avis d'un médecin.
L'administration de ce médicament est déconseillée chez les femmes enceintes ou allaitantes.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

FORME ET PRESENTATION :

Comprimé, boîte de 30 comprimés

COMPOSITION (par comprimé) :

Charbon végétal, chondrus (chondrus crispus) en poudre, argile alimentaire, fructo-oligosaccharide, dioxyde de silice, sucrose, phosphate de calcium; cellulose, amidon, fenouil (foeniculum vulgare) huile essentielle, polyvinylpyrrolidone, magnésium stéarate, carboxyméthylcellulose.

PROPRIETES :

CARBOSORB® est un produit naturel à base de :

- Charbon végétal activé à grande capacité d'absorption de gaz intestinaux et de toxines ce qui permet de soulager les patients ballonnés et de faciliter la digestion.
- Chondrus (algue rouge); Argile alimentaire; FOS (Fructo-Oligo-Saccharides) et huiles essentielles de fenouil qui agissent en synergie pour renforcer l'action du charbon végétal en éliminant les gaz intestinaux, et en luttant contre les spasmes, tout en procurant plus de confort intestinal.

UTILISATIONS :

CARBOSORB® est recommandé en cas de troubles digestifs, de constipation, de reflux gastro-œsophagien, de diarrhée, de syndrome du côlon irritable et de Troubles Fonctionnels Intestinaux.

CONSEILS D'UTILISATION :

- 1 à 2 comprimés 2 fois par jour, avec un verre d'eau.
- À utiliser en complément d'une alimentation équilibrée.
- Il est recommandé de prendre **CARBOSORB®** après les repas.
- Respecter la dose journalière conseillée.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Lot: 220345
À consommer de préférence avant le: 05/2027
PPC: 79,50 DH

CARBOSORB®



8 032578 475494

Fabriqué par Pharmalife Research-Italie
Importé et distribué par **MEDIPRO Pharma**.
Autorisation ministère de la santé n°: DA20181102004C




8 032578 475494

Docteur Bouchra MADI

Spécialiste des Maladies
de l'Appareil Digestif
Estomac - Foie - Intestins
Hémorroïdes

Endoscopie Digestive
Echographie Abdominale

778, Bd Mokhtar Soussi - Hassania 1
El Alia - Mohammedia
Tél. : 05 23 28 15 30



الدكتورة بشرى الماضي

إختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي
(المعدة الأمعاء الكبد البواسير)

الفحص بالمنظار الداخلي
الفحص بالصدى

778, شارع المختار السوسي - الحسنية 1
العالية - المحمدية
الهاتف : 05 23 28 15 30

Mohammedia, le 19 08 2022 في المحمدية،

Que NAETI GIZANT

ColoCo el.

RC : Douleur. fin



عيادة الطب الإشعاعي العالية RADIOLOGIE EL ALIA

Dr. Nawal EL GHAZOULI

د. نوال الغازولي

23/09/22

Nachit Ghizlane



187dr

omnipaque 300 mg I/ml

Radiologie El Alia
Dr. Nawal EL GHAZOULI
Bd. Sebtia - Mohammedia
Tél : 05 23 27 30 38 / 39
05 23 30 88 16

PHARMACIE K. AZIZA
98 K. A. ACCUS
Hay Mohammadi - CASABLANCA
TEL : 05 22 63 51 13

د. نوال الغازولي
lawal EL GHAZOULI



عيادة الطب الإشعاعي العالية
RADIOLOGIE EL ALIA

1, Bd. Sebtia, 28830, Mohammedia
Tél. : 05 23 27 30 38
05 23 27 30 39
Site web : www.radiologie-el-alia.ma



عيادة الطب الإشعاعي العالية RADIOLOGIE EL ALIA

Dr. Nawal EL GHAZOU LI

د. نوال الغازولي

Ure / creatinine

LABORATOIRE AMARA
Mohammed AMARA
Tél : 05 23 30 40 30

Radiologie El Alia
Dr. El Ghazouli Nawal
Boulevard Sebta, Mohammedia
Tél : 05 23 27 30 38 / 39
05 23 30 88 16

د. نوال الغازولي

Nawal EL GHAZOU LI



عيادة الطب الإشعاعي العالية
RADIOLOGIE EL ALIA

1, Bd. Sebta, 28830, Mohammedia

Tél. : 05 23 27 30 38

05 23 27 30 39

Site web : www.radiologie-el-alia.ma

LABORATOIRE AMARA D'ANALYSES MEDICALES

Dr. M. AMARA

3, Bd Mohammed V - Tél.: 0523.30.40.30 - Fax: 0523.30.43.20

Référence: **20922504**

Analyses effectuées le: 22/09/2022

Pour.....: **Mme NACHIT GHIZLANE EP BACHA**

Sur prescription du: Dr RADIOLOGIE EL ALIA

Code.....: 00046589



Organisme.....:

Bilan:

UREE CREAT

Cotation : (B 60)

Montant Net : 105.40 **Dhs**

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

CENT CINQ Dhs 40 Cts





د. نوال الغزولي
Dr. Nawal EL GHAZOU
Spécialiste en Radiologie
Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca
Ex Interne des hôpitaux de Paris.

مركز الفحص بالأشعة العالية

CENTRE DE RADIOLOGIE EL ALIA

- IRM Haut champs (1,5 Tesla) Sur place, sans rendez-vous • Scanner Spirale Multi-Barettes
- Radiologie Générale Numérique • Panoramique Dentaire Numérique • Mammographie Numérique
- Echo-doppler Couleur • Denta-scanner • Téléradiologie 4 mètres Numérique
- Ostéo-densitométrie biphotonique • Radiologie Interventionnelle • Radio-Photo

Mohammedia le 23/09/2022

Facture N° 05199/2022

Nom patient : NACHIT GHIZLANE

Examen : COLOSCANNER

Montant : 2500 DHS

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :DEUX MILLE CINQ

REGLEMENT : ESPECE

El Alia
Radiologie

radiologie El Alia
Dr. / El Ghazouli Nawal
Boulevard Sebta, Mohammedia
Tel: 05 23 27 30 38 / 39
05 23 30 88 16



د. نوال الغزولي
Dr. Nawal EL GHAZOULI
Spécialiste en Radiologie
Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca
Ex Interne des hôpitaux de Paris.

مركز الفحص بالأشعة العالية

CENTRE DE RADIOLOGIE EL ALIA

• IRM Haut champs (1,5 Tesla) Sur place, sans rendez-vous • Scanner Spirale Multi-Barettes
• Radiologie Générale Numérique • Panoramique Dentaire Numérique • Mammographie Numérique
• Echo-doppler Couleur • Denta-scanner • Téléradiologie 4 mètres Numérique
• Ostéo-densitométrie biphotonique • Radiologie Interventionnelle • Radio-Photo

Date : 23/09/2022

Nom : NACHIT GHIZLANE

Age : 44 ans

Médecin Traitant : Dr. BOUCHRA MADI

COLOSCANNER

TECHNIQUE :

Acquisition hélicoïdale multi planaire millimétrique, avec reconstructions fines axiales, coronales et sagittales, sans et après injection IV de PC iodé, sur les étages abdominal et pelvien en procubitus et décubitus en double contraste.

RESULTAT :

- Absence de polype décelable au niveau du cadre colique.
- Dernière anse iléale de calibre normal, à paroi fine, sans anomalies décelables.
- Foie de volume normal, de contours réguliers et de densité homogène.
- Voies biliaires intra et extra-hépatiques sont de calibre normal.
- Le tronc porte est de calibre normal et libre.
- Pancréas et rate de densité homogène et de morphologie normale.
- Reins de situation lombaire, de taille normale, de contours réguliers et à parenchymographie synchrone et homogène.
- Absence d'épanchement liquidien intra-péritonéal.
- Absence d'adénopathie intra-abdominale.
- Vessie semi-pleine à contenu liquidien homogène et à paroi fine.
- Absence d'anomalie utéro-annexielle visible sur cet examen.

CONCLUSION :

Coloscanner ne révélant pas d'anomalies notables, notamment absence d'anomalies au niveau de la FID.

Merci de votre confiance.

Dr. Nawal EL GHAZOULI

Mohammed AMARA
Pharmacien Biologiste

Diplômé de l'Université de Bruxelles (U.L.B.)
Spécialités : Biochimie - Hématologie
Immunologie - Bactériologie - Mycologie

مختبر اعماراء للتحاليل الطبية

LABORATOIRE AMARA D'ANALYSES MEDICALES

Prélèvement du : 22/09/2022
Edition du : 22/09/2022
Code Patient : 00046589
Matricule :

Heure : 08:24



Référence 20922T2504 du : 22/09/2022

Mme NACHIT GHIZLANE EP BACHA

Médecin: Dr. RADIOLOGIE EL ALIA

BIOCHIMIE EXAMEN DE SANG

Analyses	Résultats	Normes	Antécédents
Urée..... :	0.38	g/l (0.15 à 0.45)	.
Créatinine..... :	9.4	mg/l (6.0 à 12.0)	.

LABORATOIRE AMARA
Mohammed AMARA
BIOLOGISTE
1. Bd. Méd. V - Mohammédia
Tél : 05 23 30 40 30