

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3155

Société : RAN (31042)

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

BACHA

Mohammed

Date de naissance :

13/12/1955

Adresse :

267, Bd de la grande Tunisie

H 01

CP 83000

Tél. :

06.13.744.690

Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

26/09/2022

Nom et prénom du malade : NACHI GHALIA APTE Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Dokhla de la bronchite

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

CP 83000

Le : 26/09/2022

Signature de l'adhérent(e) :

BZ

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/01/2011	Consultation	1	300	

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	23/01/22	187 dh
	23/01/22 / 2022	269,80

#### ~~ANALYSES - RADIOGRAPHIES~~

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>Radiologie 1 Chazouli Maita, Mohamad 30 39 30 40 00 16 00 00</i>	22/09/22	3.60	1054.00
	23/09/22	colorcamer	2500 dh

#### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 35533411	G 21433552 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Docteur Bouchra MADI

Spécialiste des Maladies

de l'Appareil Digestif

Estomac - Foie - Intestins

Hémorroïdes


Endoscopie Digestive

Echographie Abdominale

778, Bd Mokhtar Soussi - Hassania 1

El Alia - Mohammedia

Tél. : 05 23 28 15 30



# الدكتورة بشرى الماضى

اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي

(المعدة والأمعاء الكبد البواسير)

الفحص بالمنظار الداخلي

الفحص بالصدى

شارع المختار السوسي - الحسينية 1

العلية - المحمدية

الهاتف : 05 23 28 15 30 : 05 23 28 15 30

Mohammedia, le

19.09.62

PHARMACIE EL AKL

Dr. KHALID ZIoud

394 Bd El Houria El Alia Mohammedia

Tél : 05 23 27 77 56

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

## CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.  
L'administration de ce médicament est déconseillée chez  
l'utilisatice de ce médicament ne doit être envisagée au

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

VOTRE PHARMACIEN MEILLEUR S'AGIT D'UN MED  
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE

SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE PRÉPARATION  
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER  
évitez en raison de leur effet spasmogène.

L'association de Chloroglycine avec des antalgiques mesurés tel  
que l'ibuprofène peut entraîner des effets secondaires chez les patients

Si vous présentez une intolérance à certains sucrés, conte  
l'utilisation de ce médicament est déconseillée dans le cas de la

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMP  
Si vous présentez une intolérance à certains sucrés, conte  
l'utilisation de ce médicament est déconseillée dans le cas de la

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER  
VOTRE PHARMACIEN.

En raison de la présence d'aspartam, ce médicament est  
composé de sucre.

Ne prenez jamais DISPAINOL 80 mg comprimés en cas de  
billeuses, de la vessie et de l'intestin, des voies

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spastomodiques de l'intestin, des voies

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?  
Antispasmodique musculaire (A : appareil digestif et métabolisme ; G : système génito-urinaire).

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE :  
FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS :  
DISPAINOL 80 mg : disponible en boîte de 10 et 20.

Aluminium/PVC/PVC.  
Comprimés dispersibles et orodispersibles doses à 80 mg, sous plaquettes thermoformé

Excipients : Lactose monohydrate, Povidone (PVP K90), Crospovidone (Polyplasdone XL 10), Cellulose

Excipients : Aspartam, Lactose monohydrate.

Quantité correspondant en Chloroglycine anhydre 62,25 mg.

Chaque comprimé dispersible et orodispersible contient 80 mg de substance active, le Chloroglycine

hydrate.

Principe actif : COMPOSITION :

Chaque comprimé dispersible et orodispersible contient 80 mg de substance active, le Chloroglycine

hydrate.

DISPAINOL® 80mg  
Phloroglucinol dihydrate  
comprimés dispersibles et orodispersibles

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Si vous avez toute autre question, si vous avez des difficultés, demandez plus d'informations à votre

médecin ou à votre pharmacien.

• Grâce à cette notice, vous pourrez poser des questions de la même

• Ce médicament n'a pas été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même

en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné

dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné

dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée que chez les patients dont la maladie est bien décompensée et qui ont à leur disposition un autre médicament ou à voter pharmacie.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT PHARMACEUTIQUE MEME SI L'AGIT D'UN MEDICAMENT

#### **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES**

VOTRE PHARMACIEN.

L'association de Phloroglucinol avec des antalgiques m'a été en raison de leur effet spasmodéne.

un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption hereditaire rare).

Si vous présentez des troubles digestifs, une diarrhée ou une constipation, une faiblesse et une perte de poids, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé. Ces symptômes peuvent être causés par diverses conditions, y compris les maladies chroniques, les infections et les troubles fonctionnels. Il est important de faire une évaluation complète pour déterminer la cause exacte et pour obtenir un traitement approprié.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRÉCAUTIONS

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'OPINION D'UN VOTRE PHARMACIEN.

En raison de la présence d'aspértam, ce médicament maladie héréditaire dépliste à la naissance).

**DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT**  
NE prenez jamais DISPAINOL 80 mg comprimés en  
cas d'insomnie.

biliaires, de la vessie et de l'utérus

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

**CLASSE PHARMACOTHERAPIQUE : Antispasmodique musculotrope (A : appareil digestif et**

DISPAINOL 80 mg : disponible en bouteille de 10 et 20.

**FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESERVATIONS**  
Comprimés dispersibles et orodispersibles doses  
Aluminium/PVC/PVDC.

Excipients à effet notable : Aspartam, Lactose monohydraté

Aspartam, Lactose monohydrate, Povidone (PVP K90), Stearate de magnésium microcristalline (type PH 102).

Quantité correspondant en Phloroglucinol anhydre 62.

Principe actif : Chaque comprimé dispersible et orodispersible contient

**COMPOSITION:**

- Si l'un des effets indésirables dévoilé grave ou si voire dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été prescrit personnellement par votre pharmacien.

- Gérez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la pour vos demandes d'assurance.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez

### **comprimés dispersifs**

**DISPAINIC**

**DISPAINO**

## FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîte de 30 comprimés

## COMPOSITION (par comprimé) :

Charbon végétal, chondrus (chondrus crispus) en poudre, argile alimentaire, fructo-oligosaccharide, dioxyde de silice, sucre, phosphate de calcium; cellulose, amidon, fenouil (foeniculum vulgare) huile essentielle, polyvinylpyrrolidone, magnésium stéarate, carboxyméthylcellulose.

## PROPRIÉTÉS :

**CARBOSORB®** est un produit naturel à base de :

- Charbon végétal activé à grande capacité d'absorption de gaz intestinaux et de toxines ce qui permet de soulager les patients ballonnés et de faciliter la digestion.
- Chondrus (algue rouge); Argile alimentaire; FOS (Fructo-Oligo-Saccharides) et huiles essentielles de fenouil qui agissent en synergie pour renforcer l'action du charbon végétal en éliminant les gaz intestinaux, et en luttant contre les spasmes, tout en procurant plus de confort intestinal.

## UTILISATIONS :

**CARBOSORB®** est recommandé en cas de difficultés et Troubles Fonctionnels Intestinaux

## CONSEILS D'UTILISATION :

- 1 à 2 comprimés 2 fois par jour, avec ou sans boissons.
- À utiliser en complément d'une alimentation équilibrée.
- Il est recommandé de prendre **CARBO** avec de l'eau.
- Respecter la dose journalière conseillée.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Lot: 220345  
À consommer de préférence avant le: 05/2027  
PPC: 79,50 DH

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

**CARBOSORB®**

Fabriqué par Pharmalife Research-Italie  
Importé et distribué par **MEDIPRO Pharma**.  
Autorisation ministère de la santé n°: DA20181102004C

8 032578 475494



**Docteur Bouchra MADI**

Spécialiste des Maladies

de l'Appareil Digestif

Estomac - Foie - Intestins

Hémorroïdes


Endoscopie Digestive

Echographie Abdominale

778, Bd Mokhtar Soussi - Hassania 1

El Alia - Mohammedia

Tél. : 05 23 28 15 30



**الدكتورة بشرى الماضي**

اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي

(المعدة والأمعاء الكبد البواسير)

الفحص بالمنظار الداخلي

الفحص بالصدى

1 شارع المختار السوسي - الحسنية 778

العلية - المحمدية

الهاتف : 05 23 28 15 30

Mohammedia, le

19 de 2022

المحمدية، في





# عيادة الطب الإشعاعي العالمية RADIOLOGIE EL ALIA

Dr. Nawal EL GHAZOULI

د. نوال الغازولي

٢٣٠٩٢٢

Nachit Ghizlane



187 dh

omnipaque 300 mg I / ml

Radiologie El Alia  
Dr. El Ghaouli Nawal  
Boulevard de Sebta, Mohammedia  
TEL : 05 23 27 30 38 / 39  
05 23 30 58 16

PHARMACIE K-AZIZA  
98 K.A. Aziz  
Hay Mohammadi  
Grand Casablanca  
Cinture 1  
TEL : 05 21 53 51 13

د. نوال الغازولي

Nawal EL GHAZOULI



عيادة الطب الإشعاعي العالمية  
RADIOLOGIE EL ALIA

1, Bd. Sebta, 28830, Mohammedia

Tél. : 05 23 27 30 38

05 23 27 30 39

Site web : [www.radiologie-el-alia.ma](http://www.radiologie-el-alia.ma)

**LABORATOIRE AMARA D'ANALYSES MEDICALES**

Dr. M. AMARA

3,Bd Mohammed V - Tél.: 0523.30.40.30 - Fax: 0523.30.43.20

Référence:

**20922504**

Analyses effectuées le: 22/09/2022

Pour.....: **Mme NACHIT GHIZLANE EP BACHA**

Sur prescription du: Dr **RADIOLOGIE EL ALIA**

Code.....: 00046589



Organisme.....:

**Bilan:**

UREE CREAT

Cotation : (B 60 )

**Montant Net :** 105.40 **Dhs**

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

**CENT CINQ Dhs 40 Cts**

LABORATOIRE AMARA  
Mohamed AMARA  
BIOLOGISTE  
1, Bd Med.V - Mohammed V  
Tél : 05 23 30 40 30




# عيادة الطب الإشعاعي العالمية RADIOLOGIE EL ALIA

Dr. Nawal EL GHAZOULI

د. نوال الغازولي

Ure / creatinine



د. نوال الغازولي

Nawal EL GHAZOULI



عيادة الطب الإشعاعي العالمية  
RADIOLOGIE EL ALIA

1, Bd. Sebta, 28830, Mohammedia

Tél. : 05 23 27 30 38

05 23 27 30 39

Site web : [www.radiologie-el-alia.ma](http://www.radiologie-el-alia.ma)

# Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

## Composition :

5 mg de chlordiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl 3-benzyloxyquinuclidinium par dragée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

## Propriétés :

Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétatoire. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

## Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlordiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlordiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desméthylchlordiazépoxide, démoxépam, desméthyldiazepam. Le démoxépam et le desméthyldiazepam sont éliminés sous forme de conjugués inactifs de l'acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlordiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en très grêle, puis rapidement hydrolysé dans le système quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine au côté du bromure de clidinium inchangé, sous forme inchangée à une circulation entière en deux phases, avec des demi-vies de

## Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant d'un spasmodique.

## Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament avec un repas avec du liquide.

**Directives posologiques particulières :**  
Patients âgés et faibles : commencer par 1-2 dragées par jour et augmenter la posologie jusqu'à la dose optimale, efficace.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et l'affection à traiter. Les dragées peuvent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

Librax® 5/2,5 mg 

30 comprimés dragéifiés



6 118000 280019

OT:22083 PER:06/2025  
PPV:21.00 DH

# Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

## Composition :

5 mg de chlordiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl 3-benzoyloxyquinuclidinium par dragée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

## Propriétés :

Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétatoire. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

## Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlordiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlordiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desméthylchlordiazépoxide, démoxépam, desméthyldiazepam. Le démoxépam et le desméthyldiazepam sont éliminés dans l'urine sous forme d'acide glucuronique. Lors d'administration de chlordiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en très faible quantité, puis rapidement hydrolysé dans le foie en un dérivé quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine sous forme inchangée au côté du bromure de clidinium inchangé. Le bromure de clidinium passe sous forme inchangée à une circulation entéro-hepatique en deux phases, avec des demi-vies de 1 à 2 heures.

## Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant d'un état spastique ou spastique.

## Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament au moins 1 heure avant ou après un repas avec du liquide.

## Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer par 1-2 dragées par jour, puis augmenter peu à peu la posologie jusqu'à la dose optimale, efficace et tolérée.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et l'affection à traiter. Les dragées peuvent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

Librax® 5/2,5 mg 

30 comprimés drageifiés



6 118000 280019

PT: 22083 PER: 06/2025  
PPV: 21.00 DH



Comprimé  
Voie orale

# CARBOSORB®

Charbon végétal activé, chondrus et huiles essentielles de fenouil

## FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîte de 30 comprimés

## COMPOSITION (par comprimé) :

Charbon végétal, chondrus (chondrus crispus) en poudre, argile alimentaire, fructo-oligosaccharide, dioxyde de silice, sucre, phosphate de calcium; cellulose, amidon, fenouil (foeniculum vulgare) huile essentielle, polyvinylpyrrolidone, magnésium stéarate, carboxyméthylcellulose.

## PROPRIÉTÉS :

CARBOSORB® est un produit naturel à base de :

- Charbon végétal activé à grande capacité d'absorption de gaz intestinaux et de toxines ce qui permet de soulager les patients ballonnés et de faciliter la digestion.
- Chondrus (algue rouge); Argile alimentaire; FOS (Fructo-Oligo-Saccharides) et huiles essentielles de fenouil qui agissent en synergie pour renforcer l'action du charbon végétal en éliminant les gaz intestinaux, et en luttant contre les spasmes, tout en procurant plus de confort intestinal.

## UTILISATIONS :

CARBOSORB® est recommandé en cas de Ballonnement et Troubles Fonctionnels Intestinaux.

## CONSEILS D'UTILISATION :

- 1 à 2 comprimés 2 fois par jour, avec ou sans boissons.
  - À utiliser en complément d'une alimentation équilibrée.
  - Il est recommandé de prendre CARBOSORB® au moins 1 heure avant ou après les repas.
  - Respecter la dose journalière conseillée.
  - Tenir hors de portée des jeunes enfants.
  - Conserver à l'abri de l'humidité et de la lumière.
- Complément alimentaire, ce n'est pas une cure.

**CARBOSORB®**

8 032578 475494

220345

05/2027

Fabriqué par Pharmalife Research-Italie

Importé et distribué par MEDIPRO Pharma.

Autorisation ministère de la santé n°: DA20181102004DMP/20UCA/MA v3



دیسبینول® ٨٠ ملغ.

## قلوروغلوسينول ثانية الهيدرات قراضن متحللة ومتحللة في الفم

- يجب قراءة النشرة كاملة ويعتبر قتل استعمال هذا الدواء.
  - احتفظوا بهذه النشرة قد تحتاجون إلى إعادة قرائتها.
  - إذا كان يلوككم أو أسلنته أو شكل شفافاً معلومات أساسية لدى الطبيب أو الصيدلي.
  - هذا الدواء ثم وصفة لكم شخصياً لا يجب إعطائه لآخرين، ولو في حالة ظهور نفس الأعراض لأن هذا قد يكون ضاراً.
  - يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي قبل تناوله مهدئ ذكوري في هذه النشرة، أو في حال أصبحت بعض التأثيرات الجانبية خطيرة.

**التركيبة:**

كل قرص متخلل في الفم يحتوي على 80 ملغم من المادة الفعالة فلوروغلوسينول ثباتي الهيدرات.  
الكتمة المكافحة من الفلوروغلوسينول الغير المتميّز 62.25 ملغم.

السراج :

اسبرستام، لكتينز احادي الهيدرات، بوفيفيون (PVP K 90) ، كروسبيوفيفيون (polyplasdone XL 10)، سيليلوز ميكروكريستاللين (صفن PH 102)، ستيبارات المغذيات.

سوانغ ذو تأثير معلوم :  
الأسبراتام، لاكتوز الألها.



مي والاستقلاب، G: الجهاز التناسلي - البولي).

ك الصفراوية، للمثانة وللرحم

اسية لفلوروغلوسينول أو لأحد المكونات.  
بالأمس فنييل سيتون أوري (مرض وراثي يكتشف عند الولادة).  
يدلي:

كثفات الالم الرئيسية كالملوكيتين أو مشتقاتها نظراً لفعاليتها الذي يسبب تشنجات في

بار الطيب أو الصيدلي بكل علاج آخر موازي ولو كان بدون وصفة الطبيب.

**الـ** لا يجب استعمال هذا الدواء أثناء الحمل **إلا عند الضرورة**.  
لا ينصح باستعمال هذا الدواء عند المرأة التي تتعرض  
لـ يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

**السائقون ومستعملو الآلات:**  
لا ينطليق

الأعراض والسلوك التي يجب تتبعها عند اخذ جرعة زائدة  
لا ينطبق  
تعليمات عند تسيير جرعة او اكثر :



د. نوال الغزولي  
Dr. Nawal EL GHAZOLI  
Spécialiste en Radiologie  
Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca  
Ex Interne des hôpitaux de Paris.

# مركز الفدى بالأشعة العالية

## CENTRE DE RADIOLOGIE EL ALIA

- IRM Haut champs (1,5 Tesla) Sur place, sans rendez-vous • Scanner Spiralé Multi-Barettes
- Radiologie Générale Numérique • Panoramique Dentaire Numérique • Mammographie Numérique
- Echo-doppler Couleur • Denta-scanner • Téléradiologie 4 mètres Numérique
- Ostéo-densitométrie biphotonique • Radiologie Interventionnelle • Radio-Photo

Mohammedia le 23/09/2022

### Facture N° 05199/2022

Nom patient : NACHIT GHIZLANE

Examen : COLOSCANNER

Montant : 2500 DHS

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :DEUX MILLE CINQ

REGLEMENT : ESPECE

Centre de Radiologie El Alia  
Dr. Nawal Ghazouli  
Boulevard Sebta Mohammedia  
Tel: 05 23 27 30 38 / 39  
05 23 30 88 16



**د. نوال الغزولي**  
**Dr. Nawal EL GHAZOULI**  
 Spécialiste en Radiologie  
 Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca  
 Ex Interne des hôpitaux de Paris.

# مركز الفدى بالأشعة العالية

## CENTRE DE RADIOLOGIE EL ALIA

- IRM Haut champs (1,5 Tesla) Sur place, sans rendez-vous • Scanner Spiralé Multi-Barettes
- Radiologie Générale Numérique • Panoramique Dentaire Numérique • Mammographie Numérique
- Echo-doppler Couleur • Denta-scanner • Téléradiologie 4 mètres Numérique
- Ostéo-densitométrie biphotonique • Radiologie Interventionnelle • Radio-Photo

Date : 23/09/2022

Nom : NACHIT GHIZLANE

Age : 44 ans

Médecin Traitant : Dr. BOUCHRA MADI

### COLOSCANNER

#### TECHNIQUE :

Acquisition hélicoïdale multi planaire millimétrique, avec reconstructions fines axiales, coronales et sagittales, sans et après injection IV de PC iodé, sur les étages abdominal et pelvien en procubitus et décubitus en double contraste.

#### RESULTAT :

- Absence de polype décelable au niveau du cadre colique.
- Dernière anse iléale de calibre normal, à paroi fine, sans anomalies décelables.
- Foie de volume normal, de contours réguliers et de densité homogène.
- Voies biliaires intra et extra-hépatiques sont de calibre normal.
- Le tronc porte est de calibre normal et libre.
- Pancréas et rate de densité homogène et de morphologie normale.
- Reins de situation lombaire, de taille normale, de contours réguliers et à parenchymographie synchrone et homogène.
- Absence d'épanchement liquidien intra-péritonéal.
- Absence d'adénopathie intra-abdominale.
- Vessie semi-pleine à contenu liquidien homogène et à paroi fine.
- Absence d'anomalie utéro-annexielle visible sur cet examen.

#### CONCLUSION :

Coloscanner ne révélant pas d'anomalies notables, notamment absence d'anomalies au niveau de la FID.

Merci de votre confiance.

Dr. Nawal EL GHAZOULI

Mohammed AMARA  
Pharmacien Biologiste

Diplômé de l'Université de Bruxelles (U.L.B.)  
Spécialités : Biochimie - Hématologie  
Immunologie - Bactériologie - Mycologie

# مختبر اعمارة للتحليلات الطبية

## LABORATOIRE AMARA D'ANALYSES MEDICALES

Prélèvement du : 22/09/2022

Heure : 08:24

Edition du : 22/09/2022

Référence 20922T2504 du : 22/09/2022

Code Patient 00046589

Mme NACHIT GHIZLANE EP BACHA

Matricule :



Médecin: Dr. RADIOLOGIE EL ALIA

### BIOCHIMIE EXAMEN DE SANG

Analyses	Résultats	Normes	Antécédents
Urée..... : .....	<b>0.38</b>	g/l	(0.15 à 0.45)
Créatinine..... : .....	<b>9.4</b>	mg/l	(6.0 à 12.0)

LABORATOIRE AMARA  
Mohammed AMARA  
BIOCHIMIE  
2, Bd.Med.V - Mohammedia  
Tél : 05 23 30 40 30