

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| O Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| O Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| O Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 2761 Société :

Actif  Pensionné(e)

Nom & Prénom : TANANI

Autre : Bouachaïd

Date de naissance : 01/01

1975

Adresse : 14 coop ECHABAB BERRCHID

Tél. : 062750362

Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin



Cachet du médecin :

Date de consultation : 12/09/2022

Nom et prénom du malade : TANANI Bachat

Age : 48

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : hém

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



Le : / /

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Bachat

Autorisation CNDP N° : AA-215/2019

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : \_\_\_\_\_

Signature de l'adhérent(e) : Bachat

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<p style="text-align: center;">   <b>ASMOUN Samir</b>                      Pharmacien en Pharmacie    <b>RUBASSALAM Hay Al Mousa</b>                      BFERRECHD                      05 22 32 84 9                 </p>	28/09/2022	297.40

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODDF.

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION**

Docteur Said MERJANE  
Médecine Générale

61, Rue Omar Ibnou Al Khattab  
Berrechid - Tél.: 05 22 33 71 56

ASMOUDI MRAFAT  
ASMOUDI Samir  
Docteur en Pharmacie  
2 RUE ASSALAM HAY AL HOUSSEIN  
BERRECHID  
Tél. : 05 22 32 84

الدكتور سعيد مرجان  
الطب العام

رقم 61 زنقة عمر ابن الخطاب  
برشيد - الهاتف : 05 22 33 71 56

Berrechid le :

28 Sept 2022

ORDONNANCE

TAHAROU - Rondeur.

3x90.80

Astapha. 500mg (300)

25.00

2 x 25.



Coccidine, paromod.

100g {

T. 297.40



ASMOUDI MRAFAT  
ASMOUDI Samir  
Docteur en Pharmacie  
2 RUE ASSALAM HAY AL HOUSSEIN  
BERRECHID  
Tél. : 05 22 32 84

# ASTAPH

(Flucloxacilline)

Astaph 500mg/24 gélules



## Composition :

- Formes orales

Gélules à 500 mg :

Flucloxacilline(DCl) 500 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)

Excipient qsp..... 1 gélule.

Poudre pour suspension buvable à 250 mg/5ml :

Flucloxacilline(DCl) 250 mg (sous forme de sel sodique monohydraté) pa

Poudre pour suspension buvable à 125 mg/5ml :

Flucloxacilline(DCl) 125 mg (sous forme de sel sodique monohydraté) pa

- Formes injectables :

Injectable à 250 mg :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 250 mg (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 3ml d'eau P.P.I.

Injectable à 500mg :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 500 mg (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 5ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzyllique à 3%.

Injectable à 1 g :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 1 g (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 5ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzyllique à 3%.

## Propriétés :

Antibiotique de la famille des bêta-lactamines semi-synthétiques du groupe M, résistant à la pénicillinase staphylococcique. La flucloxacilline est un bactéricide.

Le spectre d'activité : Staphylococcus auréus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogènes, Streptococcus pneumoniae, Clostridium spp, Bacillus anthracis, Neisseria spp.

## Indications :

Infections à germes sensibles :

- infections de la peau et des tissus mous;
- infections ostéo-articulaires;
- infections des voies respiratoires;
- infections de la sphère ORL;
- Septicémie, entérocolite, ostéomyelite, méningite et endocardite à staphylocoques.

## Contre-indications :

Allergie aux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines (pénicillines et céphalosporines).

## Mises en garde et précautions d'emploi :

- La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement.
- Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois fatales ont été exceptionnellement observées chez des malades traités par les pénicillines M. Leurs administration nécessite donc un interrogatoire préalable. Devant des antécédents d'allergie typique à ces produits, la contre-indication est formelle.
- En cas d'insuffisance rénale, il est inutile de réduire la posologie habituelle de la forme orale.
- Nouveau-né : administrer avec prudence au nouveau-né en raison du risque d'hyperbilirubinémie par compétition de fixation sur les protéines sériques (ictère nucléaire).

## Grossesse et allaitement :

Grossesse : la flucloxacilline doit être utilisée avec précaution chez la femme enceinte.

Allaitement : La flucloxacilline passant dans le lait maternel, l'éventualité d'une suspension de l'allaitement doit être envisagée.

## Effets indésirables :

- Manifestations allergiques : fièvre, urticaire, éosinophilie, œdème de Quincke, exceptionnellement choc anaphylactique.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées.
- Augmentation rare et modérée des transaminases (ASAT, ALAT), exceptionnellement hépatites icteriques.
- Réactions hématologiques réversibles : anémies, thrombopénies, leucopénies.

# ASTAPH

(Flucloxacilline)

Astaph 500mg/24 gélules



## Composition :

- Formes orales

Gélules à 500 mg :

Flucloxacilline(DCl) 500 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)

Excipient qsp..... 1 gélule.

Poudre pour suspension buvable à 250 mg/5ml :

Flucloxacilline(DCl) 250 mg (sous forme de sel sodique monohydraté) pa

Poudre pour suspension buvable à 125 mg/5ml :

Flucloxacilline(DCl) 125 mg (sous forme de sel sodique monohydraté) pa

- Formes injectables :

Injectable à 250 mg :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 250 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)  
+ ampoule de 3ml d'eau P.P.I.

Injectable à 500mg :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 500 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)  
+ ampoule de 5ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzyllique à 3%.

Injectable à 1 g :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 1 g (sous forme de sel sodique monohydraté)  
+ ampoule de 5ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzyllique à 3%.

## Propriétés :

Antibiotique de la famille des bêta-lactamines semi-synthétiques du groupe M, résistant à la pénicillinase staphylococcique. La flucloxacilline est un bactéricide.

Le spectre d'activité : Staphylococcus auréus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogènes, Streptococcus pneumoniae, Clostridium spp, Bacillus anthracis, Neisseria spp.

## Indications :

Infections à germes sensibles :

- infections de la peau et des tissus mous;
- infections ostéo-articulaires;
- infections des voies respiratoires;
- infections de la sphère ORL;
- Septicémie, entérocolite, ostéomyelite, méningite et endocardite à staphylocoques.

## Contre-indications :

Allergie aux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines (pénicillines et céphalosporines).

## Mises en garde et précautions d'emploi :

- La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement.
- Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois fatales ont été exceptionnellement observées chez des malades traités par les pénicillines M. Leurs administration nécessite donc un interrogatoire préalable. Devant des antécédents d'allergie typique à ces produits, la contre-indication est formelle.
- En cas d'insuffisance rénale, il est inutile de réduire la posologie habituelle de la forme orale.
- Nouveau-né : administrer avec prudence au nouveau-né en raison du risque d'hyperbilirubinémie par compétition de fixation sur les protéines sériques (ictère nucléaire).

## Grossesse et allaitement :

Grossesse : la flucloxacilline doit être utilisée avec précaution chez la femme enceinte.

Allaitement : La flucloxacilline passant dans le lait maternel, l'éventualité d'une suspension de l'allaitement doit être envisagée.

## Effets indésirables :

- Manifestations allergiques : fièvre, urticaire, éosinophilie, œdème de Quincke, exceptionnellement choc anaphylactique.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées.
- Augmentation rare et modérée des transaminases (ASAT, ALAT), exceptionnellement hépatites icteriques.
- Réactions hématologiques réversibles : anémies, thrombopénies, leucopénies.

# ASTAPH

(Flucloxacilline)

Astaph 500mg/24 gélules



## Composition :

- Formes orales

Gélules à 500 mg :

Flucloxacilline(DCl) 500 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)

Excipient qsp..... 1 gélule.

Poudre pour suspension buvable à 250 mg/5ml :

Flucloxacilline(DCl) 250 mg (sous forme de sel sodique monohydraté) pa

Poudre pour suspension buvable à 125 mg/5ml :

Flucloxacilline(DCl) 125 mg (sous forme de sel sodique monohydraté) pa

- Formes injectables :

Injectable à 250 mg :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 250 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)  
+ ampoule de 3ml d'eau P.P.I.

Injectable à 500mg :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 500 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)  
+ ampoule de 5ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzyllique à 3%.

Injectable à 1 g :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 1 g (sous forme de sel sodique monohydraté)  
+ ampoule de 5ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzyllique à 3%.

## Propriétés :

Antibiotique de la famille des bêta-lactamines semi-synthétiques du groupe M, résistant à la pénicillinase staphylococcique. La flucloxacilline est un bactéricide.

Le spectre d'activité : Staphylococcus auréus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogènes, Streptococcus pneumoniae, Clostridium spp, Bacillus anthracis, Neisseria spp.

## Indications :

Infections à germes sensibles :

- infections de la peau et des tissus mous;
- infections ostéo-articulaires;
- infections des voies respiratoires;
- infections de la sphère ORL;
- Septicémie, entérocolite, ostéomyelite, méningite et endocardite à staphylocoques.

## Contre-indications :

Allergie aux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines (pénicillines et céphalosporines).

## Mises en garde et précautions d'emploi :

- La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement.
- Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois fatales ont été exceptionnellement observées chez des malades traités par les pénicillines M. Leurs administration nécessite donc un interrogatoire préalable. Devant des antécédents d'allergie typique à ces produits, la contre-indication est formelle.
- En cas d'insuffisance rénale, il est inutile de réduire la posologie habituelle de la forme orale.
- Nouveau-né : administrer avec prudence au nouveau-né en raison du risque d'hyperbilirubinémie par compétition de fixation sur les protéines sériques (ictère nucléaire).

## Grossesse et allaitement :

Grossesse : la flucloxacilline doit être utilisée avec précaution chez la femme enceinte.

Allaitement : La flucloxacilline passant dans le lait maternel, l'éventualité d'une suspension de l'allaitement doit être envisagée.

## Effets indésirables :

- Manifestations allergiques : fièvre, urticaire, éosinophilie, œdème de Quincke, exceptionnellement choc anaphylactique.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées.
- Augmentation rare et modérée des transaminases (ASAT, ALAT), exceptionnellement hépatites icteriques.
- Réactions hématologiques réversibles : anémies, thrombopénies, leucopénies.

# COCCIDIN® 2%, Pommade

[Fusidate de Sodium]

Tube de 15 g

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 1. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Fusidate de sodium (DCI) ..... 2 g

Excipients : Vaseline blanche, Alcool cétylique, Lanoline, Paraffine liquide q.s.p....100 g

Excipients à effet notable : Alcool cétylique, Lanoline.

## 2. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Ce médicament est un antibiotique.

## 3. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Infections de la peau à staphylococco et streptococco (exemple : impétigos, désinfections de foyers microbien).

## 4. POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION

- Applications locales avec ou sans pansement, une ou deux fois par jour, après nettoyage de la surface infectée. Evitez l'application en couche épaisse.

- Ne pas utiliser sur les lésions suintantes macérées, ni dans les plis ni sur les ulcères de jambes.

## 5. CONTRA-INDICATIONS

N'utilisez jamais COCCIDIN 2 %, Pommade dans les cas suivants:

- Allergies au fusidate de sodium ou à l'un des constituants.
- En cas d'allaitement, ne pas appliquer sur le sein.

## 6. EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, COCCIDIN 2 %, pommade est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Possibilité d'eczéma allergique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 7. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

Faites attention avec COCCIDIN 2 %, Pommade:

- La pommade ne doit pas être appliquée sur l'œil.
- Ne pas utiliser plus d'une semaine ni sur de trop grandes surfaces, en particulier chez le nourrisson.
- Ce médicament contient de l'alcool cétylique et de lanoline et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple: eczéma).

## 8. INTERACTIONS

### Interactions avec d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Interactions avec les aliments et les boissons :

Sans objet.

### Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

## 9. UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Ce médicament dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## 10. LES EFFETS POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITE A CONDUIRE UN VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES MACHINES

Sans objet.

## 11. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE

Si vous avez utilisé plus de COCCIDIN 2%, pommade que vous n'auriez dû :

La survenue d'un surdosage est peu probable.

Cependant, en cas d'application excessive et sur une grande étendue de peau,

coccidin pommade  
coccidin ointment



note

peut

Si v

corf

12,

Sai

13,

Sa

Cr

Liste I.

Précaution

A conserver

Tenir hors de

Ne pas utilis

Les médicar

ménagers. C

inutilisés. C

La dernière

LOT: 220920

PER: 17-2025

PPV: 15.00DH

CECI EST UN M  
UN MEDICAMENT N'EST PAS UN F

Il vous concerne, vo

Le médicament est

pas toujours ss

Il ne faut jamais abuse

Utiliser les médicaments prescrits com

Il sait quels sont les médicame

Exécutez exactement les prescr

Suivez le traitement prescrit, ne l'interrom

propre ini

VOTRE PHARMACIEN CONN

suive ses c

Il ne s'agit pas pour vous de prendre de

Il s'agit pour vous de prendre les m

Fabriqu

co

41, Rue Mohamed DIOURI, 2

## COCCIDIN® 2%

(Sodium fu

Tube of

Read this entire leaflet carefully before you

• Keep this leaflet. You may need to read it at

• If you have any other questions, or if there

your doctor or pharmacist

• This medicine has been prescribed for you

not be the right medicine for them even if they

are yours.

• If any of the side effects get serious, or if y

this leaflet, please tell your doctor or pharma

## 1- COMPOSITION OF MEDICINAL PRODU

Sodium fusidate (INN) .....

Excipients: White soft paraffin, Cetyl Alcohol

Excipients with known effects: Cetyl Alcohol

## 2- PHARMACO-THERAPEUTIC CLASS

This medicine is antibiotic.

## 3- THERAPEUTIC INDICATIONS

Staphylococcal and streptococcal skin infect of households).

## 4- POSOLOGY AND ADMINISTRATION MO

- Topical application with or without dressing the infected area. Avoid application in thick la

- Do not use on macerated oozing lesions, in

## 5- CONTRAINDICATIONS

Never use COCCIDIN 2% Ointment in the

- If you are allergic to Sodium fusidate or any