

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-730183

132102

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11381 Société :

☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : TOUM BENCHEKROUN GHIZLANE

Date de naissance : 21.05.1976

Adresse :

Tél. : 0661734478 Total des frais engagés : 400 + 130,70

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Othman Lorabi
Psychiatre - Psychothérapeute
I.N.P.E : 091191544
33, Rue Majib Mahtoud - Casablanca
Tél : 05 22 20 87 25 / Fax : 05 22 49 12 37

Date de consultation : 05/09/2022

Nom et prénom du malade : TOUM BENCHEKROUN GHIZLANE

Lien de parenté : ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : psychiques

En cas d'accident, préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 05/09/2022

Signature de l'adhérent(e) :


Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/09/12	anp		200,00	INP : Dr. Othman Lorabi Psychiatre Psychothérapeute I.N.P.E : 091191544 33, Rue Najib Mahfoud Casablanca Tél : 05 22 20 87 28 / Fax : 05 22 49 12 37

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	05.09.12	120,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 G 00000000 35533411 11433553 B [Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	DATE DU DEVIS <input type="text"/>			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Othman LORABI

Docteurat d'Etat en Médecine de la Faculté de Clermont Ferrand
Ancien Interne des Hôpitaux de Clermont Ferrand

PSYCHIATRE PSYCHOTHERAPEUTE
THERAPIE COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE

Sur Rendez Vous



الدكتور الورابي عثمان

دكتور الدولة خريج كلية كليرمون فيران (فرنسا)
طبيب داخلي سابق بمستشفيات كليرمون فيران

متخصص في الأمراض العقلية
معالج نفسي معرفي و سلوكي

بالموعد

ORDONNANCE MEDICALE

Casablanca, le

05/09/22

Rue Tour B. LAHLOU KASSI

35,20



1/ ALPRAZ 2,5g

0,5g le soir pendant 14 jrs,

puis 1/2 g le soir pendant 07 jrs. - puis arrêt.

95,20
2/ EXTENDAL



0,5g le matin pendant 30 jrs

130,20



Dr. Othman Lorabi
Psychiatre - Psychothérapeute
I.N.P.E. : 091191544
33, Rue Najib Mahfoud - Casablanca
Tél : 05 22 20 87 25 / Fax : 05 22 49 12 37

Adresse : Immeuble «Art Office» 33, Rue Najib Mahfoud (Ex Ollier) Quartier Gauthier 20060 CASABLANCA
Tél : 0522 20 87 25 - الهاتف : - Fax : 05 22 49 12 37 - الفاكس : 20060 - العنوان : عمارة "أرت أوفيس" 33، زنقة نجيب محفوظ - الدار البيضاء - 20060
IF : 40477464 - Patente : 35509946 - ICE : 001764832000010

www.psychiatre.ma



ALPRAZ 0.5 mg et 1 mg

Comprimés sécables

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALPRAZ, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un **anxiolytique**.

A Date de fabrication :
A Consommer de préférence avant fin :
N° de lot :

PPC = 95,00 DHS

10/2021
10/2024
0921065

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

Contre-indications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance au sucre, contactez le avant de prendre ce médicament.

respiratoires pendant le sommeil),
- insuffisance hépatique grave,
- myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de **DEPENDANCE** : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,
- dose,
- antécédents d'autres dépendances.

V002 - 01/21
ETEXMAC030CP



3 760162 579741

NE PAS ARRÊTER BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires,

mais on peut observer une agitation, une irritabilité, des extrémités, un engourdissement, des sautes de humeur, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, des troubles de la motricité, des troubles de la sensibilité, des troubles de la vision, des troubles de l'audition, des troubles de l'équilibre, des troubles de la coordination, des troubles de la posture, des troubles de la marche, des troubles de la conduite, des troubles de la vie quotidienne, des troubles de la vie sociale, des troubles de la vie sexuelle, des troubles de la vie reproductive, des troubles de la vie métabolique, des troubles de la vie endocrinienne, des troubles de la vie immunitaire, des troubles de la vie cardiovasculaire, des troubles de la vie respiratoire, des troubles de la vie digestive, des troubles de la vie urinaire, des troubles de la vie génitale, des troubles de la vie cutanée, des troubles de la vie musculo-squelettique, des troubles de la vie neurologique, des troubles de la vie psychiatrique, des troubles de la vie oncologique, des troubles de la vie infectieuse, des troubles de la vie parasitaire, des troubles de la vie fongique, des troubles de la vie bactérienne, des troubles de la vie virale, des troubles de la vie mycoplasmaïque, des troubles de la vie chlamydienne, des troubles de la vie trichomonasienne, des troubles de la vie leishmanienne, des troubles de la vie trypanosomienne, des troubles de la vie amébienne, des troubles de la vie coccidienne, des troubles de la vie cryptosporidienne, des troubles de la vie isosporidienne, des troubles de la vie caryacée, des troubles de la vie ciliée, des troubles de la vie flagellée, des troubles de la vie microscopique, des troubles de la vie macroscopique, des troubles de la vie cellulaire, des troubles de la vie tissulaire, des troubles de la vie organique, des troubles de la vie systémique, des troubles de la vie globale.

Les modalités de prise doivent être définies avec votre médecin. La diminution des symptômes

gravité peut se produire, à **TRANSITOIRE** des symptômes qui avaient justifié la mise en traitement.

Des troubles de la mémoire, des altérations des fonctions psychiques sont susceptibles d'apparaître quelques heures qui suivent la prise du médicament. Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions comportementales recherchées : insomnie, agitation, nervosité, euphorie, tension, modifications de la personnalité, voire des comportements dangereux (agressivité envers son entourage, ainsi qu'un comportement et des automatismes).

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, contactez le plus rapidement possible votre médecin.

Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être utilisés avec précaution chez le sujet âgé, en raison de la somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent favoriser les conséquences souvent graves.

En raison de la présence de lactose dans ce médicament, il ne doit pas être utilisé chez les patients atteints de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou de déficit en lactase intestinale (troubles métaboliques rares).

Précautions d'emploi

La prise de ce médicament doit être suivie d'un suivi médical renforcé notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie du foie, d'alcoolisme et de troubles respiratoires.

en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.