

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Reclamation :

- Prise en charge : contact@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 0006485

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0273 - Société : 132916
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : HANANI DAOUIA
 Date de naissance : 01.01.1932
 Adresse : LOT YAKSOUR N°9 Rue 22 H.H. Casa
 Tél. : 062.11.58.36 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 06/10/2022
 Nom et prénom du malade : HANANI DAOUIA Age :
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Glaucome HTA ostéoporose arthrose
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Dr BENHLIMA Mohammed

Cabinet de Consultations et d'Explorations Médicales

Diplôme d'Université de Bordeaux en Diabétologie et Nutrition

Spécialiste en Médecine du Travail

Diplôme Universitaire en Echographie

Maîtrise d'Université de Paris 6 en Marketing Santé et Société

Diplôme Inter-Universitaire de Paris 7 en Recherche Clinique

Diplôme de Doctorat en Médecine



FACTURE N° 74/2022

Birjdid, le 06/10/2022

Nom Prénom: HANANI Daria

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|
| ☒ | Consultation du 06/10/2022 | 200 | DHS |
| ☐ | Radiographie.....du..... | | DHS |
| ☐ | Echographie Doppler.....du..... | | DHS |
| ☒ | Electrocardiogramme ECG du 06/10/2022 | 200 | DHS |
| ☐ | Analyse biologique.....du..... | | DHS |
| ☐ | Injection.....du..... | | DHS |
| ☐ | Strapping.....du..... | | DHS |
| ☐ | Autre :.....du..... | | DHS |

Le montant des honoraires s'élevant à la somme de

400 DHS

Lotissement Mabrouka, angle Av. Hassan II Av. Laÿoune Birjdid 24150 Boîte Postale 95

0523 36 05 90 0675 00 91 62 benhlimam@gmail.com

INPE : 111165874

ICE : 001639995000053

Dr BENHLIMA Mohammed
Médecin Spécialiste
Cabinet d'Explorations
Médicales - Birjdid

Dr BENHLIMA Mohammed

Cabinet de Consultations et d'Explorations Médicales

Diplôme d'Université de Bordeaux en Diabétologie et Nutrition

Spécialiste en Médecine du Travail

Diplôme Universitaire en Echographie

Maîtrise d'Université de Paris 6 en Marketing Santé et Société

Diplôme Inter-Universitaire de Paris 7 en Recherche Clinique

Diplôme de Doctorat en Médecine

ORDONNANCE

Birjdid, le 06-10-2022

Nom Prénom : HANANI Dania



193,60 x 3 = 580,80 Fosavance 70/5600

1 cp / semaine

x 3 mois

12 x 3 = 360,00 Veprium 150

1 cp / le matin

x 3 mois

22,40 x 3 = 67,10 Ashardil 75

1 cp / à midi

x 3 mois

127,00 x 6 = 762,00 Xalatan collyre

2 gtt / les 2 yeux

x 3 mois

66,80

Voltaren 50

1 cp 3x / j



22,50

Omnig 20



1 gelule / j



Dr BENHLIMA Mohammed
Médecin Spécialiste
Cabinet d'Explorations
Médicales - Birjdid

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

PPV 22DH40
EXP 02/2024
LOT 10010

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

PPV 22DH40
EXP 05/2023
LOT 14010 5

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

PPV 22DH40
EXP 03/2024
LOT 10010 7

LOT/EXP.:

DX5540
EA0279
05/2023
PPV 127DH00

LOT/EXP.:

DR7516
DP3430
02/2023
PPV 127DH00

LOT/EXP.:

EY1145
ER1234
01/2024
PPV 127DH00

LOT/EXP.:

DR7516
DP3430
02/2023
PPV 127DH00

LOT/EXP.:

DJ8915
DJ3325
12/2022
PPV 127DH00

LOT/EXP.:

DX5540
EA0279
05/2023
PPV 127DH00

22,50

LOT: M20061
EXP: FEB 2024
PPV: 66,80 DH

Comment prendre FOSAVANCE

Comment prendre une dose, prenez un comprimé de FOSAVANCE le lendemain matin du jour où vous vous en êtes pris. *Ne prenez pas deux comprimés le même jour.* Reprenez votre traitement d'un comprimé une fois par semaine, comme d'habitude, correspondant à votre choix initial.

Comment arrêter de prendre FOSAVANCE

Après avoir arrêté de prendre FOSAVANCE aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit. Comme on ne sait pas combien de temps vous devez prendre FOSAVANCE, vous devrez discuter périodiquement avec votre médecin de la nécessité de ce traitement afin de déterminer si FOSAVANCE vous convient toujours.

Les instructions sont incluses dans la boîte de FOSAVANCE.

Les informations importantes vous rappelant comment prendre FOSAVANCE.

En cas de questions sur l'utilisation de ce médicament, ou en cas de plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Consultez votre médecin immédiatement si vous ressentez un des effets indésirables suivants, ou si vous avez besoin d'un traitement médical urgent : Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : brûlures d'estomac ; difficulté ou douleur pour avaler ; ulcération de l'œsophage (œsophage : tube qui conduit les aliments de la bouche à l'estomac) ; qui peut entraîner des douleurs dans la poitrine, des brûlures d'estomac ou une difficulté ou une douleur à avaler (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) :

réactions allergiques telles que urticaire ; gonflement de la face, des lèvres, de la langue et/ou d'autres parties du corps ; difficulté à respirer ou à avaler ; réactions cutanées sévères, telles que des cloques ou des plaques.



70058199/00-1

AMM 29477 DMP/21/NRQ



Fosavance 5600 UI

4 comprimés

DISTRIBUE PAR MSD MAROC B.P. 136 - BOUSKOURA

P.P.V: 193,60 DH

grave et
sur 10) :
l'estomac)

nt entraîner

Comment prendre FOSAVANCE

Comment prendre une dose, prenez un comprimé de FOSAVANCE le lendemain matin du jour où vous vous en êtes pris. *Ne prenez pas deux comprimés le même jour.* Reprenez votre traitement d'un comprimé une fois par semaine, comme d'habitude, en fonction de votre choix initial.

Comment prendre FOSAVANCE

En attendant de prendre FOSAVANCE aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit. Comme on ne sait pas combien de temps vous devez prendre FOSAVANCE, vous devrez discuter périodiquement avec votre médecin de la nécessité de ce traitement afin de déterminer si FOSAVANCE vous convient.

Les instructions sont incluses dans la boîte de FOSAVANCE.

Les informations importantes vous rappelant comment prendre FOSAVANCE.

Il y a d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Consultez votre médecin immédiatement si vous ressentez un des effets indésirables suivants, car il est possible que vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical urgent : Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : brûlures d'estomac ; difficulté ou douleur pour avaler ; ulcération de l'œsophage (œsophage : tube qui conduit les aliments de la bouche à l'estomac) ; qui peut entraîner des douleurs dans la poitrine, des brûlures d'estomac ou une difficulté ou une douleur à avaler ; (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) :

réactions allergiques telles que urticaire ; gonflement de la face, des lèvres, de la langue et/ou d'autres parties du corps ; difficulté à respirer ou à avaler ; réactions cutanées sévères, telles que des cloques ou des bulles.



70058199/00-1

AMM 29477 DMP/21/NRQ



Fosavance 5600 UI

4 comprimés

DISTRIBUE PAR MSD MAROC B.P. 136 - BOUSKOURA

P.P.V: 193,60 DH

grave et
sur 10) :
l'estomac)

nt entraîner

Comment prendre FOSAVANCE

Comment prendre une dose, prenez un comprimé de FOSAVANCE le lendemain matin du jour où vous vous en êtes pris. *Ne prenez pas deux comprimés le même jour.* Reprenez votre traitement d'un comprimé une fois par semaine, comme d'habitude, correspondant à votre choix initial.

Comment prendre FOSAVANCE

Après avoir arrêté de prendre FOSAVANCE aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit. Comme on ne sait pas combien de temps vous devez prendre FOSAVANCE, vous devrez discuter périodiquement avec votre médecin de la nécessité de ce traitement afin de déterminer si FOSAVANCE vous convient.

Les instructions sont incluses dans la boîte de FOSAVANCE.

Les informations importantes vous rappelant comment prendre FOSAVANCE.

En cas d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, ou si vous avez besoin de plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne sont pas nécessairement liés au médicament.

Consultez votre médecin immédiatement si vous ressentez un des effets indésirables suivants, ou si vous avez besoin d'un traitement médical urgent : Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : brûlures d'estomac ; difficulté ou douleur pour avaler ; ulcération de l'œsophage (œsophage : tube qui conduit les aliments de la bouche à l'estomac) ; qui peut entraîner des douleurs dans la poitrine, des brûlures d'estomac ou une difficulté ou une douleur à avaler (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) :

réactions allergiques telles que urticaire ; gonflement de la face, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge ; difficulté à respirer ou à avaler ; réactions cutanées sévères, telles que des cloques ou des bulles.



70058199/00-1

AMM 294/77 DMP/21/NRQ



Fosavance 5600 UI

4 comprimés

DISTRIBUE PAR MSD MAROC B.P. 136 - BOUSKOURA

P.P.V: 193,60 DH

grave et
sur 10) :
l'estomac)

nt entraîner

Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés pelliculés sécables

Irbésartan

Veillez lire :

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament est un médicament de marque. Les comprimés sont identiques, mais les emballages peuvent différer.
- Si l'un des effets secondaires mentionnés dans cette notice, parlez-en à votre médecin.



avant de prendre ce médicament.

écrire.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VEPRAN 150 mg et 300 mg, comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES EFFETS SECONDAIRES ?
3. COMMENT PRENDRE VEPRAN 150 mg et 300 mg, comprimés ?
4. QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES ?
5. COMMENT PRENDRE VEPRAN 150 mg et 300 mg, comprimés ?
6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

mg, comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés ?

300 mg, comprimés ?

LES EVENTUELS ?

et 300 mg, comprimés ?

1. QU'EST-CE QUE VEPRAN 150 mg et 300 mg, comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Vepran appartient à un groupe de médicaments connus sous le nom d'antagonistes de récepteurs de l'angiotensine-II.

L'angiotensine-II est une substance formée par l'organisme qui se lie aux récepteurs de l'angiotensine-II.

Cette liaison provoque ainsi une élévation de la pression artérielle.

Vepran agit en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II.

Cela entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Vepran agit ainsi sur la dégradation du fonctionnement du système cardiovasculaire.

artérielle essentielle

patients ayant

Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés pelliculés sécables

Irbésartan

Veillez lire :

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament est un médicament de marque. Les comprimés sont identiques, mais les emballages peuvent différer.
- Si l'un des effets secondaires mentionnés dans cette notice, parlez-en à votre médecin.



avant de prendre ce médicament.

écrire.

Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VEPRAN ?
2. QUELLES SONT LES INDICATIONS ?
3. COMMENT PRENDRE VEPRAN ?
4. QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES ?
5. COMMENT PRENDRE VEPRAN ?
6. INFORMATIONS IMPORTANTES

mg, comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés ?

300 mg, comprimés ?

LES EVENTUELS ?

et 300 mg, comprimés ?

1. QU'EST-CE QUE VEPRAN 150 mg et 300 mg, comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Vepran appartient à un groupe de médicaments connus sous le nom d'antagonistes de récepteurs de l'angiotensine-II.

L'angiotensine-II est une substance formée par l'organisme qui se lie aux récepteurs de l'angiotensine-II et provoque ainsi une élévation de la pression artérielle.

Vepran agit en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II, ce qui entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Vepran agit ainsi en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II, ce qui entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Vepran agit ainsi en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II, ce qui entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Vepran agit ainsi en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II, ce qui entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Vepran agit ainsi en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II, ce qui entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Vepran agit ainsi en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II, ce qui entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés pelliculés sécables

Irbésartan

Veillez lire :

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament est un médicament de marque. Les comprimés sont identiques, mais les emballages peuvent différer.
- Si l'un des effets secondaires mentionnés dans cette notice vous paraît gênant, parlez-en à votre médecin.



avant de prendre ce médicament.

écrire.

Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VEPRAN ?
2. QUELLES SONT LES EFFETS SECONDAIRES ?
3. COMMENT PRENDRE VEPRAN ?
4. QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES ?
5. COMMENT PRENDRE VEPRAN ?
6. INFORMATIONS IMPORTANTES

mg, comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés ?

300 mg, comprimés ?

LES EVENTUELS ?

et 300 mg, comprimés ?

1. QU'EST-CE QUE VEPRAN 150 mg et 300 mg, comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Vepran appartient à un groupe de médicaments connus sous le nom d'antagonistes de récepteurs de l'angiotensine-II.

L'angiotensine-II est une substance formée par l'organisme qui se lie aux récepteurs de l'angiotensine-II et provoque ainsi une élévation de la pression artérielle.

Vepran agit en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II, ce qui entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Vepran agit ainsi en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II, ce qui entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Vepran agit ainsi en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II, ce qui entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Vepran agit ainsi en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II, ce qui entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Vepran agit ainsi en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II, ce qui entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Vepran agit ainsi en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II, ce qui entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Vepran agit ainsi en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II, ce qui entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Vepran agit ainsi en bloquant les récepteurs de l'angiotensine-II, ce qui entraîne ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Nom pat.: hanani
daouia

No pat. :
No réf. :

Né: 01-01-1932
Age: 90 ans
Ethnie: F

Taille: 156 cm
Poids: 65 kg

TA: 150 70 mmHg

Méd:
Dr BENHLIMA

AT-101 1.32 C

2.157 026

FC: 68/min

Intervalles:

RR 886 ms
P 114 ms
PQ 132 ms
QRS 80 ms
QT 380 ms
QTC 404 ms

Axes: P (II) -0.06 mV
P -90 ° S (V1) -0.70 mV
QRS 31 ° R (V5) 1.40 mV
T 46 ° Sokol. 2.13 mV

Je 06-OCT-22 11:13:47

71.316

2.157 026

RYTHME SINUSAL
ECG NORMAL

5.78

RAPPORT NON-CONFIRME

AT-101

1.32 C


2.157 026

Je 06-OCT-22 11:13:47

2.157 026



2.157 026



0.05-35Hz F50 55F SBS

71.316


2.157 026



Dr BENHLIMA
AT-101

1.32 C

2.157 026



Je 06-OCT-22 11:13:47

2.157 026