

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0007700

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 50049 Société : 134446

Actif  Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : ABOU OBIDA KHADDAG

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : ..... Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin:

**Docteur Hassan JAMMI**  
**CARDIOLOGUE**  
Rue Oumaima SAYAH  
Massira Al Khadra Casa  
20 Bd. A  
39 31 01 Fax. 0522 36 79 35  
Tél. 0522 39 31 01 INF 091080218  
CE: 001698148000061

Date de consultation : 11/18/2022

Nom et prénom du malade : Mme ABOU OBIDA KHADDAG Age : 87 ans

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : HHT - ACPA -

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : .....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : .....



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Docteur Hassan JAMMI CARDIOLOGUE 20 Rue Oumaima Al Khadra Casa Bd. Al Massira Al Khadra Casa Tél. 0522 39 31 01 Fax. 0522 36 79 35 INF 091080218 ICE : 00169814800061
17/10/22	C 2	G.	60	
18 OCT. 2022	C 2 X 16 (E/G)	300 DH	Docteur Hassan JAMMI CARDIOLOGUE 20, Rue Oumaima SAFAH Bd. Al Massira Al Khadra Casa Tél. 0522 39 31 01 Fax. 0522 36 79 35 INF 091080218 ICE : 00169814800061	

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AL BOUSTANE Houda BEN HOUCINE 580, Bd Ibn Sina Derb El Widad Hay Hassani - CASABLANCA Tél. : 05 22 90 33 97	18/10/2022	1269, 60

### ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H 25533412 00000000 35533411	D 00000000 00000000 35533411	G 21433552 00000000 11433553	
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

40  
hu

# CABINET DE CARDIOLOGIE ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Résidence Star Youness , Rue Oumaima Sayeh, N°20, 2ème étage, Appt. N°6  
Boulevard Al Massira Al Khadra , Quartier Racine - Casablanca 20000

الدكتور حسن جعفر  
أمراض القلب والشرايين

**Dr. Hassan JAMMI**  
**CARDIOLOGUE**

Diplômé de l'Université  
de Nice - Sophia Antipolis  
Ex. Assistant spécialiste  
des Hôpitaux de France

49.60

PPV:49,60 DH  
LOT: 22H01  
EXP: 08/2025

18 OCT. 2022

A.	Abou Rida .	Khalda
*	D. aux 100000 Frt 1er/10/8	
*	87.50 x 3 = 262,50 Nabil	Si
*	Nedjat	Si
*	Nedjat 50 ver Met	
*	80x8 = 160,00	Si
*	774.40	Si
*	193.60 x 4 = 774.40	Si
*	Djavans 1er / Janv 50	Si
*	23,70	Si
*	Stilim 1/2 2 3	Si
*	Lypaux 1/2 2 3	Si
03	1869,60	Si

GSM : 06 61 14 94 22  
Tél : 05 22 39 31 01  
Fax : 05 22 36 79 35

Sur Hassan JAMMI  
CARDIOLOGUE  
20, Rue Oumaima SAYAH  
Bd. Al Massira Al Khadra - Casablanca  
Tél. 0522 39 31 01 Fax: 05 22 36 79 35  
INP: 091080218  
ICE: 00169814800061

**FORME ET PRÉSENTATION :**  
Prazépam  
**COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :**  
LYSANXIA® 10 mg comprimés sécables, boîte de 20 billes de 20 comprimés.  
LYSANXIA® 15 mg/ml, solution buvable en gouttes, flacon de 20 ml.

**Prézepam :** 10 mg  
**Excipients :** lactose, cellulose microcristalline, amidon de maïs, stearate de magnésium, silice colloïdale, p.s.p.  
**LYSANXIA® comprimé :**  
un comprimé sécable.

**CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE (T)**  
Benzodiazépine (anxiolytique)  
(N : système nerveux central)  
Patenote V.  
Excipients : propyléneglycol, éthyldiéthyléneglycol.  
Four 1 ml = 30 gouttes : 15 mg de prazépam.

**DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT**  
Ce médicament est préconisé dans le traitement  
d'ATTENTION !  
DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

CE médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ  
DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT  
- insuffisance respiratoire grave,  
- insuffisance hépatique grave,  
- syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires durant le sommeil),  
- allergie connue à l'assise de produits.

**EN CAS DE PROBLÈME**  
- contre la douleur, en cas de maladie ou d'allaitement.  
Il ne doit pas être pris par les personnes dépendantes de produits.

UT. AV : 12 2024  
P.V.D  
23 10

LOT N° : F W 181

et le colécalciférol connaît sous le nom de vitamine D3.  
FOSAVANCE est un comprimé contenant deux substances actives, l'acide alendronique (communément app

## Qu'est-ce que FOSAVANCE ?

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé ?
  1. Qu'est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3 avant de prendre ce médicament.
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FOSAVANCE
  3. Comment prendre FOSAVANCE
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels
  5. Comment conserver FOSAVANCE
  6. Contenu de l'emballage et autres informations

## Quel contenu cette notice ?

- Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
- Informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien ou une personne qui pourrait leur être nocif,
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement par votre médecin. Ne le donnez pas à une autre personne.
- Si vous ressentez un effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Il est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3 avant de prendre ce médicament.



# FOSAVANCE® 70 mg/5 600 UI, comprimés

Notice : information de l'utilisateur

Acide alendronique/colécalciférol

et le colécalciférol connaît sous le nom de vitamine D3.  
FOSAVANCE est un comprimé contenant deux substances actives, l'acide alendronique (communément app

## Qu'est-ce que FOSAVANCE ?

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé ?
  1. Qu'est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3 avant de prendre ce médicament.
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FOSAVANCE
  3. Comment prendre FOSAVANCE
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels
  5. Comment conserver FOSAVANCE
  6. Contenu de l'emballage et autres informations

## Quel contenu cette notice ?

- Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
- Informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien ou une personne qui pourrait leur être nocif,
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement par votre médecin. Ne le donnez pas à une autre personne.
- Si vous ressentez un effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Il est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3 avant de prendre ce médicament.



# FOSAVANCE® 70 mg/5600 UI, comprimés

Notice : information de l'utilisateur

Acide alendronique/colécalciférol

et le colécalciférol connaît sous le nom de vitamine D3.  
FOSAVANCE est un comprimé contenant deux substances actives, l'acide alendronique (communément app

## Qu'est-ce que FOSAVANCE ?

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé ?
  1. Qu'est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3 avant de prendre ce médicament.
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FOSAVANCE
  3. Comment prendre FOSAVANCE
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels
  5. Comment conserver FOSAVANCE
  6. Contenu de l'emballage et autres informations

## Quel contenu cette notice ?

- Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
- Informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien ou une personne qui pourrait leur être nocif,
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement par votre médecin. Ne le donnez pas à une autre personne.
- Si vous ressentez un effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Il est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3 avant de prendre ce médicament.



# FOSAVANCE® 70 mg/5600 UI, comprimés

Notice : information de l'utilisateur

Acide alendronique/colécalciférol

et le colécalciférol connaît sous le nom de vitamine D3.  
FOSAVANCE est un comprimé contenant deux substances actives, l'acide alendronique (communément app

## Qu'est-ce que FOSAVANCE ?

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé ?
  1. Qu'est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3 avant de prendre ce médicament.
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FOSAVANCE
  3. Comment prendre FOSAVANCE
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels
  5. Comment conserver FOSAVANCE
  6. Contenu de l'emballage et autres informations

## Quel contenu cette notice ?

- Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
- Informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien ou une personne qui pourrait leur être nocif,
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement par votre médecin. Ne le donnez pas à une autre personne.
- Si vous ressentez un effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui n'a pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Il est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3 avant de prendre ce médicament.



# FOSAVANCE® 70 mg/5 600 UI, comprimés

Notice : information de l'utilisateur

Acide alendronique/colécalciférol

# SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

umaryl

Pour les patients soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Il contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

4. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

• phlébite (caillot dans une veine),  
• embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),  
• maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,  
• certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).  
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;

• En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie);

• En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,  
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,

- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

sont pas interdits, manière régulière et sans excès. Durant le traitement excessif d'alcool, Sintrom sur votre ordinateur. Interaction avec les médicaments. Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse. Prévention.

En cas de besoin d'un anticoagulant pendant

Si vous souhaitez prendre particulier, votre trousseau. L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON OU L'AUTRE, OU MEDICAMENT.

Sportifs : Evitez les sports de contact.

Effet sur l'aptitude à conduire. Sintrom n'a pas d'effet sur l'aptitude à utiliser des machines.

Gardez sur vous le cas d'éventuelle urgence.

Excipients à effet secondaire. Ce médicament contient des patients présentant un syndrome héréditaire rare.

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Instruction pour la posologie, mode de administration et durée du

Posologie. Respectez strictement les instructions.

Mises en garde et précautions. A titre indicatif :

La première dose.

Puis la dose est augmentée progressivement pour équilibrer le taux de vitamine K dans le corps.

Les modifications de posologie doivent être réalisées progressivement, sous surveillance médicale.

Mode d'administration. VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration. La prise régulière et sans oublier de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement.

L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour. Il est préférable de la prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose lorsque possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez les recommandations de votre médecin.

Durée du traitement. Selon prescription.

Le comprimé peut être

الدواء الموصى به  
لـ سينتروم 4 مجم

4 مجم

3 مجم

Sintrom® 4 mg  
Adefoset pegol 10 comprimés



Médicament autorisé N° : 51217DMP/21/NF

PPV : 20,00

Exp :

N° Lot :

alimentation de la ration de ces

la partie de cet

très e.

ISSE TRE UN

r des

es et nt, en

les appaides

stra-

que «

tion.

INR,

ain, si

strat-

que «

tion.

INR,

ain, si

strat-

que «

tion.

INR,

ain, si

# SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

umaryl

Pour les patients soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Il contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

4. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

• phlébite (caillot dans une veine),  
• embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),  
• maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,  
• certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).  
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;

• En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie);

• En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,  
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,

- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

sont pas interdits, manière régulière et sans excès. Durant le traitement excessif d'alcool, Sintrom sur votre ordinateur. Interaction avec les médicaments. Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse. Prévention.

En cas de besoin d'un anticoagulant pendant

Si vous souhaitez prendre particulier, votre trousseau. L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON OU L'AUTRE, OU MEDICAMENT.

Sportifs : Evitez les sports de contact.

Effet sur l'aptitude à conduire. Sintrom n'a pas d'effet sur l'aptitude à utiliser des machines.

Gardez sur vous le cas d'éventuelle urgence.

Excipients à effet secondaire. Ce médicament contient des patients présentant un syndrome héréditaire rare.

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Instruction pour la posologie, mode de administration et durée du

Posologie. Respectez strictement les instructions.

Mises en garde et précautions. A titre indicatif :

La première dose.

Puis la dose est augmentée progressivement pour équilibrer le taux de vitamine K dans le corps.

Les modifications de posologie doivent être réalisées progressivement, sous surveillance médicale.

Mode d'administration. VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration. La prise régulière et sans oublier de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement.

L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour. Il est préférable de la prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose lorsque possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez les recommandations de votre médecin.

Durée du traitement. Selon prescription.

Le comprimé peut être

الدواء الموصى به  
لـ سينتروم 4 مجم

4 مجم

3 مجم

Sintrom® 4 mg  
Adefoset pegol 10 comprimés



Médicament autorisé N° : 51217DMP/21/NF

PPV : 20,00

Exp :

N° Lot :

alimentation de la ration de ces

la partie de cet

très e.

ISSE TRE UN

r des

es et nt, en

les appaides

stra-

que «

tion.

INR,

ain, si

strat-

que «

tion.

INR,

ain, si

strat-

que «

tion.

INR,

ain, si

DM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

umarol

Pour les patients soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Il contient des informations importantes pour vous.

- Gardez [REDACTED] comment des informations importantes pour vous.  
• Si vous [REDACTED] vous pourriez avoir besoin de la relire.  
• Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre  
médecin ou à votre pharmacien.  
• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas  
à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de  
leur maladie sont identiques aux vôtres.

**-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.**

1. Que contient cette notice ?
  2. Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
  3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
  4. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
  5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  6. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
  7. Informations supplémentaires.

#### **1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

- CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITÉ :**

### **• Indications thérapeutiques**

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie.

- phlébite (caillot dans une veine),
  - embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
  - maladies cardiaques communes : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prolifération des valves cardiaques.

• certains infarctus du myocarde.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A PRENDRE SUR TROMASOL?**

- PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé?** Le plus tôt possible, au moins une heure avant le repas.

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament : Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### **Contre indications**

**Ne prenez jamais Sintrom 4 mg. comprimé dans les cas suivants :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;
  - En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie);
  - En cas d'association avec les médicaments suivants :
    - l'aspirine à fortes doses,
    - le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale;
    - les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires et/ou analgésiques.

sont pas interdits  
manière régulière.  
Durant le traitement,  
excessive d'alcool.  
Sintrom sur votre ordinateur.  
**Interaction avec les médicaments**  
Sans objet.

**Utilisation pendant la grossesse.** Prévention des malformations. En cas de besoin d'un anticoagulant pendant la grossesse. Si vous souhaitez faire l'allaitement en particulier, votre médecin ou un autre professionnel de la santé peut vous conseiller sur la meilleure façon de faire. Il peut également vous prescrire un médicament pour faciliter l'allaitement.

## **MEDICAMENT.**

### **Sportifs :**

**Evitez les sports**

**Efet sur l'aptitude à conduire**  
SINTROM n'a pas d'effets secondaires qui pourraient empêcher la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines.

#### Ce médicament patients présentant

- patients présentent ou un syndrome héréditaire rare

**3. COMMENT POSER**

  - Instruction posologique, modalités et durée de la posologie
  - Respectez stricte-  
ment les mises en garde
  - A titre indicatif : La première dose Puis la dose est fixée pour équilibrer les modifications possibles celui qui Mode d'administration

**VOIE ORALE :** avaler les comprimés avec un verre d'eau.

**Fréquence d'administration**  
La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.  
Une prise par jour il est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose si nécessaire, aussitôt après les résultats de l'INR.  
Prenez-le la même heure tous les jours, à la fin de la pause de votre médecin.

Dans tous les cas,  
Durée du traitement  
Selon prescription

**Sinstrom®** 4 mg  
Adefovir disodium 10 comprimés

Médicament autorisé N° : 512/17DMP/21/NR

# SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

umaryl

Pour les patients soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Il contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

4. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

• phlébite (caillot dans une veine),  
• embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),  
• maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,  
• certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;

• En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;

• En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,  
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,

- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

sont pas interdits, manière régulière et sans oublier de ce médicament. Durant le traitement, il est recommandé d'éviter l'interaction avec les médicaments suivants : Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement.

En général, l'utilisation de Sintrom sur votre enfant n'est pas recommandée.

En cas de besoin, il est recommandé d'utiliser un autre anticoagulant.

Si vous souhaitez prendre Sintrom pendant l'allaitement, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

Particularités de l'utilisation de Sintrom pendant l'allaitement.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

En cas de grossesse, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

الدواء الموصى به

دواء موصى به

Sintrom® 4 mg  
Anotilacumarol 10 comprimés



Médicament autorisé N° : 51217DMP/21/NF

alimentation de  
n de  
es  
nt la  
inte  
cet

très  
e.  
SSE  
TRE  
UN

des  
es et  
nt, en

les  
app  
ides

stra-  
que «

tion,  
INR,  
ain, si

PPV : 20,00

Exp :

N° Lot :

181187

DM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

umarol

Pour les patients soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Il contient des informations importantes pour vous.

- Gardez [REDACTED] contient des informations importantes pour vous. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice ?
  2. Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
  3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
  4. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
  5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  6. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
  7. Informations supplémentaires.

#### **1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

- CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITÉ :**

#### **• Indications thérapeutiques**

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie.

- phlébite (caillot dans une veine),
  - embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
  - maladies cardiaques communes : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prolifération des valves cardiaques.

• certains infarctus du myocarde.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A PRENDRE SUR TROMASOL?**

- PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé?**

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament : Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### **Contre indications**

**Ne prenez jamais Sintrom 4 mg. comprimé dans les cas suivants :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;
  - En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie);
  - En cas d'association avec les médicaments suivants :
    - l'aspirine à fortes doses,
    - le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale;
    - les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires et/ou analgésiques.

sont pas interdits  
manière régulière.  
Durant le traitement,  
excessive d'alcool.  
Sintrom sur votre ordinateur.  
**Interaction avec les médicaments**  
Sans objet.

**Utilisation pendant la grossesse.** Prévention des malformations. En cas de besoin d'un anticoagulant pendant la grossesse. Si vous souhaitez faire l'allaitement en particulier, votre médecin ou un autre professionnel de la santé peut vous conseiller sur la meilleure façon de faire. Il peut également vous prescrire un médicament pour faciliter l'allaitement.

**MEDICAMENT.**  
**Sportifs :**  
Evitez les sports  
traumatismes

**traumatiques.**  
**Effet sur l'aptitude à utiliser des machines.** Gardez sur vous cas d'éventuelles excitations. Ce médicament

Ce médicament patients présente

- ou un syndrome héréditaire rare.  
**3. COMMENT POSOLOGIE**  
Instruction posologique, mode de posologie et durée du Posologique. Respectez strictement les instructions. Misés en garde à titre indicatif : La première dose. Puis la dose est fixe pour équilibrer les modifications physiologiques cellulaires. Mode d'administration.

**VOIE ORALE** : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration : une prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe. Une prise par jour il est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse évaluer la dose la plus possible après les résultats de l'INR. Prenez toujours ce médicament en présence de votre médecin.

Dans tous les cas,  
Durée du traitement  
Selon prescription

Médecin autorisé N° 542147000000000000

meudicain en tant que « praticien autorisé N : 3121/DMP/21/NP ». Il peut ainsi dans le cadre de son activité de médecin traitant.

# SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

umaryl

Pour les patients soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Il contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

4. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

• phlébite (caillot dans une veine),  
• embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),  
• maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,  
• certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).  
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;

• En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie);

• En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,  
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,

- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

sont pas interdits, manière régulière et sans excès. Durant le traitement excessif d'alcool, Sintrom sur votre ordinateur. Interaction avec les médicaments. Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse. Prévention.

En cas de besoin d'un anticoagulant pendant

Si vous souhaitez prendre particulier, votre trousseau. L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON OU L'AUTRE, OU MEDICAMENT.

Sportifs : Evitez les sports de contact.

Effet sur l'aptitude à conduire. Sintrom n'a pas d'effet sur l'aptitude à utiliser des machines.

Gardez sur vous le cas d'éventuelle urgence.

Excipients à effet secondaire. Ce médicament contient des patients présentant un syndrome héréditaire rare.

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Instruction pour la posologie, mode de administration et durée du

Posologie. Respectez strictement les instructions.

Mises en garde et précautions. A titre indicatif :

La première dose.

Puis la dose est augmentée progressivement pour équilibrer le taux de vitamine K dans le corps.

Les modifications de posologie doivent être réalisées progressivement, sous surveillance médicale.

Mode d'administration. VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration. La prise régulière et sans oublier de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement.

L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour. Il est préférable de la prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose lorsque possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez les recommandations de votre médecin.

Durée du traitement. Selon prescription.

Le comprimé peut être

الدواء الموصى به  
لـ سينتروم 4 مجم

4 مجم

3 مجم

Sintrom® 4 mg  
Adefoset pegol 10 comprimés



Médicament autorisé N° : 51217DMP/21/NF

PPV : 20,00

Exp :

N° Lot :

alimentation de la ration de ces

la partie de cet

très e.

ISSE TRE UN

r des

es et nt, en

les appaides

stra-

que «

tion.

INR,

ain, si

strat-

que «

tion.

INR,

ain, si

strat-

que «

tion.

INR,

ain, si



# SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

umaryl

Pour les patients soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Il contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

4. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

• phlébite (caillot dans une veine),  
• embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),  
• maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,  
• certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;

• En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;

• En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,  
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,

- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

sont pas interdits, manière régulière et sans oublier de ce médicament. Durant le traitement, il est recommandé d'éviter l'interaction avec le Sintrom sur votre appareil. Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse, l'allaitement et l'interaction avec les médicaments.

En général, l'utilisation de Sintrom n'est pas recommandée.

En cas de besoin, il est recommandé d'utiliser un autre anticoagulant.

Si vous souhaitez prendre Sintrom pendant l'allaitement, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien.

MEDECIN OU MEDICAMENT.

Sportifs : Evitez les sports qui impliquent des risques de traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire : Sintrom n'a pas d'effet sur l'aptitude à conduire.

Gardez sur vous un cas d'urgence.

Excipients à effet secondaire : Ce médicament contient des excipients qui peuvent provoquer des réactions allergiques.

Ce médicament est destiné aux patients présentant un état de coagulation héréditaire rare.

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Instruction pour la prise du médicament.

Posologie, mode de prise et durée du traitement.

Posologie : Respectez strictement les instructions du fabricant.

Mises en garde : A titre indicatif : La première dose.

Puis la dose est augmentée pour équilibrer le taux de vitamine K.

Les modifications doivent être faites par le seul professionnel qui a prescrit le médicament.

Mode d'administration : VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration : La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement.

L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour. Il est préférable de la prendre le soir, afin que votre corps puisse modifier la dose au maximum possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez les recommandations de votre pharmacien.

Durée du traitement : Selon la prescription.

Le comprimé peut être pris avec ou sans manger.

4. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

Conseils pour la conservation : Conservez ce médicament à température ambiante, entre 15 et 30 degrés Celsius.

Ne pas le garder dans un endroit humide ou exposé au soleil.

Conseils pour la conservation : Conservez ce médicament à température ambiante, entre 15 et 30 degrés Celsius.

الدواء الموصى به

٤٣

Sintrom® 4 mg  
Adefosetromatol 10 comprimés



Médicament autorisé N° : 51217DMP/21/NF

alimentation de  
n de  
res

nt la  
inte  
cet  
très  
e.

ISSE  
TRE  
UN

r des  
es et  
nt, en

les  
app  
ides

stra-  
que «

tion.  
INR,  
ain, si

PPV : 20,00

Exp :

N° Lot :

# NEBILET® 5 mg

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

## NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

**La substance active est :**

Nébivolol ..... 5,00 mg  
 Sous forme de chlorhydrate de nébivolol ..... 5,45 mg  
 pour un comprimé quadrisécable

**Les autres composants sont :**

Polysorbate 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

## 1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

### ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadrisécable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle.

(un médicament de traitement du cancer). Médicaments pour l'estomac ou les repas, par exemple la cétirizine peut être pris pendant un repas.

V140977/01

\* VIGNETTE dans le

**NEBILET® 5mg**  
 28 comprimés O  
 PPV 87DH50

L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

## 3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable ?

### Hypertension

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

### Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/4 de comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, selon la prescription de votre médecin.

Si le médicament est bien toléré, la posologie peut être augmentée.

# NEBILET® 5 mg

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

## NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

**La substance active est :**

Nébivolol ..... 5,00 mg  
 Sous forme de chlorhydrate de nébivolol ..... 5,45 mg  
 pour un comprimé quadrisécable

**Les autres composants sont :**

Polysorbate 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

## 1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

### ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadrisécable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle.

(un médicament de traitement du cancer). Médicaments pour l'estomac ou les repas, par exemple la cétirizine peut être pris pendant un repas.

V140977/01

\* VIGNETTE dans le

**NEBILET® 5mg**  
 28 comprimés O  
 PPV 87DH50

L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

## 3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable ?

### Hypertension

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

### Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/4 de comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, selon la prescription de votre médecin.

Si le médicament est bien toléré, la posologie peut être augmentée.

# NEBILET® 5 mg

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

## NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

**La substance active est :**

Nébivolol ..... 5,00 mg  
 Sous forme de chlorhydrate de nébivolol ..... 5,45 mg  
 pour un comprimé quadrisécable

**Les autres composants sont :**

Polysorbate 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

## 1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

### ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadrisécable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle.

(un médicament de traitement du cancer). Médicaments pour l'estomac ou les repas, par exemple la cétirizine peut être pris pendant un repas.

V140977/01

\* VIGNETTE dans le

**NEBILET® 5mg**  
 28 comprimés O  
 PPV 87DH50

L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

## 3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable ?

### Hypertension

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

### Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/4 de comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, selon la prescription de votre médecin.

Si le médicament est bien toléré, la posologie peut être augmentée.