

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES RÉJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1608 Société : RAM 134828

Actif Pensionné(e) Autre : A220021 - EL IDRISI

Nom & Prénom : EL IDRISI My TANAR

Date de naissance : 1950

Adresse : Rue Ahmed Kadmiri Res. Nadia Im D. App 13 Casablanca

Tél. : 0663082895 Total des frais engagés : 1696,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : 

Date de consultation : 20/10/2017

Nom et prénom du malade : Explorations Neurophysiologiques Cliniques (EEG - ENMG) Email: rim.rim@gmail.com

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Explorations Neurophysiologiques Cliniques (EEG - ENMG) Email: rim.rim@gmail.com

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie : Explorations Neurophysiologiques Cliniques (EEG - ENMG) Email: rim.rim@gmail.com

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : Explorations Neurophysiologiques Cliniques (EEG - ENMG) Email: rim.rim@gmail.com

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 08/10/2017

Le : 17/10/2017

Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/03/2022 04/04/2022	3	350,00	Dr. RIM, Neurologue Explorations Neurophysiologiques Cliniques (EEG - ENR) Tél: 06 72 76 08 04 Email: agathe_rim@gmail.com	Dr. RIM, Neurologue Explorations Neurophysiologiques Cliniques (EEG - ENR) Tél: 06 72 76 08 04 Email: agathe_rim@gmail.com

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	20/09/22	1696,12

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF

O.D.F
PROTHESES DENTAIRE

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

A diagram of a dental arch (maxilla) with 16 numbered teeth. The teeth are arranged in four quadrants: upper right (1-4), upper left (5-8), lower right (9-12), and lower left (13-16). The diagram includes labels: 'H' at the top center, 'D' on the left side, 'B' at the bottom center, and 'C' on the right side. Arrows point from 'D' to the upper left teeth and from 'C' to the upper right teeth. The teeth are represented by circles with numbers and some with additional symbols like 'Y' or 'H'.

[Création, remont, adjonction]

fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Casablanca, le

10/09/22

Docteur : AZZOUI EL IDRISI My Tahar

1) Modopar 125 mg q

14 14 14 14 14 14 14 14
D D 14h 14h 14h 14h 14h 14h
7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h

$$110,50 \times 4 = 442,0$$

2) Trinastal 50 mg q

0 - 0 - 1

14h 22h

(SV)

3) Pantadix 100 mg q

14 - 0 - 1
D 36,40 x 20 = 688
9h 14h

4) Motilium 10 mg q

D 14h
7h 13h

NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA
Angle Rue de l'Isère et Rue N° 2
Quartier Bagatelle - Casablanca
Tél: 05 22 82 11 11

3 mois

5) Cilentra 10mg cp

1 - 0,5 - 0
D
gr

$126,00 \times 3 = 378$
SV

6) ALpraz 0,5mg cp $35,70 \times 4 = 142,80$

0 - 0 - 1/2

7) Duphalac sirop $\Delta_{22,5}$
2 càs x 31° si constipation

$45,60 \times 1$

1696,0

NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA
Angle Rue de l'Isère et Rue N° 2
Quartier Bagatelle - Casablanca
Tél: 05 22 82 11 11 - Casablanca

Dr. Rim AMZIZ
Neurologue
Explorations Neurophysiologiques (EEG, EMG)

Tél: 06 72 16 08 04

Email: amzikir@outlook.com

PHARMACIE ET PARAPHARMACIE
ROUTE D'EL JADIDA
140, Bd Brahim Roudani
Casablanca
Tél: 05 22 99 57 46

- **Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la plus tard.**
- **Si vous avez des doutes, demandez des informations plus détaillées au votre médecin.**
- **Si vous avez des questions, demandez des informations plus détaillées au votre médecin.**
- **Quelles sont les effets indésirables éventuels ?**
- **Si l'un des effets indésirables décrits plus haut vous empêche de prendre le médicament, contactez votre pharmacien.**
- **Le médicament peut être prescrit par votre pharmacien pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.**
- **Le médicament peut être pris dans votre maison.**
- **Si l'un des effets indésirables décrits plus haut vous empêche de prendre le médicament ou si vous avez des questions, contactez votre pharmacien.**

50 mg LP
Inhalation prolongée
DIL 50 mg LP

WHAT IS SEROPLEX 10 mg. SCORED FILM COATED TABLET, AND WHEN IS IT USED?

This medicine is presented in the form of scored film coated tablet in boxes of 28 or 14 tablets.

ANTIDEPRESSANT/SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITOR

This medicine is an antidepressant. It is indicated in:

- the treatment of major depressive episodes,
 - the treatment of panic disorder
 - the treatment of social phobia

WHAT ARE THE INFORMATION FILM COATED TABLET?

Never take SEROPILEX® 10 mg.

- allergy to escitalopram or one combination with some other iproniazide).

Warn your doctor in case of suicide or depression treatment.

This medicine is not recommended in children and adolescents under 18 years.

Be cautious:

- in case of liver disease or diabetes,
 - in case of manic disorder,
 - in case of epilepsy or history of convulsions.

The occurrence or increase in the frequency of convulsive seizures requires stopping the treatment.

- in case of a history of coagulation anomalies, haemorrhage tendency or treatment with medicine which may increase the risk of bleeding (oral anticoagulants, some non-steroid anti-inflammatories, aspirin, tricyclic antidepressants, ticlopidine, dipyridamole, etc.),
 - if you suffer from severe kidney failure,
 - if you suffer from a heart disease (angina pectoris),
 - in case of breast-feeding.

Food and drink

It is unadvisable to drink alcohol during the treatment.

Pregnancy

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

It is preferable not to use this medicine during pregnancy.

Consult your doctor if you find out you are pregnant during the treatment.

Breast-feeding

The use of this medicine is unadvisable in case of breast-feeding.

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

Driving vehicles and using machinery:

SEROPLEX does not provoke drowsiness. However, after taking this medicine, like for any other new medicine, be careful when driving a vehicle or using a machine, as long as you do not know your sensitivity to this product.

Administration or utilization of other medicines:

Please inform your doctor or pharmacist if you are taking or have taken recently another medicine, including over the counter medication.

You must not take this medicine at the same time as



ALPRAZ 0.5 mg et 1 mg

Comprimés sécables

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question ou si vous avez un doute, demandez à votre médecin ou à un pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez à personne, sauf à quelqu'un d'autre présentant des symptômes identiques ou similaires.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés ci-dessous est grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALPRAZ, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique ANXIOLYTIQUE

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

Cosé-contraindications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance au sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ALPRAZ, comprimé sécable si :

LOT 213479 1
EXP 10/2024
PP/ 3570

En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,
- dose,
- antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires,

mais on peut observer agitation, une irritabilité, un engourdissement des extrémités, une perte d'appétit, au bruit, à la lumière, à la chaleur, etc... Les modalités d'arrêt doivent être définies. La diminution progressive des doses et l'espacement des doses représentent la meilleure manière de faire cesser ce phénomène.

Le sevrage peut être accompagné d'autre symptômes, mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait une dépendance pour qu'il se produise. Cependant, il peut se produire dans certains cas.

Si une personne souffrant de dépendance survenue au cours de l'utilisation de ce médicament, il est recommandé de la faire cesser progressivement.

Les troubles de mémoire et les altérations des fonctions cognitives sont susceptibles d'apparaître dans les 24 à 48 heures qui suivent la prise de ce médicament. Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions secondaires, parfois recherchées : insomnie, anxiété, étourdissement, tension artérielle élevée, modification de l'humeur, étourdissement, voire des comportements délirants ou agressifs. Ces réactions peuvent survenir dans les 24 à 48 heures qui suivent la prise de ce médicament.

Si une ou plusieurs réactions secondaires surviennent, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Les benzodiazépines peuvent entraîner des effets secondaires tels que somnolence et/ou dépression, qui peuvent favoriser l'insomnie et les conséquences souhaitées de la prise de ce médicament. Ces effets secondaires peuvent survenir chez tous les patients, mais sont plus courants chez les personnes âgées et celles qui ont une maladie chronique ou une affection neurologique.

En raison de la présence de benzodiazépines dans ce médicament, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament si vous avez une maladie de l'œil, une maladie de l'oreille, une maladie de la peau, une maladie de la tête ou un état de dépression. Il est également recommandé de ne pas prendre ce médicament si vous avez une maladie de l'œil, une maladie de l'oreille, une maladie de la peau, une maladie de la tête ou un état de dépression.

La prise de ce médicament peut entraîner des effets secondaires tels que somnolence et/ou dépression, qui peuvent favoriser l'insomnie et les conséquences souhaitées de la prise de ce médicament. Ces effets secondaires peuvent survenir chez tous les patients, mais sont plus courants chez les personnes âgées et celles qui ont une maladie chronique ou une affection neurologique.

ALPRAZ 0.5 mg et 1 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez toute anxiété ou tout doute, demandez à votre médecin ou à un pharmacien.
 - Ce médicament vous a été prescrit. Ne l'offrez pas à quelqu'un d'autre. Si les symptômes identiques peuvent être nocifs.
 - Si l'un des effets indésirables est grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
 3. COMMENT PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
 5. COMMENT CONSERVER ALPRAZ, comprimé sécable ?
 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique ANXIOLYTIQUE

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS
A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
ALPRAZ, comprimé sécable ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance au sucre, contactez le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ALPRAZ, comprimé



En cas de doute, il est préférable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,
 - dose,
 - antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires,

mais on peut observer l'agitation, une irritabilité, un engourdissement des extrémités, un ronflement, un bruit, à la lumière des symptômes physiques, etc... Les modalités doivent être définies. La diminution des doses et l'essai représentent la partie la plus importante de ce phénomène.

d'autant plus que l'entraînement aura pour effet de déclencher un phénomène qui peut se produire dans le SITOIRE des personnes qui auraient justifié leur entraînement.

Les troubles de mémoire et les altérations des fonctions psychiques sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise d'alcool. Chez certains sujets, il peut provoquer des réactions de type psychotique recherché : insomnie, agitation, nervosité, état de tension, modification de l'humeur, voire des comportements dangereux (agressivité, violence) ou son entourage, ainsi que des modifications du comportement automatiques.

Si une ou plusieurs surviennent, contactez possible votre médecin. Les benzodiazépines doivent être utilisées avec le sujet âgé, en raison de la somnolence et/ou de nausées qui peuvent favoriser des conséquences pour la population.

En raison de la présence d'un sucre dans le médicament, il ne doit pas être donné à un enfant atteint de galactosémie, malabsorption du glucose ou de déficit en enzymes métaboliques rares. **Précautions d'emploi:**

Precautions d'emploi

La prise de ce médicament suivi médical renforce l'insuffisance rénale, du foie, d'alcoolisme et respiratoire.

ALPRAZ 0.5 mg et 1 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez toute autre chose à demander à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a-t-il causé des symptômes identiques à ceux mentionnés dans la section "Effets indésirables" ? Si oui, parlez-en à votre pharmacien.
 - Si l'un des effets indésirables mentionnés dans la section "Effets indésirables" est très grave ou si vous remarquez d'autres effets indésirables non mentionnés dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
 3. COMMENT PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
 5. COMMENT CONSERVER ALPRAZ, comprimé sécable ?
 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

**Classe pharmacothérapeutique
ANXIOLYTIQUE**

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS
A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
ALPRAZ, comprimé sécable ?**

Si votre médecin vous

Si votre médecin vous a informé(s) d'une intolérance au sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ALPRAZ, comprimé



En cas de doute, il est préférable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,
 - dose,
 - antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à
votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires.

mais on peut observer l'agitation, une irritabilité, un engourdissement des extrémités, un ronflement, un bruit, à la lumière des symptômes physiques, etc... Les modalités doivent être définies. La diminution des doses et l'essai représentent la partie la plus importante de ce phénomène.

d'autan-
ent aura-
la décre-
un phénomè-
peut se prod-
SITOIRE des
raient justifié
ment.

Les troubles de mémoire et les altérations des fonctions mentales sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise d'alcool. Chez certains sujets, il peut provoquer des réactions de type psychotique recherché : insomnie, agitation, nervosité, état de tension, modification de l'humeur, voire des comportements dangereux (agressivité, violence) ou son entourage, ainsi que des modifications du comportement automatiques).

Si une ou plusieurs
surviennent, contactez
possible votre médecin.
Les benzodiazépines doivent être utilisées avec
le sujet âgé, en raison de leur somnolence et/ou de leurs effets secondaires qui peuvent favoriser des conséquences graves dans la population.

En raison de la présence d'un sucre dans le médicament, il ne doit pas être donné à un enfant atteint de galactosémie, malabsorption du glucose ou de déficit en enzymes métaboliques rares. **Précautions d'emploi:**

La prise de ce médicament est contre-indiquée en cas de suivi médical renforcé d'insuffisance rénale, du foie, d'alcoolisme et de maladie respiratoire.



ALPRAZ 0.5 mg et 1 mg

Comprimés sécables

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question ou si vous avez un doute, demandez à votre médecin ou à un pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez à personne, sauf si quelqu'un d'autre présente des symptômes identiques ou similaire.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés ci-dessous est grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALPRAZ, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique ANXIOLYTIQUE

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

Cosé-contraindications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance au sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ALPRAZ, comprimé sécable si :

LOT 213479 1
EXP 10/2024
PP 1 3570

En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,
- dose,
- antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires,

mais on peut observer agitation, une irritabilité, un engourdissement des extrémités, une perte d'appétit, au bruit, à la lumière, à la chaleur, etc... Les modalités d'arrêt doivent être définies. La diminution progressive des doses et l'espacement des doses représentent la meilleure manière de faire cesser ce phénomène.

Le sevrage peut être accompagné d'autre symptômes, mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait une dépendance pour qu'il se produise. Cependant, il peut se produire dans certains cas.

SITOIRE des symptômes

Les symptômes peuvent être justifiés par d'autres causes.

Les troubles de mémoire, les altérations des fonctions cognitives, les symptômes psychologiques et physiques sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise de ce médicament. Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions secondaires, parfois recherchées, mais également indésirables : insomnie, agitation, nervosité, étourdissement, tension, modifications de l'humeur, voire des comportements agressifs ou délirants, ou comportements automatisques.

Si une ou plusieurs réactions secondaires surviennent, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Les benzodiazépines peuvent entraîner des effets secondaires indésirables. Ils doivent être utilisés avec prudence chez les personnes âgées, en cas de somnolence et/ou de confusion mentale, qui peuvent favoriser des accidents et des conséquences pour la santé de la population.

En raison de la présence d'effets secondaires indésirables, ce médicament ne doit pas être pris par les personnes souffrant de galactosémié, de malabsorption du glucose, ou de déficit en enzymes métaboliques rares.

Précautions d'emploi

La prise de ce médicament doit être suivie d'un suivi médical renforcé, en cas d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque, de maladie du foie, d'alcoolisme et de maladie respiratoire.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Dompéridone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament pour

- Gar
 - Si v
 - pha
 - Ce
 - pas
 - sig
 - Si v
 - méd
 - indé
 - rique



Que contient *Canis lupus*?

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03EA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
 - si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des crampes abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
 - si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
 - si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
 - si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
 - si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
 - si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
 - si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
 - si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILILUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
• souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
• souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses supérieures à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Autres médicaments et MOTILIMUM 10 mg, comprimé pelliculé
Ne prenez jamais MOTILIMUM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocozaole oral, le fluconazole ou le posaconazole ou le voriconazole ;
 - infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofoxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
 - problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalioïl, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
 - psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
 - dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
 - troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
 - allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
 - paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
 - VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
 - hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
 - cancer (par exemple le torémifène, le vandétanib, la vincarmine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bépridil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Dompéridone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament pour

- Gar
 - Si v
 - pha
 - Ce
 - pas
 - sig
 - Si v
 - méd
 - indé
 - rique



Que contient ce

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1- QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03EA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6;
 - si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des douleurs abdominales sévères ou des selles noires persistantes;
 - si vous avez les intestins obstrués ou perforés;
 - si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome);
 - si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie;
 - si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé";
 - si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque);
 - si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang;
 - si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILIMIN 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
• souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
• souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses supérieures à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Autres médicaments et MOTILIM® 10 mg, comprimé pelliculé
Ne prenez jamais MOTILIM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocozaole oral, le fluconazole ou le posaconazole ou le voriconazole ;
 - infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofoxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
 - problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalioïl, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
 - psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
 - dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
 - troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
 - allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
 - paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
 - VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
 - hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
 - cancer (par exemple le torémifène, le vandétanib, la vincarmine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bépridil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Domperidone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez ce
- Si vous prenez ce
- Cela ne
- pas de
- si vous
- Si vous



ou votre pharmacien pour

ne donnez pas de

ne si les

à votre pharmacien

tout effet secondaire. Voir rubrique 4.

Que contient ce médicament ?

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03FA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des douleurs abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
- si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
- si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
- si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
- si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
- si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
- si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
- si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
 - souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
 - souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble du rythme cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses élevées à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement par MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans et pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Ne prenez jamais MOTILIUM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocanazole oral, le fluconazole, le posaconazole ou le voriconazole ;
- infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofloxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
- problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalol, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
- psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
- dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
- troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
- allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
- paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
- VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
- hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
- cancer (par exemple le torémifène, le vandéritanib, la vincamine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bêpirdil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Domperidone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez ce
- Si vous prenez ce
- Cela ne
- pas de
- si vous
- Si vous



ou votre pharmacien pour

ne donnez pas de

à votre pharmacien

tout effet secondaire. Voir rubrique 4.

Que contient ce médicament ?

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03FA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des douleurs abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
- si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
- si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
- si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
- si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
- si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
- si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
- si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
 - souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
 - souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble du rythme cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses élevées à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement par MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans et pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Ne prenez jamais MOTILIUM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocanazole oral, le fluconazole, le posaconazole ou le voriconazole ;
- infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofloxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
- problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalol, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
- psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
- dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
- troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
- allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
- paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
- VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
- hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
- cancer (par exemple le torémifène, le vandéritanib, la vincamine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bêpirdil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Dompéridone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament pour

- Gar
 - Si v
 - pha
 - Ce
 - pas
 - sig
 - Si v
 - méd
 - indé
 - rique



Que contient ce tableau ?

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03EA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
 - si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des crampes abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
 - si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
 - si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
 - si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
 - si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
 - si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
 - si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
 - si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILILUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
• souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
• souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses supérieures à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Autres médicaments et MOTILIMUM 10 mg, comprimé pelliculé
Ne prenez jamais MOTILIMUM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétococonazole oral, le fluconazole ou le voriconazole ; infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofoxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ; problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalol, l'hydroquinidine, la quinidine) ; psychose (par exemple l'haloperidol, le pimozide, le sertindole) ; dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ; troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ; allergie (par exemple la méciquazine, la mizolastine) ; paludisme (en particulier l'halofantrine, la lumefantrine) ; VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ; hépatite C (par exemple le télaprévir) ; cancer (par exemple le torémifène, le vandébanib, la vincamine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bépridil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Dompéridone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament pour

- Gar
 - Si v
 - pha
 - Ce
 - pas
 - sig
 - Si v
 - méd
 - indé
 - rique



Que contient ce

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1- QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03EA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6;
 - si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des douleurs abdominales sévères ou des selles noires persistantes;
 - si vous avez les intestins obstrués ou perforés;
 - si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome);
 - si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie;
 - si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé";
 - si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque);
 - si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang;
 - si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILIM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
• souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
• souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses supérieures à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Autres médicaments et MOTILIMUM 10 mg, comprimé pelliculé
Ne prenez jamais MOTILIMUM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocozaole oral, le fluconazole ou le posaconazole ou le voriconazole ;
 - infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofoxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
 - problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalioïl, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
 - psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
 - dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
 - troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
 - allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
 - paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
 - VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
 - hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
 - cancer (par exemple le torémifène, le vandétanib, la vincarmine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bépridil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Domperidone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez ce
- Si vous prenez ce
- Cela ne
- pas de
- si vous
- Si vous



ou votre
a donnéz
ne si les
en à votre
tout effet
a. Voir rub-

Que contient ce

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03FA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des douleurs abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
- si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
- si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
- si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
- si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
- si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
- si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
- si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
 - souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
 - souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble du rythme cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses élevées à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans et pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Ne prenez jamais MOTILIUM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocanazole oral, le fluconazole, le posaconazole ou le voriconazole ;
- infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofloxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
- problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalol, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
- psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
- dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
- troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
- allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
- paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
- VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
- hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
- cancer (par exemple le torémifène, le vandéritanib, la vincamine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bêpirdil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Domperidone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez ce
- Si vous prenez ce médicament pour la première fois, il peut provoquer des effets indésirables tels que la nausée, le vomissement, la diarrhée et la constipation. Si ces effets persistent ou si vous avez des douleurs abdominales, consultez votre pharmacien ou votre médecin.
- Cet effet indésirable peut être temporaire et disparaître au bout de quelques jours. Si les symptômes persistent ou si vous avez des douleurs abdominales, consultez votre pharmacien ou votre médecin.
- Si ce médicament provoque des effets indésirables, il peut être nécessaire de l'arrêter et de prendre d'autres médicaments.



Que contient ce médicament ?

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03FA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des douleurs abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
- si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
- si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
- si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
- si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
- si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
- si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
- si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
 - souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
 - souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin car de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses élevées à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement par MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans et pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Ne prenez jamais MOTILIUM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocanazole oral, le fluconazole, le posaconazole ou le voriconazole ;
- infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofloxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
- problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalol, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
- psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
- dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
- troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
- allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
- paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
- VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
- hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
- cancer (par exemple le torémifène, le vandéritanib, la vincamine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bêpirdil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Domperidone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez ce
- Si vous prenez ce
- Cela ne
- pas de
- si vous
- Si vous



ou votre
a donnéz
ne si les
en à votre
tout effet
a. Voir rub-

Que contient ce

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03FA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des douleurs abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
- si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
- si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
- si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
- si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
- si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
- si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
- si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
 - souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
 - souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble du rythme cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses élevées à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans et pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Ne prenez jamais MOTILIUM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocanazole oral, le fluconazole, le posaconazole ou le voriconazole ;
- infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofloxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
- problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalol, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
- psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
- dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
- troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
- allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
- paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
- VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
- hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
- cancer (par exemple le torémifène, le vandéritanib, la vincamine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bêpirdil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Dompéridone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament pour

- Gar
 - Si v
 - pha
 - Ce
 - pas
 - sig
 - Si v
 - méd
 - indé
 - rique



Que contient ce

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1- QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03EA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
 - si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des crampes abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
 - si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
 - si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
 - si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
 - si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
 - si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
 - si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
 - si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILILUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
• souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »);
• souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses supérieures à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé
Ne prenez jamais MOTILIUM si vous prenez des médicaments pour traiter les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocozaole oral, le fluconazole ou le posaconazole ou le voriconazole ;
 - infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofoxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
 - problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalioïl, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
 - psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
 - dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
 - troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
 - allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
 - paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
 - VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
 - hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
 - cancer (par exemple le torémifène, le vandétanib, la vincarmine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bépridil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Dompéridone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament pour

- Gar
 - Si v
 - pha
 - Ce
 - pas
 - sig
 - Si v
 - méd
 - indé
 - rique



Que contient ce

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03EA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
 - si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des crampes abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
 - si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
 - si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
 - si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
 - si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
 - si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
 - si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
 - si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILILUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIMUM si vous :

- souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIMUM 10 mg, comprimé pelliculé »);
- souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses supérieures à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments »).

MOTILILUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement par MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé
Ne prenez jamais MOTILIUM si vous prenez des médicaments pour traiter les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocozaole oral, le fluconazole ou le posaconazole ou le voriconazole ;
 - infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofoxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
 - problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalioïl, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
 - psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
 - dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
 - troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
 - allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
 - paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
 - VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
 - hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
 - cancer (par exemple le torémifène, le vandétanib, la vincarmine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bépridil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Domperidone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez ce
- Si vous prenez ce
- Cela ne
- pas de
- si vous
- Si vous



ou votre pharmacien pour

ne donnez pas de

ne si les

à votre pharmacien

tout effet secondaire. Voir rubrique 4.

Que contient ce médicament ?

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03FA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des douleurs abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
- si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
- si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
- si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
- si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
- si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
- si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
- si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
 - souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
 - souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble du rythme cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses élevées à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement par MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans et pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Ne prenez jamais MOTILIUM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocanazole oral, le fluconazole, le posaconazole ou le voriconazole ;
- infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofloxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
- problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalol, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
- psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
- dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
- troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
- allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
- paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
- VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
- hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
- cancer (par exemple le torémifène, le vandéritanib, la vincamine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bêpirdil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Domperidone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gar
 - Si v
 - pha
 - Ce
 - pas
 - sig
 - Si vi
 - méd
 - indés
 - rique



Que contient ce

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03EA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg comprimé pelliculé 2

Ne prenez jamais MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
 - si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des crampes abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
 - si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
 - si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
 - si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
 - si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
 - si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
 - si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
 - si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILIMUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
• souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »);
• souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin, car de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses supérieures à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou au SIDA (voir rubrique « Autres médicaments »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg
MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Autres médicaments et MOTILIM 10 mg, comprimé pelliculé
Ne prenez jamais MOTILIUM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocozaole oral, le fluconazole, le posaconazole ou le voriconazole ;
 - infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la tétracycline, la lénofloxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
 - problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalol, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
 - psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
 - dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
 - troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
 - allergie (par exemple la méciquazine, la mizolastine) ;
 - paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
 - VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
 - hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
 - cancer (par exemple le torémifène, le vandétanib, la vincamine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le héridil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Domperidone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez ce
- Si vous prenez ce
- Cela ne
- pas de
- si vous
- Si vous



ou votre
a donnéz
ne si les
en à votre
tout effet
a. Voir rub-

Que contient ce

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03FA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des douleurs abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
- si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
- si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
- si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
- si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
- si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
- si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
- si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
 - souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
 - souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble du rythme cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses élevées à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans et pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Ne prenez jamais MOTILIUM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocanazole oral, le fluconazole, le posaconazole ou le voriconazole ;
- infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofloxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
- problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalol, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
- psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
- dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
- troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
- allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
- paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
- VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
- hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
- cancer (par exemple le torémifène, le vandéritanib, la vincamine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bérépilid, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Dompéridone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament pour

- Gar
 - Si v
 - pha
 - Ce
 - pas
 - sig
 - Si v
 - méd
 - indé
 - rique



Que contient ce tableau ?

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03EA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
 - si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des crampes abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
 - si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
 - si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
 - si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
 - si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
 - si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
 - si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
 - si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILILUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
• souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
• souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses supérieures à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments »). MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ».

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Autres médicaments et MOTILIM® 10 mg, comprimé pelliculé
Ne prenez jamais MOTILIM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongic azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocozaclone oral, le fluconazole ou le posaconazole ou le voriconazole ;
 - infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lénofloxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
 - problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronédarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalol, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
 - psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
 - dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
 - troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
 - allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
 - paludisme (en particulier l'halofantrine, la lumefantrine) ;
 - VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
 - hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
 - cancer (par exemple le torémifène, le vandétanib, la vincarmine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bépridil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Dompéridone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament pour

- Gar
 - Si v
 - pha
 - Ce
 - pas
 - sig
 - Si v
 - méd
 - indé
 - rique



Que contient *Canis lupus*?

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1- QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03EA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6;
 - si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des douleurs abdominales sévères ou des selles noires persistantes;
 - si vous avez les intestins obstrués ou perforés;
 - si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome);
 - si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie;
 - si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé";
 - si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque);
 - si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang;
 - si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILIM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
• souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
• souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses supérieures à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Autres médicaments et MOTILIMUM 10 mg, comprimé pelliculé
Ne prenez jamais MOTILIMUM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocozaole oral, le fluconazole ou le posaconazole ou le voriconazole ;
 - infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofoxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
 - problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalioïl, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
 - psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
 - dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
 - troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
 - allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
 - paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
 - VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
 - hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
 - cancer (par exemple le torémifène, le vandétanib, la vincarmine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bépridil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Dompéridone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament pour

- Gar
 - Si v
 - pha
 - Ce
 - pas
 - sig
 - Si v
 - méd
 - indé
 - rique



Que contient ce

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1- QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03EA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6;
 - si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des douleurs abdominales sévères ou des selles noires persistantes;
 - si vous avez les intestins obstrués ou perforés;
 - si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome);
 - si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie;
 - si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé";
 - si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque);
 - si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang;
 - si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILIM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
• souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
• souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses supérieures à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans et aux enfants pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé
Ne prenez jamais MOTILIUM si vous prenez des médicaments pour traiter les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocozaole oral, le fluconazole ou le posaconazole ou le voriconazole ;
 - infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofoxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
 - problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalioï, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
 - psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
 - dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
 - troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
 - allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
 - paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
 - VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
 - hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
 - cancer (par exemple le torémifène, le vandétanib, la vincarmine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bépridil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Dompéridone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament pour

- Gar
 - Si v
 - pha
 - Ce
 - pas
 - sig
 - Si v
 - méd
 - indé
 - rique



Que contient ce

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1- QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03EA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
 - si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des crampes abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
 - si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
 - si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
 - si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
 - si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
 - si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
 - si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
 - si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILILUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
• souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
• souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses supérieures à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé
Ne prenez jamais MOTILIUM si vous prenez des médicaments pour traiter les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocozaole oral, le fluconazole ou le posaconazole ou le voriconazole ;
 - infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofoxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
 - problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalioïl, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
 - psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
 - dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
 - troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
 - allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
 - paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
 - VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
 - hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
 - cancer (par exemple le torémifène, le vandétanib, la vincarmine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bépridil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Domperidone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez ce
- Si vous prenez ce
- Cela ne
- pas de
- si vous
- Si vous



ou votre pharmacien pour

ne donnez pas de

ne si les

à votre pharmacien pour

tout effet secondaire. Voir rubrique 4.

Que contient ce médicament ?

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03FA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des douleurs abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
- si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
- si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
- si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
- si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
- si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
- si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
- si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
 - souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ») ;
 - souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin en cas de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble du rythme cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses élevées à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou le SIDA (voir rubrique « Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, des difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement par MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans et pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Ne prenez jamais MOTILIUM si vous prenez des médicaments pour les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétconazole oral, le fluconazole, le posaconazole ou le voriconazole ;
- infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lévofloxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
- problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la disopyramide, le dofetilide, le sotalol, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
- psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
- dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
- troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
- allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
- paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
- VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
- hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
- cancer (par exemple le torémifène, le vandéritanib, la vincamine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bêpirdil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

MOTILIUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Domperidone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gar
 - Si v
 - pha
 - Ce
 - pas
 - sig
 - Si vi
 - méd
 - indés
 - rique



Que contient *Canis lupus*?

1. Qu'est-ce que MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code ATC : A03EA03

Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MOTILIUM 10 mg comprimé pelliculé 2

Ne prenez jamais MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé :

- Ne prenez jamais MOTILIM 10 mg, comprimé pelliculé :

 - si vous êtes allergique à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
 - si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des crampes abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
 - si vous avez les intestins obstrués ou perforés ;
 - si vous avez une tumeur de la glande pituitaire (prolactinome) ;
 - si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
 - si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
 - si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
 - si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
 - si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et MOTILIM 10 mg, comprimé pelliculé »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre MOTILIUM si vous :
• souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir « Ne prenez jamais MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé »);
• souffrez de problèmes aux reins (défaillance des fonctions du rein ou insuffisance rénale). Vous devez demander conseil à votre médecin, car de traitement prolongé car vous devrez peut-être prendre une dose plus faible ou prendre ce médicament moins souvent et votre médecin pourra être amené à vous examiner régulièrement.

La dompéridone peut être associée à un risque accru de trouble cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses supérieures à 30 mg par jour. Le risque est également plus élevé lorsque la dompéridone est administrée avec certains médicaments. Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour des infections (infections fongiques ou bactériennes) et/ou si vous avez des problèmes au cœur ou au SIDA (voir rubrique « Autres médicaments »).

MOTILIUM doit être utilisé à la dose efficace la plus faible.

Pendant le traitement par MOTILIUM, contactez votre médecin si vous présentez des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations, difficultés à respirer, une perte de conscience. Le traitement MOTILIUM devra alors être arrêté.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg
MOTILIUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans pesant moins de 35 kg, ni aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces tranches d'âge.

Autres médicaments et MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé

Autres médicaments et MOTILIM 10 mg, comprimé pelliculé
Ne prenez jamais MOTILIUM si vous prenez des médicaments pour traiter les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pentamidine ou les antifongiques azolés, en particulier l'itraconazole, le kétocozaole oral, le fluconazole, le posaconazole ou le voriconazole ;
 - infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la clarithromycine, la téthiromycine, la lénofloxacine, la moxifloxacine, la spiramycine (ce sont des antibiotiques) ;
 - problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la dronedarone, l'ibutilide, la discopyramide, le dofetilide, le sotalol, l'hydroquinidine, la quinidine) ;
 - psychose (par exemple l'halopéridol, le pimozide, le sertindole) ;
 - dépression (par exemple le citalopram, l'escitalopram) ;
 - troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
 - allergie (par exemple la méquitazine, la mizolastine) ;
 - paludisme (en particulier l'halofantrine, la luméfantrine) ;
 - VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
 - hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
 - cancer (par exemple le torémifène, le vandétanib, la vincarmine).

Ne prenez pas MOTILIUM si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le bépridil, le diphémanil, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.

CILENTRA® 10 mg

(Escitalopram), comprimés pelliculés sécables

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament n'a pas d'effets secondaires.

Gardez cette notice.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QU'UN COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CILENTRA®?
3. COMMENT PRENDRE CILENTRA®?
4. QUELSSONT LES EFFETS SECONDAIRES?
5. COMMENT SE PRENDRE DES COMPRIMÉS PELLICULÉS SÉCABLES?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

CILENTRA® contient de l'escitalopram qui appartient à un groupe d'antidépresseurs appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS). Ces médicaments agissent sur le système sérotoninergique dans le cerveau en augmentant le taux de sérotonine. Les dysfonctionnements du système sérotoninergique sont considérés comme un facteur important dans le développement de la dépression et des pathologies associées.

CILENTRA® est indiqué dans le :

- traitement des épisodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés).
- traitement de la panique avec ou sans agoraphobie.
- traitement du trouble «anxiété sociale» (phobie sociale).
- traitement du trouble anxiété généralisée.
- traitement des troubles obsessionnels compulsifs.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables?

Ne prenez jamais CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables si :

- vous êtes allergique (hypersensible) à l'escitalopram ou à l'un des composants contenus dans CILENTRA®.
- vous prenez d'autres médicaments appartenant à la famille de la MAO, dont la sélegiline (utilisée dans le Parkinson), le moclobémide (utilisé dans le linezolid) (un antibiotique).

doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Adultes

Dépression

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

Trouble panique

La posologie initiale de CILENTRA® au cours de la première semaine de traitement est de 5 mg par jour en une prise, puis une augmentation à 10 mg par jour est effectuée. La posologie pourra être encore augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

Trouble anxiété sociale

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. Votre médecin pourra diminuer la posologie à 5 mg par jour ou l'augmenter jusqu'à un maximum de 20 mg par jour, selon votre réponse au traitement.

Trouble anxiété généralisée

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

Troubles obsessionnels compulsifs

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

Personnes âgées de plus de 65 ans

La posologie initiale habituellement recommandée est de 5 mg par jour en une prise.

Enfants et adolescents de moins de 18 ans

CILENTRA® ne doit habituellement pas être administré aux enfants et adolescents.

Mode d'administration

Vous pouvez prendre CILENTRA® pendant ou en dehors des repas. Avalez les comprimés avec un peu d'eau.

Durée de traitement


Environ deux semaines peuvent être nécessaires avant que vous ne commencez à vous sentir mieux. Continuez à prendre CILENTRA® même si vous tardez à ressentir une amélioration.

Ne changez pas la posologie de votre médicament sans en avoir d'abord parlé avec votre médecin.

Continuez à prendre CILENTRA® aussi longtemps que votre médecin le recommande. Si vous arrêtez votre traitement trop tôt, vos symptômes peuvent réapparaître. Il est recommandé de poursuivre le traitement pendant au moins six mois à partir du moment où vous sentez à nouveau bien.

Si vous avez pris plus de CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables

le service des urgences de l'hôpital ou de l'ambulance. Cela peut entraîner des effets gênants, tels que des vertiges, des nausées, des étourdissements, des convulsions de



Médicam



CILENTRA® 10 mg

(Escitalopram), comprimés pelliculés sécables

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament n'a pas d'effets secondaires.

Gardez cette notice.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QU'UN COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CILENTRA®?
3. COMMENT PRENDRE CILENTRA®?
4. QUELSSONT LES EFFETS SECONDAIRES?
5. COMMENT SE PRENDRE DES COMPRIMÉS PELLICULÉS SÉCABLES?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

CILENTRA® contient de l'escitalopram qui appartient à un groupe d'antidépresseurs appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS). Ces médicaments agissent sur le système sérotoninergique dans le cerveau en augmentant le taux de sérotonine. Les dysfonctionnements du système sérotoninergique sont considérés comme un facteur important dans le développement de la dépression et des pathologies associées.

CILENTRA® est indiqué dans le :

- traitement des épisodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés).
- traitement de la panique avec ou sans agoraphobie.
- traitement du trouble «anxiété sociale» (phobie sociale).
- traitement du trouble anxiété généralisée.
- traitement des troubles obsessionnels compulsifs.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables?

Ne prenez jamais CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables si :

- vous êtes allergique (hypersensible) à l'escitalopram ou à l'un des composants contenus dans CILENTRA®.
- vous prenez d'autres médicaments appartenant à la famille de la MAO, dont la sélegiline (utilisée dans le Parkinson), le moclobémide (utilisé dans le linezolid) (un antibiotique).

doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Adultes

Dépression

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

Trouble panique

La posologie initiale de CILENTRA® au cours de la première semaine de traitement est de 5 mg par jour en une prise, puis une augmentation à 10 mg par jour est effectuée. La posologie pourra être encore augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

Trouble anxiété sociale

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. Votre médecin pourra diminuer la posologie à 5 mg par jour ou l'augmenter jusqu'à un maximum de 20 mg par jour, selon votre réponse au traitement.

Trouble anxiété généralisée

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

Troubles obsessionnels compulsifs

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

Personnes âgées de plus de 65 ans

La posologie initiale habituellement recommandée est de 5 mg par jour en une prise.

Enfants et adolescents de moins de 18 ans

CILENTRA® ne doit habituellement pas être administré aux enfants et adolescents.

Mode d'administration

Vous pouvez prendre CILENTRA® pendant ou en dehors des repas. Avalez les comprimés avec un peu d'eau.

Durée de traitement

Environ deux semaines peuvent être nécessaires avant que vous ne commencez à vous sentir mieux. Continuez à prendre CILENTRA® même si vous tardez à ressentir une amélioration.

Ne changez pas la posologie de votre médicament sans en avoir d'abord parlé avec votre médecin.

Continuez à prendre CILENTRA® aussi longtemps que votre médecin le recommande. Si vous arrêtez votre traitement trop tôt, vos symptômes peuvent réapparaître. Il est recommandé de poursuivre le traitement pendant au moins six mois à partir du moment où vous sentez à nouveau bien.

Si vous avez pris plus de CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables

le service des urgences de l'hôpital ou de l'ambulance. Cela peut entraîner des effets gênants, tels que des vertiges, des nausées, des étourdissements, des convulsions de

PPV: 126 DH 00

Médicam

RETI DANS
ANT DE
es?

LC
LIMITED

CILENTRA® 10 mg

(Escitalopram), comprimés pelliculés sécables

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament n'a pas d'effets secondaires.

Gardez cette notice.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QU'UN COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CILENTRA®?
3. COMMENT PRENDRE CILENTRA®?
4. QUELSSONT LES EFFETS SECONDAIRES?
5. COMMENT SE PRENDRE DES COMPRIMÉS PELLICULÉS SÉCABLES?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

CILENTRA® contient de l'escitalopram qui appartient à un groupe d'antidépresseurs appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS). Ces médicaments agissent sur le système sérotoninergique dans le cerveau en augmentant le taux de sérotonine. Les dysfonctionnements du système sérotoninergique sont considérés comme un facteur important dans le développement de la dépression et des pathologies associées.

CILENTRA® est indiqué dans le :

- traitement des épisodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés).
- traitement de la panique avec ou sans agoraphobie.
- traitement du trouble «anxiété sociale» (phobie sociale).
- traitement du trouble anxiété généralisée.
- traitement des troubles obsessionnels compulsifs.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables?

Ne prenez jamais CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables si :

- vous êtes allergique (hypersensible) à l'escitalopram ou à l'un des composants contenus dans CILENTRA®.
- vous prenez d'autres médicaments appartenant à la famille de la MAO, dont la sélegiline (utilisée dans le Parkinson), le moclobémide (utilisé dans le linezolid) (un antibiotique).

doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Adultes

Dépression

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

Trouble panique

La posologie initiale de CILENTRA® au cours de la première semaine de traitement est de 5 mg par jour en une prise, puis une augmentation à 10 mg par jour est effectuée. La posologie pourra être encore augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

Trouble anxiété sociale

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. Votre médecin pourra diminuer la posologie à 5 mg par jour ou l'augmenter jusqu'à un maximum de 20 mg par jour, selon votre réponse au traitement.

Trouble anxiété généralisée

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

Troubles obsessionnels compulsifs

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

Personnes âgées de plus de 65 ans

La posologie initiale habituellement recommandée est de 5 mg par jour en une prise.

Enfants et adolescents de moins de 18 ans

CILENTRA® ne doit habituellement pas être administré aux enfants et adolescents.

Mode d'administration

Vous pouvez prendre CILENTRA® pendant ou en dehors des repas. Avalez les comprimés avec un peu d'eau.

Durée de traitement


Environ deux semaines peuvent être nécessaires avant que vous ne commencez à vous sentir mieux. Continuez à prendre CILENTRA® même si vous tardez à ressentir une amélioration.

Ne changez pas la posologie de votre médicament sans en avoir d'abord parlé avec votre médecin.

Continuez à prendre CILENTRA® aussi longtemps que votre médecin le recommande. Si vous arrêtez votre traitement trop tôt, vos symptômes peuvent réapparaître. Il est recommandé de poursuivre le traitement pendant au moins six mois à partir du moment où vous sentez à nouveau bien.

Si vous avez pris plus de CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables

le service des urgences de l'hôpital ou de l'ambulance. Cela peut entraîner des effets gênants, tels que des vertiges, des nausées, des étourdissements, des convulsions de



Médicam

RETI DANS

ANT DE

es?

LC
LIMITED